COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE
19 NOV 1979

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/publicacoes-do-imur_1959-1962_103-160

PUBLICAÇÕES DO I.M.U.R. NOS. 103-160

62K

Nº 103
ALGUNS NOVOS GENEROS MONOTIPICOS DE FUNGOS IMPERFEITOS

A.Chaves Batista
in An.Soc.Biol.Pern., XVI (1): 141-151, 1959, Recife, Pern., Brasil

Nº 104
ALGUMAS ESPECIES DE ASCOMYCETES

A.Chaves Batista & T. Jesus de Oliveira
in An.Soc.Biol.Pern., XVI (1): 161-174, 1959, Recife, Pern., Brasil

Nº 105
NOVOS E ANTIGOS FUNGOS MICROTHYRIACEAE

A. Chaves Batista, G.E.P. Peres, C.A. Amaral Costa & F.B. Leal
in An.Soc.Biol.Pern., XVI (1): 129-140, 1959, Recife, Pern., Brasil

Nº 106
UMA NOVA DOENCA FUNGICA DE PEIXE ORNAMENTAL

A.Chaves Batista & H.S. Maia
in An.Soc.Biol.Pern., XVI (1): 153-159, 1959, Recife, Pern., Brasil

Nº 107
MEGALOXYPHIUM OPHIDIOGLOSSUM E SEU CULTIVO ARTIFICIAL NOS MEIOS DE LABORATORIO

A.Chaves Batista, M.L.Nascimento & E.A.F. da Matta
in ATTI, Univ.Pavia, Série 5, XVI: 97 - 103, 1959, Itália

Nº 108
NOVAS COMBINAÇÕES DE PHAEOSPHAERELLA

A.Chaves Batista & R.Ciferri
in ATAS Univ. Pavia, Série 5, XVI: 115-117 - 1959, Itália

Nº 109
NOVOS FUNGOS PELTASTERALES

A.Chaves Batista & R.Ciferri
in ATTI, Univ.Pavia, Série 5, XVI: 85-96,1959, Itália

Nº 110
ICONOGRAFIA E ESTUDO DESCRITIVO DE ESPECIES DE MELIOLACEAE

A.Chaves Batista, M.L. Nascimento & H.S. Maia
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 13-51, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 111
ANALYTICAL REVISION OF SPECIES OF THE GENUS HYSTEROSTOMINA Theiss. & Syd.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 53-77, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 112
A REVISION OF SOME SPECIES OF THE GENERA MELANOPLACA Syd., MENDOGIA Racib. AND PALAWANIA Syd.

A.Chaves Batista & A.F. Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 79-92, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 113
A TAXONOMIC STUDY OF SOME SPECIES OF THE GENERA PARMULINA Theiss. & Syd.,PLEIOSTOMELLA Syd., POLYCYCLUS Höhnel AND POLYRHIZON Theiss. & Syd.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 93-115, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 114
A REVISION OF SOME SPECIES OF POLYSTOMELLA Speg. PROTOTHYRIUM Arn. AND RHAGADOLOBIUM P.Henn. & Lind.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 117-131, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 115
DOIS NOVOS GENEROS DE FUNGOS POLYSTOMELLACEAE

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in Rev.de Biologia, I(3-4):280-286,1958, Portugal

Nº 116
A TAXONOMIC REVISION OF SOME SPECIES OF THE GENUS HYSTEROSTOMA Theiss.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 133-157, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 117
CONSIDERATION ABOUT SOME SPECIES OF PARMULARIA Lév.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 159-165, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 118
A TAXONOMIC REVISION OF SOME SPECIES OF COCCONIA Sacc.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 167-178, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 119
A SYSTEMATIC STUDY OF SPECIES OF THE GENERA CYCLOSCHIZON (P.Henn.) Doidge AND CYCLOSTOMELLA (Pat.) Syd.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 179-188, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 120
A REVISION OF THE SPECIES OF THE GENUS ELLISIODOTHIS Theiss.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 189-198, 1960,
Recife, Pern., Brasil

Nº 121
A REEXAMINATION OF SOME SPECIES OF THE GENUS ACTINODOTHIS Syd.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 199-203, 1960,
Recife, Pern., Brasil

Nº 122
A REDESCRIPTION OF A NEW SPECIES OF DOTHIDASTEROMELLA Höhn., HYSTEROSTOMELLA Speg., INOCYCLUS Theiss. & Syd. AND LEPTODOTHIS Theiss. & Syd.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 205-219, 1960,
Recife, Pern., Brasil

Nº 123
NOVOS GENEROS E NOVAS ESPECIES DE FUNGOS ASTERINACEAE

A.Chaves Batista, H.S. Maia & M.L.Farr
in Rev.de Biologia, I (3-4): 287-298, 1958,
Portugal

Nº 124
DOIS NOVOS GENEROS DE FUNGOS MELIOLACEAE

A.Chaves Batista & H.S. Maia
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 221-227, 1960,
Recife, Pern., Brasil

Nº 125
REVALIDATION OF THE GENUS LASIOSTEMMA Theiss. & Syd. ON THE FAMILY PARODIOPSIDACEAE

A.Chaves Batista & M.L.Farr
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 229-233, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 126
POLYPEDIA - UM NOVO GENERO DE FUNGOS POLYSTOMELLOPSIDACEAE

A.Chaves Batista & G.E.P. Peres
in ATTI, Univ.Pavia, Série 5, XVI: 118 - 120, 1959, Itália

Nº 127
ALGUNS DISCOMYCETES ALIENIGENAS

A.Chaves Batista & M.L.Nascimento
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 235-245,1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 128
MONILIALES - DESCRIÇÃO E REVISÃO DE ALGUMAS ESPECIES

A.Chaves Batista, H.S. Maia, J.A. Lima & E.A. F. da Matta
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 247-274, 1960,Recife, Pern., Brasil

Nº 129
ALGUNS DOTHIDEACEAE E PHYLLACHORACEAE ESTUDADOS EM PERNAMBUCO

A.Chaves Batista & M.L.Nascimento
in Rev. de Biol., I (3-4): 299-312, 1958,Portugal

Nº 130
ESTUDO ICONOGRAFICO DE ALGUNS FUNGOS VALSACEAE E XYLARIACEAE

A.Chaves Batista & M.L.Nascimento
in Rev.de Biol.,I(3-4):325-332,1958, Portugal

Nº 131
ALGUNS HYALOPUS ASSINALADOS SOBRE SUCO GASTRICO E BILE HUMANA NO RECIFE

A.Chaves Batista, J.A.Lima & S. Dioscódio de Oliveira
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 275-281, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 132
ASCOMYCETES VULGARES OU NOVOS

A.Chaves Batista, H.S. Maia & M.L. Nascimento
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 283-303, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 133
HERALDOA - UM NOVO GENERO DE ASTERINACEAE COM HIMENIO MULTIPLO

A.Chaves Batista
in ATTI, Univ.Pavia, Série 5, XVI: 104 - 114, 1959, Itália

Nº 134
NOVAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O GENERO VIEGASIA Bat.

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 305-321,1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 135
LEMBOSIELLINA E PARASTERINOPSIS - DOIS NOVOS GENEROS DE ASTERINACEAE

A.Chaves Batista & H.S. Maia
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 323-329,1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 136
CLADOCHAETE FEVILLEAE n.sp. _ POSSIVEL ESTADIO METAGENETICO DE PHAEODIMERIELLA FEVILLEAE n.sp.

A.Chaves Batista, M.L.Nascimento & M.L.Farr
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 331-336, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 137
ALGUMAS ESPECIES DE DIMERINA, DIMERIUM E PHAEODIMERIELLA, ASSINALADAS COMO HIPERPARASITAS

A.Chaves Batista & H.S.Maia
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 337-347,1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 138
ANOTAÇÕES TAXONOMICAS DE ALGUNS MELANCONIALES

A.Chaves Batista,R.Ciferri,A.F.Vital &H.S.Maia
in ATTI, Univ.Pavia, Série 5, XVI: 127-130, 1959, Itália

Nº 139
LEPTOSTROMACEAE E SPHAEROPSIDACEAE NOVOS OU REESTUDADOS

A.Chaves Batista & M.L.Nascimento
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 349-358,1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 140
ESTUDO ANALITICO DE ALGUNS BASIDIOMICETOS

A.Chaves Batista & A.F.Vital
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 359-364,1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 141
DUAS NOVAS COMBINAÇÕES NOS GENEROS COCCOIDELLA Höhn. E CYCLOPELTIS Pet.

A.Chaves Batista & M.L.Nascimento
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 365-369,1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 142
A REEXAMINATION OF THE TYPE SPECIES OF PTYCHOPELTIS Syd. ITS IDENTIFICATION AS A NEW VARIETY OF ASTERINEMA GLABRATA Bat.& Maia AND THEIR ASSOCIATED FUNGI

A.Chaves Batista & M.L.Farr
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 371-376,1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 143
ESTUDIO DE CANDIDA HUMICOLA (Daszewska) Diddens & Lodder Y EL RECONOCIMIENTO DE CANDIDA CURVATA (Diddens & Lodder) Lodder & van Rij COMO SU SINONIMO

R.C.Artagaveytia-Allende & R.P.Coelho
in ATAS, IMUR, ano I, nº 1: 377-380, 1960, Recife, Pern., Brasil

Nº 144
MICOGINECOPATIA POR BYRRHA PORTIO-VAGINALIS n.gen.

A.Chaves Batista, F.Monnier & J.S.Silveira
in Abstr. VI Congr.Intern.Medec.Tropical & Malária (~~no prelo~~), 1958, Portugal

Nº 145
COLECISTITES MICOTICAS

A.Chaves Batista, S. Dioscódio de Oliveira & G.Lauro Silveira
in "Abstracts of the papers",VI Congr.Intern. Medec.Tropical & Malária, pg. 153-154, 1958, Portugal

Nº 146
ONICOPATIAS E AUREOBASIDIUM PULLULANS (De Bary) Arn.

José Rêgo Vieira
in "Abstracts of the papers",VI Congr.Intern. Medec. Tropical & Malária, pg. 153, 1958, Portugal

Nº 147
VULVO-VAGINITE MICOTICA EM CRIANÇA

J.S.Silveira
in Rev. "Ginecologia", XIV (1): 3-4, 1959, Recife, Pern., Brasil

Nº 148
ALGUNS FUNGOS DOS GENEROS ENGLERA E ENGLERULASTER

A.Chaves Batista & G.E.P. Peres
in Rev. de Agric., ano 2, nº 1: 25-35, 1959, Recife, Pern., Brasil

Nº 149
TORULOPSIS GLABRATA - CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE SU HABITAT

R.C.Artagaveytia-Allende & J.S.Silveira
in Rev.IPASE (no prelo), 1959, Rio, Brasil

Nº 150
OCORRENCIA DE CANDIDA HUMICOLA (Daszewska) Diddens & Lodder EM URETRA DE GESTANTE

J.S.Silveira
in Rev. IPASE (no prelo), 1959, Rio, Brasil

Nº 151
TWO NEW MYXOMYCETES FROM BRAZIL

M.L. Farr & George W.Martin
in Brotéria, XXVII (4):153-158,1958,Portugal

Nº 152
ALGUNS FUNGOS MYRIANGIALES E SEUS ASSOCIADOS

A.Chaves Batista & M.L.Nascimento
in Brotéria,XXVII (4):159-178,1958, Portugal

Nº 153
NOVAS E ANTIGAS ESPECIES DE FUNGOS MORENOELLA Speg.

A.Chaves Batista & H.S. Maia
in Brotéria,XXVIII (LV),1:24-35,1959,Portugal

Nº 154
REVISÃO ANALITICA DE UM GRUPO DE FUNGOS IMPERFEITOS

A.Chaves Batista & E.A.F. da Matta
in Brotéria, XXVIII (LV), 2-3:75-93, 1959, Portugal

Nº 155
ASCOMYCETES DIVERSOS

A.Chaves Batista & G.E.P. Peres
in Brotéria, XXIX (LVI),1:7-19,1960, Portugal

Nº 156
PYRENOMYCETIDAE REVISTOS EM PERNAMBUCO

A.Chaves Batista, M.L.Nascimento & M.L.Farr
in Saccardoa, nº 1, 1960, Itália

Nº 157
REVISÃO DE ALGUNS PYRENOMYCETES ALIENIGENAS

A.Chaves Batista & E.A.F. da Matta
in Rev. de Agric., ano 2, nº 1: 15-24, 1959, Recife, Pern., Brasil

Nº 158
THE CHAETOTHYRIALES

A.Chaves Batista & R.Ciferri
Sydowia (no prelo), 1960, Austria Bain. 3, 1962.

Nº 159
LA TECNICA DEL ENRIQUECIMIENTO EN EL ESTUDIO DEL AISLAMIENTO DE LEVADURAS

R.C.Artagaveytia-Allende & J.S.Silveira
in Rev. de Ginecologia e Obstetrícia, LIII, 104(3): 207-212, 1959, Recife, Pern., Brasil

Nº 160
FUNGOS FILAMENTOSOS ASSINALADOS NA BILE HUMANA

A.Chaves Batista, G.Silveira, J.A.Lima & S. Dioscódio de Oliveira
in Rev.Roche,XIX(10):290-294,1959,Rio,Brasil

1959

AN. SOC. BIOL. PERNAMBUCO
Vol. XVI, n.º I, págs. 141-151, 1959

ALGUNS NOVOS GÊNEROS MONOTÍPICOS DE *FUNGOS IMPERFEITOS* *

A. Chaves Batista

Êste trabalho dá notícia do achado de novos Fungos Imperfeitos, que definem, como tipo, os limites de novos gêneros, situados respectivamente entre os *Sphaeropsidaceae* e os *Polystomellopsidaceae*.

A caracterização dêsses organismos, paralelamente, é apresentada em consonância com as exigências do Código Internacional de Nomenclatura Botânica.

Os novos gêneros propostos são os seguintes:

Dilaceniopsis Bat., *Gelatosphaera* Bat. & Nasc., *Hymeniopeltis* Bat. & Vital e *Polystomellomyces* Bat.

SPHAEROPSIDACEAE
DIALACENIOPSIS Bat. n. gen.
Tipo: *D. LANDOLPHIAE* nobis n. sp.

Micélio superficial, de hifas marrom, septadas, não constrictas, sem hifopódios ou setas.

Picnídios superficiais, globosos, sésseis, marrom-negros, ástomos, membranosos, sub-parenquimáticos, setosos.

Picnidiosporos sésseis, cilindráceos ou elipsóide-alongados, 2 ou mais septos transversais, hialinos.

Hiperparasita sôbre Arterinaceae.

Typus: *D. LANDOLPHIAE* nobis, n. sp.
Mycelium superficiale, ex hyphis brunneis, septatis, haud constrictis, non hyphopodiatis, non setosis, compositum.

---

* Publicação n.º 103 — Instituto de Micologia da **Universidade do Recife**.

Pycnidia superficialia, globosa, atro-brunnea, astoma, membranosa, subparenchymatica, setosa.

Pycnidiosporae cylindraceae vel ellipsoideae, 2 pro more transversaliter septatae, hyalinae.

Hyperparasita in Asterinaceis.



Fig. 1

DIALACENIOPSIS LANDOLPHIAE Bat. n. sp.
Picnídio setoso e picnidiosporos hialofragmos.

DIALACENIOPSIS LANDOLPHIAE Bat. n. sp.

Micélio hipófilo, marrom-claro, superficial, não setoso, não hifopodiado, raramente telemórfico, septado, não constricto, com ramificações opostas, alternas e unilaterais, em ângulos de 45-90°; células hifais de 24-37 x 2,5-5,5 u.

Picnídios globosos a sub-globosos, 60-100 u de diam., superficiais, marrom, sésseis, ástomos, membranosos, setosos, sub-parenquimáticos; paredes em uma só camada de células poligonais e arredondadas de 7-12,5 x 5-6,5 u.

Setas picnidiais em número de 8 a 30, ao redor dos picnídios, eretas e encurvadas, marrom-negras, septadas, não constrictas, de ápice agudo ou obtuso, 120-430,5 x 5,5-7 u, flexuosas.

Picnidiosporos cilindráceos sésseis, com 1 a 3 septos e 2 a 4 gútulas, não constrictos, hialinos, 16,5-28 x 5,5-6,5 u, Fig. 1.

Sôbre *Asterina*, em fôlhas de *LANDOLPHIA UGANDENSIS* associado a *DIALACENIUM LANDOLPHIAE* Hansf. *ASTERINA LANDOLPHIICOLA* Hansf. e *SCOLECOPELTIDIUM LANDOLPHIAE* Bat. n. sp. Tipo, n.° 3272, Herb. Mycologist, Dep. Agric. Uganda. Leg. C. G. Hansford, XI-1943.

Mycelium hypophyllum, brunnescens, superficialie, non setosum, haud hyphopodiatum, ex hyphis sepatis, non constrictis, oppositis vel alternatim ramosis, in angulis 45-90.° et ex cellulis 24-37 x 2,5-5,5u, compositum.

Pycnidia superficialia, globosa vel sub-globosa, 60-100u. diam., brunnea, sessilia, astoma, membranosa, setosa; paries unistratosus, sub-parenchymaticus, ex cellulis polygonalibus vel sub-globosis, 7-12,5 x 5-6,5 u, efformatus.

Setea pycnidiales 8-30, pycnidia circumdantes, erectae, incurvatae, atro-brunneae, septatae, apicaliter acutae vel obtusae, 120-430,5 x 5,5-7u, flexuosae.

Pycnidiosporae cylindraceae, sessiles, 1-3-transversaliter septatae, 2-4-guttulatae, non constrictae, hyalinae, 16,5-28 x 5,5-6,5u.

In *Asterina*, in foliis *LANDOLPHIAE UGANDENSIS*, soc. iniens cum *DIALACENIO LANDOLPHIAE* Hansf. *ASTERINA LANDOLPHIICOLA* Hansf. et *SCOLECOPELTIDIO LANDOLPHIAE* Bat. n. sp. Typus, 3272, Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda, Leg. C. G. Hansford, XI-1943.

Obs.: Esta espécie aparentemente foi incluída por Hansford na descrição de DIALACENIUM LANDOLPHIAE (Proc. Linn. Soc Lond. 157 sess. 21, 1944-45). Contudo, afigura-se-nos de um gênero distinto, além do que o seu micélio é independente, não hifopodiado, o que a afasta de *DIALACENIUM*. Os picnídios são menores e ástomos, em relação à descrição supra citadas.

GELATOSPHAERA Bat. & Maia n. sp.
Tipo: *G. ABIETINA* nobis.

Micélio livre ausente.

Picnostromas gelatinoso-cartilaginosos, globosos, ástomos, irregularmente deiscentes, marrom-claros a marrom-amarelados, uniloculares; hipostroma central, cilindráceo, inato, cartilaginoso, marrom-claro.

Picnidiosporos sésseis, contínuos, hialinos.

Typus: *G. ABIETINA* nobis
Mycelium liberum nullum.
Pycnostromata gelatinoso-cartilaginea, globosa, astoma irregulariter disrumpentia, brunnescentia vel brunneo-aurantiaca, uniloculata. Hypostromata centralia, cylindrica, innata, cartilaginea, brunnescentia.
Pycnidiosporae sessiles, continuae, hyalinae.

.....

Affini *Robakiae* Petrak sed loculum habens regulare et pycnidiosporos sessiles.

GELATOSPHAERA ABIETINA Bat. & Maia, n. sp.

Micélio livre ausente.

Picnostromas espalhados ou gregários, superficiais hipófilos, gelatinoso-cartilagíneos, globosos, 130-182 u diam., marrom-amarelados, glabros Fig. 2, uniloculares, de paredes pseudoparenquimáticas, 1-2 camadas de células, 10-13,5 u de espessura e formadas por células poligonais, 4-10 x 3,5-7 u, ástomos, irregularmente deiscentes.

Hipostroma central, cilindráceo, inato, cartilagíneo, 36--42 u diam., marrom-claro, Fig. 3.

Picnidiosporos sésseis, elipsóides ou ovóides, contínuos, hialinos, 9,5-12 x 5,5-8 u, Fig. 2.

Sôbre fôlhas de *Abies* sp. Brandenburg, Leg. P. Vogel, 21.1.905. Tipo, Ex Herb. Mycol. P. A. Sacc., parte do tipo no Instituto de Micologia, Universidade do Recife, n.° 10902.

Mycelium liberum nullum.
Pycnostromata sparsa vel gregaria, superficialia, hypophylla, gelatinoso-cartilaginea, globosa, 130-182 u diam., brunneo-aurantiaca, glabrata, uniloculata, irregulariter disrumpentia, cum parietibus pseudoparenchymaticis, 1-2-stratosis, 10-13,5u cr., ex cellulis polygonalibus 4-10 x 3,5-7u, efformatis.
Hypostromata centralia, cylindracea, innata, cartilaginea, 36-42u diam., brunnescentia.
Pycnidiosporae sessiles, ellipsoideae vel ovoideae, continuae, hyalinae, 9,5-12,5 x 5,5-8u.
In foliis *Abietis* sp. Brandenburg, Leg. P. Vogel, 21.1.1905. Typus, Ex Herb. Mycol. P. A. Saccardo et in Instituto de Micología, Universidade do Recife. n.° 10902.



Fig. 2

GELATOSPHAERA ABIETINA Bat. & Maia n. sp.
Picnostroma e picnidiosporos.

Orig.



Fig. 3

GELATOSPHAERA ABIETINA Bat. & Maia n. sp.
Picnostroma e hipostroma sob secção longitudinal.

HYMENIOPELTIS Bat. n. gen.
Tipo: *H. ERYTHROXYLII* Bat. & Vital n. sp.

Micélio superficial, tênue-peliculoso, marrom-oliváceo; hifas reticuladas, septadas, não constrictas, sem setas ou hifopódios.

Picnostromas marrom, orbiculares, escutelares, meandriformes, ostiolados, himênio fértil em tôda a cavidade.

Picnidiosporos bacilares, sésseis, contínuos, hialinos.

Typus: *Hl ERITHROXYLII* nobis n. sp.
Mycelium superficiale, tenuiter-pelliculosum, brunneo-olivaceum, ex hyphis reticulatis, ramosis, septatis, non constrictis, non setosis, haud hyphopodiatis compositum.
Pycnostromata brunnea, orbiculata, scutata, meandriformia, ostiolata; hymenium fertile in tota cavitate.
Pycnidiosporae bacillares, sessiles, continuae, hyalinea.

HYMENIOPELTIS ERYTHROXYLII Bat. & Vital n. sp.

Micélio superficial, tênue-peliculoso, marrom-oliváceo, espalhado, de hifas reticuladas, septadas, não constrictas, 1,5--2,5 u de diam., sem setas ou hifopódios.

Picnostromas isolados, orbiculares, escutelares, 50-67,5 u de diam., e 20-27,5 u de altura, membranosos, Fig. 4a; parede superior marrom, 5-8 u de espessura, meandriforme; ostíolo arredondado, 7,5-12,5 u; himênio fértil em tôda a cavidade picnidial; parede inferior hialina, tenuíssima, Fig. 4-b.

Picnidiosporos bacilares, contínuos, hialinos, 1,5-2 x0,5 u, sésseis.

Sôbre fôlhas de *ERYTHROXYLON* sp., associado a *STOMIOPELTIS SUTTONIAE* (Mendoza) Luttrell e *MICROPELTIS GRAVATAENSIS* Bat. & Vital n. sp. — Leg. Dr. Epaminondas de Berros Correia, 2.11.957. Tipo, n.° 12441, I.M. U.R., Pernambuco, Brasil.

Mycelium superficiale, tenue, pelliculosum, brunneo-olivaceum, effusum, ex hyphis reticulatis, ramosis, septatis, non setosis, haud hyphopodiatis, compositum.

Pyicnostromata sparsa, orbiculata, scutata, 50-67,5u diam. 20-27,5u alt., membranosa, ostiolata, 7,5-12,5u. diam; paries superior meandricus, brunneus, 5-8u cr.; hymenium fertile in tota cavitate; paries inferior tenuissimus, hyalinus.

Picnidiosporae bacillares, sessiles, continuae, hyalinae, 1,5-2 x 0,5.

In follis *ERYTHROXYLII* sp. soc. iniens cum STOMIOPELTE SUTTONIAE (Mendoza) Luttrel. et *MICROPELTE GRAVATAENSI* Bat. & Vital n. sp. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 2-11-957. Typus, 12441, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil.



Fig. 4

HYMENIOPELTIS ERYTHROXYLII Bat. & Vital
a) picnostroma e micélio, 450 x
b) picnostroma sob secção longitudinal

POLYSTOMELLOMYCES Bat. n. gen.
Tipo: *P. ATHENIENSIS* Bat. n. sp.

Micélio livre ausente.

Picnostromas gregários, superficiais, globoso-pedunculados, o pedúnculo penetrando o tecido, à maneira de coluna, com hipostroma escuro, até ao mesófilo; negros, pseudo-parenquimáticos, ástomos, glabros, uniloculares, com a cavidade inteiramente fértil.

Conidióforos conóides, unicelulares.
Conídios cilindráceos, elipsóides, contínuos, hialinos.

Mycelium liberum nullum.
Pycnostromata superficialia, gregaria, globosopedunculata, cum hypostromate columnato penetrante usque mesophyllum, brunnea, uniloculata, atra, glabrata; paries pseudo-parenchymaticus. Loculum totaliter fertile.
Conidiophori conoidei, unicellulari.
Conidiae cylindraceae vel ellipsoideae, continuae, hyalinae.

POLYSTOMELLOMYCES ATHENIENSIS Bat. n. sp. (Derivado de Atenas — Grécia).

Micélio livre ausente.

Picnostromas hipófilos, superficiais, cespitosos ou gregários, negros, ástomos, globoso-pedunculados, 83-127 u de diam., o pedúnculo formando uma coluna central, que penetra o tecido foliar e chega ao mesófilo, numa altura total de 20-24,5 u, e 25-50 u de diam.; hipostroma bem desenvolvido, oliváceo-marrom, com hifas septadas, não constrictas, de 3-5,5 u de diam.

Os picnostromas são uniloculares, com a cavidade inteiramente fértil, membranosos, pseudoparenquimáticos, de paredes formadas por várias camadas de células, 14,5-22,5 u de espessura, sendo a capa exterior constituída por células sub-globosas ou poligonais, de 6,5-17 x 4-10 u.

Conidióforos conóides, unicelulares, hialinos, 3-4 x 2--3,5 u, Fig. 5-a.

Picnidiosporos cilindráceos ou elipsóides, contínuos, hialinos, 11-13,5 x 1,5-2,5 u, Fig. 5-b.

Sôbre fôlhas de planta desconhecida. Atenas, Grécia, out. 1875. Leg. Heldreith. Tipo Ex Herb. de Thümen em The New York Botanical Garden. Det. como *Capnodium lentisci* Thümen.

Obs.: Agradecemos ao New York Botanical Garden pela cessão dêsse espécimen, que nos permitiu a criação do gênero em foco.

Também analisamos uma duplicata dêsse mesmo espécimen, como integrante da coleção de Saccardo, e que foi cedida por intermédio do Prof. R. Ciferri, da Universitá de Pavia; os caracteres do fungo concordaram, inteiramente, com os do tipo prèviamente estudados. Em 23/1/957.



Fig. 5

POLYSTOMELLOMYCES ATHENIENSE Bat. n. sp.

a) Picnostroma penduculado com hipostroma colunar, bem desenvolvido, visto em corte longitudinal.

b) Picniodisporos.

SUMMARY

The following new genera are described:

Dilaceniopsis Bat. with free mycelium; pycnidia superficial, globose, sessile, astomous, brownish-black, membranous and setose; pycnidiospores 2 or more septate, hyaline. Type — *D. landolphiae* Bat. n. sp.

Gelatosphaera Bat. & Maia without free mycelium. Pycnostroma gelatinoseo-cartilagineous, globose, astomous, irregularly dehiscent, brownish to yellowish-brown, glabrous, unilocular; hypostroma central, cylindraceous, innate, cartilagineous, brownish; pycnidiospor sessile, continuous, hyaline. Tipe — *G.a bietina* Bat. & Maia, n. sp.

Hymeniopeltis Bat. — mycelium thinly membranous. Pycnostroma brown, orbicular, scutellar, meandriform, ostiolate having fertil hymenium in all of the cavity. Pycnidiospores bacillar, sessile, continuous, hyaline. Type, *H. erythroxylii* Bat. & iVtal n. sp.

Polystomellomyces Bat. without free mycelium. Pycnostroma superficial, globose-pedunculate, black, pseudoparenchymatic, astomous, glabrous, unilocular hymenium in all of the cavity; hypostroma cylindraceous. Conidiophores short, conoid. Pycnidiospores cylindraceous, continuous, hyaline. Type, *P. atheniensis* Bat. n. sp.

AN. SOC. BIOL. PERNAMBUCO
Vol. XVI, n.º I, págs. 161-174, 1959

ALGUMAS ESPÉCIES DE *ASCOMYCETES* *

A. Chaves Batista *T. J. Oliveira* **

De cunho taxonômico, o presente trabalho abrange a descrição e ilustração dos seguintes Ascomycetes: *Haplothecium caulicolum* Bat. & Vital n. sp., com a revalidação do gênero *Haplothecium*, *Hypoxylon bombacinnum* Bat. & Oliveira n. sp., (*Massalongiella pleurostoma* Starb. de representação insatisfatória para estudo), *Ophiodothella circularis* (Bres.) Petrak, *Physalospora nerii* Pass., *Pleospora kansensis* E. & E., *Porostigme caulicola* Bat. & Oliveira n. sp. e *Trabutia basanacantheana* Bat. n. sp.

HAPLOTHECIUM CAULICOLUM Bat. & Vital n. sp.

Micélio livre ausente. Lóculos periteciais estromáticos, imersos, negros, sub-cuticulares a sub-epidérmicos, isolados, às vêzes, 2-3 confluentes, globoso-depressos, 224-226 de diam., 129-163 u de altura, uniloculares, formando pontuações salientes na superfície da matriz; parede marrom-negra, opaca, 15-45 u de espessura; ostíolo raras vêzes observado, rudimentar.

Micélio interno bem desenvolvido, formado por hifas marrom, septadas, 2,5-7,5 u de diâm., inter ou intra-celulares.

Ascos cilindro-clavados, octosporos, sésseis, bitunicados, 40-57,5 x 8-9,5 u; paráfises simples, septadas ou não, filiformes, maiores que os ascos, 1-1,5 u diâm.

---

* Publicação n.º 104 — Instituto de Micologia da **Universidade do Recife**.
** Do Instituto Aggeu Magalhães, estagiando no Instituto de Micologia, da **Universidade do Recife**.



Fig. 1

HAPLOTHECIUM CAULICOLUM Batista & Vital n. sp. **Lóculo perithecial, asco, paráfises e ascosporos.**
Original.

Ascosporos elíptico - alongados, hialinos, contínuos, 8 - -12,5 x 3-4,5 u, dísticos, Fig. 1.

Sôbre ramos de planta Dicotiledonea. Dois Irmãos, Recife. Leg. A. Fernandes Vital, 29.7.56. Tipo, 5698, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil.

Mycelium liberum nullum.

Ascostromata immersa, erumpentia, sub-cuticularia vel sub-epidermalia, atra, simplicia vel 2-3 confluentia, globoso-depressa, 224-266u diam., 129-163u alt. uniloculata; paries stromaticus atro-brunneus, opacus, 15-45u cr.; pseudo-ostiolata.

Asci cylindro-clavati, 8-spori, bitunicati, sessiles, 40-57,5 x 8-9,5 u; paraphyses filiformes, septatae vel non, 1-1,5u cr. simplices.

Ascosporae ellipsoideae, elongatae, continuae, hyalinae, distichae, 8-12,5 x 3-4,5u.

Mycelium endogenum bene evolutum, ex hyphis brunneis, septatis, 2,5-7,5u cr. inter et intracellularibus, compositum.

In ramulis plantae ignotae. Dois Irmãos-Recife — Leg. A. Fernandes Vital 29/7/56. Typus, 5698, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil. Acham-se associados na mesma peça botânica *Ellisiotothis pandani* H. & P. Sydow e *Podoconis* sp.

Obs.: O gênero Haplothecium foi criado por Theissen & Sydow *in* Die Dothideales (Ann. Myc., vol. XIII, 1915). Posteriormente Clements & Shear *in* The Genera of Funfi, 1931, consideraram-no sinônimo de *Montagnellina*.
Apoiados no valor sistemático das paráfises, estamos agora, revalidando êsse gênero, com a descrição de *H. caulicolum* nobis n. sp., cujos caracteres não coincidem com os das outras espécies descritas.

HYPOXYLON BOMBACINUM Bat. & Oliveira n. sp.

Estromas superficiais, hemisférico-pulvinados 1-3 cm de diâm.,, 1-2,5 mm de altura, ou efusos, aplanados contínuos, até 25 cm de extensão, inteiramente lisos, porém com diminutas elevações, que correspondem aos ostíolos dos peritécios.

O ectostroma é vermelho-brique, opaco, quer em ambiente úmido, quer em ambiente sêco, e assa tonalidade conserva-se, não mudando para o negro, como acontece em *H. rubiginosum* Fries; a sua consistência é coriácea, quando jovem, tornando-se lenhosa à maturidade, nunca entretanto carbonácea; também conserva-se firme, não destacando-se em escamas, Fig. 2-a.

O entostroma é bem desenvolvido, aparentemente hemisférico-irregular, marrom-negro, de 50-100 u de altura, caráter que bem diferencia essa espécie de *H. rubiginosum*, cujo entostroma é muito delgado (Miller), 1928. Fig. 2-c.

O entostroma acha-se imediatamente por baixo do ectostroma, sendo de natureza pseudo-parenquimática e formado por hifas paralelas, septadas, com células de 6,5-16 x x 2,5-5,5 u, pouco constrictas, amarelas, que compõem um pseudo-tecido paliçádico, Fig. 2-g. Em sua evolução, o entostroma, perifèricamente, origina os peritécios, que assim se desenvolverão entre a porção superior do entostroma e a parte inferior do ectostroma, aparecendo, então, as "hifas de Woronine", marrom-escuras e de maior diâmetro, atingindo até 10 u de largura e afiladas para uma extremidade, das quais se originarão os ascos e paráfises; a porção basal do entostroma assenta sôbre o substrato do lenho decorticado, em conexão com o micélio intramatrical; o micélio interno inter ou intracelular, marrom-claro ou sub-hialino, penetra profundamente o lenho, com hifas de pequeno calibre, 1,5-2,5 u de diâm., Fig. 2-d e ocasiona manchas negras

Fig. 2

HYPOXYLON BOMBACINUM Batista & Oliveira n. sp.

a) ectostroma;
b) peritécios polísticos, gregários;
c) entostroma;
d) matriz;
e) detalhe da parede peritecial;
f) asco e paráfises;
g) hifas do entostroma.

Original.

de variáveis dimensões; filiformes ou irregulares, de grandes áreas.

Os peritécios são polísticos, Fig. 2-b, elipsóides, 360-550 u de altura, 300-440 u de diâm., gregários ou separados, de paredes formadas por duas camadas distintas de células poligonais, de 5-12 u de espessura: uma, externa, marrom-escura, outra interna, com células hialinas, de 4-7,5 x 4-3,5 u, Fig. 2-e; ostíolo umbilicado, ornado por paráfises delicadas.

Os ascos são cilindráceos, alongados, 1-tunicados, octosporos, 67,5-92 x 8-11 u, longo-pedunculados, com pedicelo filiforme, de 52-85 u de extensão, formados ao longo da pafiliforme, de 52-85 u de extensão, formados ao longo da parede interna dos peritécios e dispostos no sentido do ostíolo.

Paráfises abundantes, filiformes, ramificadas, aparentemente contínuas, hialinas, de 1-1,5 u de diâm. Fig. 2-f. Os ascosporos são naviculares, contínuos, lisos, monósticos, unigutulados, fuligíneos, 11-16,5 x 8-11 u.

Não encontramos estádio conidial.

Sôbre lenho decorticado de *Bombax pentaphyllum* Vell. — Ponte Uchoa, Recife — Leg. A. Fernandes Vital, 19. 8.56. Tipo 5751, I.M.U.R., Pernambuco — Brasil.

Stromata superficialia, vel hemisphaerico pulvinata, 10-30mm diam, 1-2,5mm alt., effusa, applanata, continua, usque 25cm long, laevia.

Ectostromata purpurea, lignosa; entostromata bene evoluta, atro-brunnea, 50-100u alt. pseudo-prosenchymatica, ex hyphis parallelibus, septatis, flavidis et ex cellulis 6,5-16 x 2,5-5,5u efformata.

Mycelium internum intramatricale, ex hyphis brunnescentibus vel subhialinis, 1,5-2,5u cr. compositum.

Perithecia polysticha, gregaria vel isolata, ellipsoidea, 360-550u alt. 300-440 u diam., cum parietibus 2-stratosis, 5-12u crassis et cum ostiolo umbilicato, periphysibus ornato.

Asci cylindracei, elongati, 1-tunicati, 8-spori, 67,5-92 x 8-11u, longe pedunculati, pedunculo filiformi 52-85u long.

Paraphyses numerosae, filiformes, ramosae, continuae, hyalinae 1-1,5 cr. Ascosporae naviculares continuae, fuliginae, laeves, monostichae, uniguttulatae, 11-16,5 x 8-11u.

Satus conidialis non visus.

In truncis decorticatis *Bombacis pentaphylli* Vell. Ponte Uchoa, Recife. Leg. A. Fernandes Vital, 19/8/56. Typus, 5751, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil.

Obs.: O fungo em tela pertence à série de ascostromas lenhosos, com ectostroma vermelho ou púrpura, entostroma escuro e ostíolo umbilicado (Miller).
Distingue-se de *H. coccineum* e de *H. rubiginosum*, inclusive variedades, pelo tamanho dos ascos e ascosporos, bem como pelas proporções maiores do entostroma.

É próximo de *H. starbeckii* Ferd. & Winge, do qual se diferencia pelo estíolo umbilicado e peritécios menores.

Consultar: J. H. Miller — Biologic studies in the Sphaeriales, *in* Mycologia, vol. XX, 6, págs. 305-338, il. 1928.

MASSALONGIELLA PLEUROSTOMA Starb.

Essa espécie, que é provàvelmente um *Enchnoa*, examinamo-la sem resultado, de vez que os peritécios se mostraram vazios.

Material de "Fungi Exsiccati", sôbre ramos de *Rosa* sp. Suécia, Oleandiae. Leg. K. Starback, 3.6.1888, cedido pelo Mus. Bot. Stockhl.

A. Chaves Batista e A. Fernandes Vital, 8.3.957.

OPHIODOTHELLA CIRCULARIS (Bres.) Petrak.
in Sydowia, Ann. Mycol. V: 339: 1951.

Sin.: *Scolecodothis circularis* (Bres.) Th. & Sy.
Th. & Syd. — *in* Ann. Myc. XIII: 413, 1915.
Sacc. — *in* Syll. Fung. XXIV: 630, 1926.

Cocconia sphaerica Rick
Rick — *in* Rick, Fungi Austro-Americani, n.° 72, 1905.

Oxydontis circularis Bres.
Bres. — *in* Ann. Myc. IV: 311, 1906.

Estromas hipófilos, imersos, negros, brilhantes, isolados ou confluentes; via de regra, desenvolve-se um estroma central, ao redor do qual aparecem outros estromas que, por crescimento, se fusionam num estroma único, alcançando até 7 mm de diâm.; na sua superfície, observam-se saliênciam arredondadas, correspondentes aos lóculos; são carbonáceos, de estrutura opaca, pluriloculares, Fig. 3-a; lóculos globoso-depressos, 393-562 u de diâm., e 247-330 u de altura, limitados por paredes de 22-45 u de espessura, marrom-negras, opacas; clípeo negro, de 56-90 u de espessura; ostíolo mal definido, Fig. 3-b.

Ascos fusóides, curto - pedicelados, 8 - esporos, 70 - 102 x x 17,5-23, 1-tunicados; paráfises filiformes, ramificadas, septadas, Fig. 3-c.

Ascosporos fusóides, direitos ou encurvados, contínuos, paralelos, 57,5-67,5 x 4-5 u, hialinos.

Sôbre fôlhas de "Uva vermelha", São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Rick, Fungi Austro-Americani — 72, Tipo U. S. National Fungus Collection, U. S. A.



Fig. 3

OPHIODOTHELIA CIRCULARIS (Bres.) Petrak
a) Lóculos periteciais 60 x
b) Lóculo peritecial e clípeo 200 x
c) Asco e paráfises.
Original.

Examinamos, também, o material S/N. Herb. Prof. Pe. Camille Torrend (Herbário do Colégio de Campolide), sôbre planta indeterminada, Brasil, J. Rick; determinado como *Cocconia sphaerica* Rick. Mat. n.° 7757 no Herbário do I.M.U.R., Pernambuco, Brasil.

PHYSALOSPORA NERII Pass.
in Diagn. F. N. I. n.° 5
in Syll. Fung. IX: 592.

Peritécios corticais, imersos ou irrumpentes, espalhados ou gregários, marrom-negros, pseudo-ostiolados, sub-globosos, 137-222 u de diâm., 110-165 u de altura, membranosos, com paredes de 29,5-37 u de diâm., formadas por células poligonais ou sub-globosas, 5,5-12 x 3-8 u, glabros, unilocu-

lares. Das paredes periteciais ramifica-se o micélio interno, que penetra profundamente nos tecidos, com hifas marrom-negras, septadas, constrictas ou não, tendo células de 12-24,5 x 2,5-6 u, Fig. 4.

Ascos clavados ou cilindro-clavados, longo-estipitados, 8-esporos, 2-tunicados, 93,5-130 x 18-21 u.

Paráfises ramificadas, septadas, fragmentárias, espessas e abundantes, 4,5-5 u de diâm.

Ascosporos oblongo-elípticos, dísticos, gutulados, hialinos,, 18-25 x 5-8 u, Fig. 5.

Sôbre caule de *Nerium oleander* — Porto Santo, Madeira, associado a *Rhabdospora oleandri* Dur. & Mont. e *Fumago vagans* Pers. ex Sacc. Leg. A. Cesar de Noronha, Nov. 1910.

Obs.: Êsse espécimen achava-se identificado sob o nome de *Capnodium nerii* Rab., no Herb. Prof. Pe. Camille Torrend, S. J., doado ao Instituto de Micologia da Universidade do Recife, n.° 6055.



Fig. 4

PHYSALOSPORA NERII Pass.

Peritécio imerso.

Original.



Fig. 5

PHYSALOSPORA NERII Pass.
Asco, paráfises e ascosporos.

PLEOSPORA KANSENSIS E. & E.
in Jour. Myc. 8: 17, 1902.

Sin.: *Pyrenophora antarctica* Speg. Fungi Pat. *in* (Bol. Acad. Cien. Cordoba, 11: 51, 1887.
Pleospora antarctica (Speg.) Sacc. *in* Syll. Fung. IX: 877, 1891.

Peritécios sub-epidérmicos, isolados, globosos, colabentes, 167-214 u de diâm., membranosos, negros, paredes marrom, um pouco transparentes, pseudo-parenquimáticas, de cêrca de 10 u de espessura, formadas por células poligonais de 3,5-9 u na maior dimensão, providas de ostíolo mal definido e eventualmente com um tufo de hifas marrom, até 40 u de altura, Fig. 6a.



Fig. 6

PLEOSPORA KANSENSIS E. & E.

a) Região ostiolar do peritécio 450 x
b) Asco, paráfises e ascosporos.

Orig.

Ascos cilindro-clavados, 67,5-75 x 17,5-20 u, octosporos, sésseis ou curto-pedicelados, bitunicados; paráfises hialinas, filiformes, septadas e ramificadas, 1,5-2 u de diâm.

Ascosporos fusóide-elipsóide ou clavado-elipsóides, polo superior mais rotundo que o inferior, marrom-claros, 3-4 septado longitudinalmente em uma ou mais células, 17,5-20 x x 7,5-9 u, dísticos ou irregularmente unisseriados, Fig. 6-b.

Sôbre caule de *Asparagus* sp., associado a *Polystomella caulicola* Doidge. Banks of Orange River, Aliwal North, Leg. P. J. Pienaar, 11.1.1912. Espec. n.° 2093, Union of South Africa, Dept. of Agri. Mycol. Herb.

Consultar também Wehmeyer, L. E. — Studies in the genus Pleospora V — *in* Mycologia, 45: 400, 1953.

POROSTIGME CAULICOLA Bat. & Oliveira n. sp.

Subículo escasso, superficial, marrom-negro, constituído por hifas ramificadas irregularmente, lisas, septadas, com células de 5,5-20,5 x 3-7 u, sem setas e sem hifopódios.

Peritécios superficiais, assentes no lenho descorticado, gregários a cespitosos, carbonáceos, oblongos ou oblongo--deprimidos, 640-690 u de altura, 315-565 u de diâm., ástomos, uniloculares, negros, glabros, de paredes espessas. 28--180 u de diâm., com várias camadas de células, destacando-se a camada externa, com células poligonais, de 18,5--28 x 5,5-16,5 u. Fig. 7-a.

Micélio interno desenvolvido a partir da base do peritécio, pouco notado e constituído por hifas marrom, septadas, com células de 15-25 x 6-10 u. Fig. 7-b.

Ascos unitunicados, cilindráceos, ou elípticos, 8-esporos, 32,5-50 x 10-12,5 u, com pedicelo filiforme, de 30-60 u de extensão; paráfises ausentes.

Ascosporos elipsóides, 1-septados, não constrictos, lisos, marrom, 9-12 x 3-4,5 u. Fig. 7-c.

Sôbre ramos de planta desconhecida — Caruaru — Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 16.9.56. Tipo, 2493, Instituto de Micologia, Universidade do Recife. Det. A. Chaves Batista & T. J. Oliveira.

Subiculum parvum, superficiale, atro-brunneum, ex hyphis, irregulariter ramosis, levis, septatis, ex cellulis 5,5-20,5 x 3-7u, non setosis, non hyphopodiatis compositum.

Perithecia superfialia, in ligno insidentia, gregaria vel caespitosa, carbonacea, oblonga vel oblongo-depressa, 640-690u alt., 315-565u diam., astoma, uniloculata, atra; paries 28-180 u cr., pluri-stratosus, ex cellulis polygonalibus, 18,5-28 x 5,5-16,5u, efformatus.

Mycelium intramatricale, brunneum, ex hyphis septatis et ex cellulis 15-25 x 6-10u, compositum.



Fig. 7

POROSTIGME CAULICOLA Batista & Oliveira n. sp.

a) Peritécios gregários;
b) hifas do subículo;
c) asco e ascosporos.

Asci cylindracei vel ellipsoidei, 8-spori, 1-tunicati, 32,5-50 x 10-12,5u, longe pedicellati, 32,5-50 x 10-12,5u, longe pedicellati, 30-60u ext. aparaphysati.

Ascosporae ellipsoideae, 1-septatae, non constrictae, laeves, brunneae, 9-12 x 3-4,5u.

In ramulis descorticatis plantis ignotae, Caruaru — Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 16/9/56. Typus, 2493, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil.

Obs.: A espécie em foco diferencia-se de *P. scheffleri* (P. Henn.) Syd., por seus peritécios avantajados, e de *P. microspora* Toro, por seu hábito de vida diferente e ascosporos de maiores proporções.

TRABUTIA BASANACANTHEANA Bat. n. sp.

Estromas negros, de 0,5-5 mm de diâm., espalhados ou agrupados, hipófilos, uniloculares, quase hemisféricos, sem poro apical distinto. O clípeo é negro, sub-cuticular, liso, compacto, 38-82 u de espessura, na região superior, e 165-

Fig. 8

TRABUTIA BASANACANTHEANA Batista n. sp.

a) Ascostromas subcuticular;
b) Ascos e paráfises;
c) Ascosporos.

-220 u de larg., lateralmente, opaco, carbonáceo, distinto para cada lóculo; acha-se em conexão com escasso micélio interno, de hifas septadas, constrictas, sub-hialinas, inter e intracelulares com células de 7,5-13 xx 3,5-4,5 u. Lóculo subgloboso ou hemisférico, 187-275 u de diâm., e 81,5-137 u de altura, Fig. 8-a.

Ascos obovóides a elipsóides, sésseis, 2-tunicados, 6-8 esporos, 33-58 x 7,5-17,5 u.

Paráfises filiformes, simples, contínuas, 1-2 u de diâm. Fig. 8-b.

Ascosporos elipsóides, contínuos, raros, unigutulados, polísticos, hialinos, 9,5-13,5 x 5,5-6,5 u, Fig. 8-c.

Sôbre fôlhas de *Basanacantha* sp. Parecis — Mato Grosso, J. Rick. 1924. Tipo, n.° 11222, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil e isotipo em The National Fungus Collection, U. S. A.

Obs.: O material em tela nos foi enviado, gentilmente, pelo Dr. John A. Stevenson, a quem consignamos os nossos agradecimentos.

Stromata atra, 0,5-5mm diam., sparsa vel gregaria, hypophylla, uniloculata, hemisphaerica.

Clypeum atrum, sub-cuticulare, leve, compactum, 38-82 cr. et lateraliter 165-220 u cr. opacum, carbonaceum.

Mycelium endogenum inter et intracellulare, epidermale usque mesophyllum, ex hyphis septatis, constrictis, sub-hyalinis et ex cellulis, 7,5-13 x 3,5-4,5u efformatum.

Asci obovoidei vel ellipsoidei, sessiles, 2-tunicati, 6-8-spori, 33-58 x 7,5-17,5u.

Paraphyses filiformes, simplices, continuae, 1-2u cr.

Ascosporae ellipsoideae, continuae, rarae 1-guttulatae, hyalinae, 9,5-13,5 x 5,5-6,5u.

In foliis *Basanacanthae* sp. Parecis — Mato Grosso. Leg. J. Rick. 1924. Typus, n.º 11222, I.M.U.R., Pernambuco. Brasil et isotypus in The National Fungos Collection, U.S.A.

SUMMARY

The A.A. have studied in this paper the following Ascomycetes: *Haplothecium culicolum* Bat. & Vital n. sp., *Hypoxylon bombacinum* Bat. & Oliveira n. sp., *Massalongiella pleurostoma* Starb., *Ophiodothella circularis* (Bres.) Petrak, *Physalospora nerii* Pass., *Pleospora kasensis* E. & E. *Porostigme caulicola* Bat. & Oliveira and *Trabutia basanacantheana* Bat. n. sp.

I. SOC. BIOL. PERNAMBUCO
I. XVI, n.º I, págs. 129-140, 1959

NOVOS E ANTIGOS FUNGOS *MICROTHYRIACEAE* *

Chaves Batista — *G. E. P. Peres*
A. Amaral Costa ** — *F. B. Leal*

Estão reunidos neste trabalho alguns novos fungos Microthyriaceae e antigas espécies dessa mesma família, que emos o ensejo de reexaminar, à luz da conceituação moderna de suas características, e com apoio da análise histórica.

Aulographella v. Hohnel é gênero agora enriquecido de ais uma espécie — *A. anthurii* Bat. *Aulographum tropile* Rehm é redescrito como *Ptychopeltis tropicalis* (Rehm) t. & Leal n. comb.

Asterinella tecleae Doidge é reconhecido como *Echidnos tecleae* (Doidge) Bat., Nasc. & Peres.

Beelia Stev. & Ryan, até então monotípico, aparece com na nova espécie, sôbre hospedeiro desconhecido e originário das Filipinas — *B. philippinensis* Bat. & Costa. *Caloltis jasmini* Doidge é confirmado na plenitude dos caracteres que lhe haviam sido atribuídos.

O gênero *Echidnodella* é ampliado com a espécie *E. guamalensis* Bat., Nasc. & Peres.

Também é descrita uma nova espécie de *Microthyrium*, sob o binômio de *M. cordiae* Bat., Peres & Leal.

---

* Publicação n.º 105 — Instituto de Micologia da Universidade do Recife.

** Da Faculdade de Medicina e Cirurgia de Belém — Pará, em estágio no Instituto de Micologia, da Universidade do Recife.

AULOGRAPHAELLA ANTHURII Bat. n. sp.

Micélio livre ausente.

Ascostromas epífilos, superficiais, lineares, 265-600 x 90--100 u, isolados ou confluentes, marrom-negros, fendilhados longitudinalmente, com fenda de 30-45 u de largura, expondo numerosos ascos; parede superior membranosa, sub-parenquimática, formada por hifas radialmente dispos-

Fig. 1

AULOGRAPHELLA ANTHURIAE Bat. n. sp.

Ascostroma, asco e ascosporos.

Orig.

tas, tendo células retangulares e poligonais, de 3,8-6,5 x 2-3 u; margens peliculosas, hialinas, até 85 u de extensão; parede

sal inconspícua. Ascos ovóides, 2-tunicados, 8-esporos, sésis ou curto-pedicelados, 19-21 x 10-13,5 u, aparafisados.

Ascosporos oblongo-clavados, 1-septados, célula distal obosa e basal cilindrácea, polísticos, hialinos, 6,5-9 x 3-4 u, g. 1.

Sôbre fôlhas vivas de *Anthurium* sp., associado a *Lepthyrium anthuriae* n. sp. e outros. Vitória. Leg. Severino sé da Silva, 24.1.56. Tipo 5285, I.M.U.R., Pernambuco, rasil.

Mycelium liberum nullum.

Ascostromata epiphylla, superficialia, linearia, 265-600 x 90-100u, isolata l confluentia, atro-brunnea, longitudinaliter dehiscentia, rima 30-45 u m.; paries superior membranosus, sub-parenchymaticus, ex hyphis radiaer dispositis et ex cellulis rectangularibus vel polygonalibus, 3,5-6.5 x 2-3u positum; cum marginibus pelliculosis, hyalinis, usque 85u long; paries salis inconspicuus.

Asci ovoidei, 2-tunicati, 8-spori, sessiles vel curto-stipati, 19-21 x 10-13,5u, raraphysati.

Sporae oblongo-clavatae, 1-septatae, cum cellula distali globosa et basali indracea, polystichae, hyalinae, 6,5-9 x 3-4u.

In follis vivis *Anthurii* sp. Soc. iniens cum Leptothyrio anthuriae n. sp. ctoriae. Leg. Severino José da Silva, 24/1/56. Typus 5285, I.M.U.R., rnambuco, Brasil.

EELIA PHILIPPINENSIS Bat. & Costa n. sp.

Micélio superficial, hipófilo, escasso, marrom; hifas sepdas, não constrictas, 2,5-4 u de diâm., dispostas em tôrno os ascostromas, não setosas nem hifopodiadas, Fig. 3-a.

Ascostroma superficial, disperso, escutelar, 230-255 u de âm., marrom, semitransparente, com um ostíolo circular central, 8--1 u diâm., Fig. 3-b; paredes compostas por célas radiadas, 2,5-6,5 x 2,5-3,5 u.

Ascos clavados a sub-cilíndricos, 2-tunicados, 4-esporos, sseis, 26,5-32,5 x 9-14 u, aparafisados.

Ascosporos cilindráceos, 3-5 transversalmente septados, nstrictos, polísticos, hialinos, 11-14 x 2,5-4 u, Fig. 3-c.

Tipo, sôbre hospedeiro desconhecido. Luzon, Philippine lands, July 1916, n.° 16533, no Herbarium Bogoriense, gor.

Pelo estudo desta espécie somos gratos a Miss S. M. jitrasoma, daquele Herbarium. Det. 19.7.1956, em colaboação com o Dr. Carlos A. Costa, da Faculdade de Medicina Cirurgia, Belém, Pará, Brasil.

Mycelium hypophyllum, superficiale, ascostromata circundantibus, rarum, unneum, ex hyphis septatis, non constrictis, 2,5-4u cr, non setosis, non phopodiatis compositum.



Fig. 3

BEELIA PHILIPPINENSIS Batista & Costa n. sp.

a) Ascostromas e micélio superficial
b) Ascostroma
c) Ascos e ascosporos.

Original.

Ascostromata superficialia, sparsa, rotundata, scutata, 230-255u diam., brunnea, semi-translucida, cum ostiolo centrali 8-11u diam.; paries superior radiatus, ex cellulis 2,5-6,5 x 2,5-3,5u efformatus.

Asci clavati vel sub-cylindracei, 2-tunicati, 4-spori, sessiles, 26,5-32,5 x 9,14u. aparaphysati.

Sporae cylindraceae, 3-5 transversaliter septatae, constrictae, polyschae, hyaline, 11-14 x 2,5-4u. Typus. In planta ignota. Luzon, Philippine. July 1916. Herbarium Bogoriense, n.º 16533.

CALOPELTIS JASMINI Doidge

Doidge, *in* Bothalia, vol. IV: 277, 1941.

Micélio livre ausente.

Colônias epífilas, marrom-negras, superficiais, circulares ou semi-circulares, epífilas, isoladas ou confluentes, com 3-5 mm de diâm.

Ascostromas orbiculares, escutelares, marrom-negro, superficiais, isolados a princípio, depois confluentes, formando ladeiras crostas; individualmente medem de 110-165 u diâm. e 50 u de alt., com ostíolo central, irregular, 14- u de diâm.; parede superior radiada, formada por célu- restangulares, de 3-5 x 1,5-2,5 u; margens em franjas, hifas de 7-15,5 u de comprimento; parede basal tênue, ina.

Ascos elipsóides a piriformes, 2-tunicados, 8 esporos, eis, 41,5-55,5 x 12,5-15,5 u; paráfises fibrosas, dispersas, inas.

Ascosporos oblongo-clavados, hialinos, com 1-septo me- o, transversal, dísticos, de células desiguais, polos rotun- com 11,5-15 x 4-5 u.

Sôbre fôlhas de *Jasminum streptopus* — Durban, Leg. lley Wood.

.: Graças à colaboração de Dr. Talbot, de Union of South Africa, Herb. Myc. Def. of Agr., foi-nos possível examinar o espécimen tipo dêsse fungo, sob n.° 9516, de cujo exame resultou a redescrição ora apresentada.

HIDNODELLA GUATEMALENSIS Bat., Nasc. & Peres, n. sp.

Plágulas marrom-negras, epífilas, superficiais, tênues, ulares, isolados ou confluentes, 2-8 mm de diâm.

Micélio marrom, superficial, septado, não setoso, não podiado, radiado, de hifas retilíneas, pouco flexuosas, nadas de células de 15-40 x 6-7,5 u; ramificações opostas unilaterais, em ângulos de 45 a 90°; haustórios sub-cuti- ares a sub-epidermais, volumosos, marrom, originados di- amente do micélio e semelhantes aos haustórios, que se ginam dos ascostromas.

Ascostromas epífilos, a princípio semi-circulares, depois ares, abrindo-se em fenda longitudinal, glabros, conflu- es, marrom-negros, membranosos, de 270-450 x 200-220 parede superior radiada, formada de células retangulares 3,5-8 x 2,5-4 u; bordos franjados, com células de 11-25 x ,5-7 u; parede basal tenuíssima, marrom-clara, conectada a haustórios sub-cuticulares a sub-epidermais, sub-globo- , contínuos, marrom, 10-15 u de diâm., Fig. 5-a.

Ascos globosos ou ovóides, sésseis, 2-tunicados, 8-espo- , 45-49 x 32-40,5 u, aparafisados, Fig. 5-b.

Ascosporos rotundo-cilindráceos ou ligeiramente clavados, com 1 septo transversal mediano, constrictos, polísticos, marrom, 25-30 u x 13,5-17 u, Fig. 5-c-d.

Sôbre fôlhas de *Anona* sp., associado densamente *Leprieurina winteriana* Arnaud, *Phaeodimeriella parvul*



Fig. 5

ECHIDNODELLA GUATEMALENSIS Bat., Nasc. & Peres n. sp.

a) ascostromas sob corte longitudinal;
b) asco;
c) ascosporos;
d) ascosporos em germinação.

Original.

(Cke.) Hansf. var. *echidnodellae* Bat. & Nasc. *Helminthosporium* e *Catenularia*. Dept. Santa Rosa, perto de El Molino, Guatemala. Leg. Paul C. Standley, Nov. 26, 1940. Tipo n.° 78349, The National Fungus Collection e isotipo n. 11001, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil, doado pelo Dr. John A. Stevenson.

Plagulae atro-brunneae, epiphyllae, superficiales, singulatae vel confluentes, 2-8mm diam., rotundatae.

Mycelium brunneum, septatum, non setosum, haud hyphopodiatum, e hyphis rectilineis, parum flexuosis, oppositis vel unilateraliter ramosis (ang

90.°) compositum, cum haustoriis, sub-cuticularibus vel epidermalibus ex hyphis oriundis, sub-globosis, brunneis.

Ascostromata epiphylla, primo semi-circularia, longitudinaliter dehiscentia glabrata, confluentia, atro-brunnea, membranosa, 270-450 x 200-220u; paries superior radiatus, ex cellulis rectangularibus, 3,5-8 x 2,5-4u, cum marginibus fimbriatis, et ex cellulis 11-25 x 3,5-7u efformatus; paries basalis tenuissimus, brunnescens pluribus haustoriis affixus; haustoria sub-cuticularia vel epidermalia, sub-globosa, continua, brunnea, 10-15u diam.

Asci globosi vel ovoidei, sessiles, 2-tunicati, 8-spori, 45-49 x 32-40u, apahysati.

Ascosporae rotundo-cylindraceae vel clavatae, 1-septatae, non constrictae, brunneae, polystichae, 25-30 x 13,5-17u.

Dense in foliis *Anonis* sp. Soc. iniens cum *Leprieurina winteriana* Arn., *Meodimeriella parvulla* (Cke.) Hansf. var. *echidnodella* Bat. & Nasc., *Helminthosporio* et *Catenularia*. Dept. Santa Rosa, prope El Molino, Guatemala. Leg. Paul C. Standley, Nov. 26, 1940. Typus, n.° 78349, The National Fungus Collections et isotypus n.° 11001, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil.

ECHIDNODES TECLEAE (Doidge) Bat., Nasc. & Peres n. comb.

Basin.: *ASTERINELLA TECLEAE* Doidge

Doidge, *in* Bothalia IV: 316, 1942.

Colônias marrom-negras, hipófilas, superficiais, pouco densas, efusas, recobrindo irregularmente tôda a fôlha.

Micélio de hifas onduladas, marrom, septadas, não setosas, não hifopodiadas, tendo células de 5,5-27 x 2,7-5 u, sôbre os ascostromas e picnídios de *Allothyriella*. As hifas apresentam ramificações que penetram nos estomas das fôlhas, formando pequenos inchamentos, simples ou ramificados, de células marrom, dos quais derivam haustórios coralóides, que chegam até à epiderme. Fig. 7-b.

Ascostromas elipsóide-lineares, 350-450 x 180-230 u, marrom-negros, superficiais, de centro opaco, hipófilos, confluentes, raramente isolados. Fig. 6-a, agrupados com os picnídios de *Allothyriella*, dos quais se distinguem mui difícilmente; ástomos, abrindo-se em fenda longitudinal; membranosos, sub-parenquimáticos, de células retangulares, radialmente dispostas, com 3,5-6 x 2,5-4,5 u; margens franjadas, com hifas de 8-10 u de comprimento; membrana basal inconspícua.

Ascos sub-globosos ou ovóides, sésseis, 2-tunicados, 8-esporos, 36-39 x 24-27 u. Paráfises hialinas, septadas, simples, 1,5-2 u de diâm. Fig. 6-b.

Ascosporos sub-clavados, 1-septados, pouco ou nada constrictos, célula superior oblonga e basal sub-truncada,

a princípio hialina, depois marrom, 20-26,5 x 7,5-10 u, Fig. 6-c.

Sôbre fôlhas de *Teclea nobilis* — Entebbe Road, Uganda, Leg. C. G. Hansford. Nov. 1943.

Êsse espécimen foi det. como *ASTERINELLA TECLEAE* Doidge por Hansford, n.° 34783, Myc. Herb. Dep. Agr. Union of South Africa.

Fig. 6

ECHINODES TECLEAE (Doidge) Bat., Nasc. & Peres.

a) ascostroma e micélio;
b) asco e paráfises;
c) ascosporos.

Não vimos a espécie tipo, de Doidge, mas ante a autenticidade do espécimen de Hansford, que ora estudamos, graças à gentileza do Dr. Talbot, de Union of South Africa, reconhecemos êsse fungo como *Echinoides*. A frutificação

idial associada constitui o fungo *ALLOTHYRIELLA TE-AE* n. sp.



Fig. 7

ECHIDNODES TECLEAE (Doidge) Bat., Nasc. & Peres.

a) Corte transversal de um acostroma, e haustórios da hifa marginal;
b) hifa penetrando pelo estoma foliar.

Orig.

Est *ECHIDNODES* per ascostromata linearia, ascos paraphysatos et mycelium liberum non hyphopodiatum.

CROTHYRIUM CORDIAE Bat., Peres & Leal n. sp.

Micélio externo ausente.

Micélio interno com haustórios sub-globulares, de disposição sub-cuticular a sub-epidermal, hialinos.

Ascostromas epífilos, em áreas esbranquiçadas, de 1-5 mm diâm., isolados ou em grupos de 2 e 3, plano-escutelares, secção circular, 87,5-170 u de diâm., marrom-negros de iscência estelar-irregular, de bordos inteiros, aderentes à iderme; parede superior membranosa, radiada, com fileis de células sub-retangulares, de 4-7,5 x 2,5-5 u, Fig. 4-a; imênio simples; parede inferior gelatinosa, inconspícua.

Ascos sub-globosos ou elipsóides, pouco numerosos, sés-

seis, 2-tunicados, 8-esporos, 27-37,5 x 24-30 u, Fig. 4-b. Pa-
ráfises filiformes, simples e ramificadas, septadas, 1-1,5 d
diâm.

Ascosporos ovóides, 1-septados, constrictos, hialinos, d
polos rotundos, conglobados, 15-20 x 7-9 u, Fig. 4-c.



Fig. 4

MICROTHYRIOLUM CORDIAE Bat., Peres & Leal n. sp.

a) tiriotécio;
b) asco;
c) ascosporo.

Original.

Sôbre fôlhas vivas de *Cordia goeldiana* — Inst. Agron.
Norte — Belém — Pará. Leg. A. Fernandes Vital, 28.1.55.
Tipo, 2123, I.M.U.R., Pernambuco — Brasil.

Mycelium liberum nullum.
Mycelium internum sub-cuticulare vel sub-epidermicum, hyalinum, cum oriis sub-globosis.
Ascostromata epiphylla, in areis albidis, isolata vel in 2-3 associata, -scutata, cum sectione circulari, 87,5-170u diam., brunnea-fuliginea, as-ta, irregulariter dehiscentia ad maturitatem; paries superior radiatus, llulis sub-rectangularibus, 4-7,5 x 2,5-5u efformatus; paries inferior ge-osus, inconspicuus.
Asci-sub-globosi vel ellipsoidei, 30-37,5 x 25-30, pauci numerosi, 8-spori, es; paraphyses filiformes, simplices et ramosae, septatae, 1-1.5cr.
Sporae ovoideae, 1-septatae, hyalinae, ad polos rotundatae, conglobatae, 7,5 x 5-7,5.
In foliis vivis *Cordiae goeldianae* — Inst. Agron. Norte. Leg. A. Fer-es Vital, 28/1/55. Typus, 2123, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil.

PTYCHOPELTIS TROPICALIS (Rehm) Bat. & Leal n. comb.
Hedw. XI: 210, 1900.
: *AULOGRAPHUM TROPICALE* Rehm.

Micélio superficial, tendo hifas ramificadas, marrom-aras, com células de 50 x 2-3 u, distribuídas ao redor dos ostromas, Fig. 2; setas e hifopódios ausentes.

Fig. 2

PTYCHOPELTES TROPICALIS (Rehm) Bat. & Leal n. comb. Ascostromas e hifas do micélio. — 430 x
Original.

Ascostromas histeriforme-alongados, mais freqüentemen-irregulares ou agregados em formas bizarras, 330-730 u

de extensão, com 60-90 u de largura, e fenda longitudinal direita ou encurvada, estreita, de 10-20 de diâm., anfígenos, localizados na margem do limbo foliar, sésseis, dimidiados, negros, de contexto radiado.

Ascos ovóides, de ápice bastante espêsso, octosporos, de 17-23 x 8-10 u; paráfises filiformes, hialinas.

Ascosporos claviformes, 1-septados, constrictos, de células desiguais, sendo a basal alongada, de polo agudo, 7-11 x x 2,5-3 u hialinos.

Sôbre fôlhas vivas de imbé de fonte — *Philodendron imbe* Schott, associado a outros fungos. Espec. n.° 1151, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil.

Nota: O fungo em tela apresenta ascostromas mais longos do que vem assinalado no Sylloge Fungorum, 16: 660--661, 1902.

ABSTRACT

Under the taxonomic point of view the following Microthyriaceae are studied in this paper:

AULOGRAPHELLA ANTHURII Bat. n. sp. on *ANTHURIUM* sp., *BEELIA PHILIPPINENSIS* Bat. & Costa n. sp. on unknown host, *CALOPELTIS JASMINII* Doidge, on *JASMINUM STREPTOPUS*, *ECHIDNODELLA GUATEMALENSIS* Bat., Nasc. & Peres n. sp. on *ANONA* spL *ECHIDNODES TECLEAE* (Doidge) Bat., Nasc. & Peres n. comb. on *TECLEA NOBILIS*, *MICROTHYRIOLUM CORDIAE* Bat., Peres & Leal on *CORDIA GOELDINA* and *PTYCHOPELTIS TROPICALIS* (Rehm) Bat. & Leal n.° comb.

1959

AN. SOC. BIOL. PERNAMBUCO
Vol. XVI, n.º I, págs. 153-159, 1959

153

UMA NOVA DOENÇA FÚNGICA DE PEIXE ORNAMENTAL *

A. Chaves Batista *H. da Silva Maia*

Espécimens enfermos de *Carassisus auratus*, que tivemos o ensejo de observar, apresentavam um granuloma na região anterior da barbatana dorsal, com descoloração das escamas adjacentes.

Nos animais em foco ocorriam movimentos natatórios irergulares, lentos, com leves torções corporais, em virtude do mau funcionamento da citada barbatana.

Sacrificados os animais, inóculos procedentes do granuloma foram semeados em meio de Sabouraud-Dextrose-Agar, com acromicina, tendo sido obtidas culturas puras do fungo que ora descrevemos, como novo gênero, na família Stilbaceae.

Idênticos cultivos foram também obtidos através do plantio de material coletado dos granulomas, quando vivos os animais.

GIBELLULOPSIS Batista & Maia, n. gen.
Tipo: *G. piscis* nobis

Micélio filamentoso-cotonoso, de hifas septadas, hialinas. Sinêmios cilindro-cônicos, hialinos, formados por hifas frouxas, de disposição longitudinal. Conidióforos hialinos, simples e verticilados, produzindo profialídeos e fialídeos que terminam em cabeças ou glomérulos de esporos. Conídios contínuos, hialinos, aglutinados em substância mucosa. Parasita de peixe.

---

* Publicação n.º 106 — Instituto de Micologia, **Universidade do Recife.**

Typus: *G. piscis* nobis
Mycelium filamento-cottonosum, ex hyphis septatis, hyalinis compositum. Synnemata cylindraceo-conica, hyalina, ex hyphis laxis, longitudinaliter dispositis, efformata. Conidiophori hyalini, simplices vel verticillati; prophialidei et phialidei in sporis glomerulis terminati. Conidiae continuae, hyalinae, substantia mucosa aggregatae. In *Piscibus* parasitans.

É o gênero em causa afim de *Gibellula* Cavar. do qual difere, essencialmente, pela disposição dos glomérulos de conídios e constituição dêstes, que não obedece a qualquer arranjo regular.

GIBELLULOPSIS PISCIS Batista & Maia, n. sp.

Desenvolve-se sôbre o meio de Czapek-agar, a 3%, produzindo colônias brancas, filamentoso-cotonosas, umbonadas ao centro, de 3,5-4 cm de diam., aos 10 dias; essas colônias



Fig. 1

GIBELLULOPSIS PISCIS Bat. & Maia

Granuloma sôbre Carassisus auratus

são de margens planas, filamentosas, inconspícuas, com exsudato hialino, diminuto; o reverso é liso, plano, branco ou levemente róseo; odor ausente. O micélio vegetativo é constituído de hifas aéreas e submersas, septadas, hialinas,



Fig. 2

GIBELLULOPSIS PISCIS Bat. & Maia

Granuloma sôbre Carassisus auratus

pouco ramificadas, de 2-3 u de diam. Os sinêmios formam-se à superfície das colônias, pela reunião de muitas hifas eretas, que se associam frouxamente, no sentido longitudinal, compondo uma estrutura cilindro-cônica de 480-610 u de altura, 24-36.5 u de diam. basal, sendo-lhes o ápice o prolongamento de uma ou mais hifas apenas. Das hifas dos sinêmios independenciam-se, lateralmente, numerosos conidióforos, septados ou não, de 260-300 x 2.5-3 u, à semelhança de *Gibellula*, com profialídeos e fialídeos de 25-38 x x 1-2 u, em verticilos opostos, de 2-3, ou alternadamente. Glomérulos de esporos terminais, à maneira de "cabeças", globosos, 10-13.5 u de diam. Conídios elipsóides, ovóides ou cilindráceos, contínuos, hialinos, 5-5.5 x 1.5-2 u, produzidos sucessivamente e aglutinados em substância mucosa.

Parasita de peixe vermelho, ornamental — *Carassisus*

auratus, produzindo tumores na região mediana, lateral. Leg. José Batista de Oliveira, Recife, 28.7.957. Tipo n.° 891, em cultura e sôbre papel. I.M.U.R., Pernambuco Brasil.



Fig. 3

GIBELLULOPSIS PISCIS Batista & Maia n. sp.

Conidióforos, fiálides e glomérulos de conídios.

Coloniae albidae in Czapeki-agaro, filamentose-cotonosae, umbonatae, 3,5-4 cm diam. (10 d.), cum marginibus planis, filamentosis, inconspicuis, odoreque carentes; reversus planus, laevis. Mycelium ex hyphis aereis et submersis, septatis, hyalinis, pauci ramosis, 2-3 u diam., compositum. Synnemata superficialia, cylindro-conica, prosenchymatica, laxa, 480-610u alt., 24-36.5u in basali diam., apicaliter filiformia, ex hyphis longitudinaliter aggregatis composita. Conidiophori laterales, septati vel non, 260-300 x 2.5-3 u. Prophialidei et phialidei verticillati 2-3 vel alternatim, 25-38 x 1-2 u. Sporae cum glomerulis terminalibus, globosis, 10-15 u diam. Conidiae ellipsoideae, ovoideae vel cylindraceae, continuae, hyalinae, 5-5.5 x 1.5-2 u, in substantia mucosa agglutinatae. — In piscibus parasitans — *Carassisus auratus*. Recife. Leg. José Batista de Oliveira, 28.7.957. Typus in charis et cultis, n.° 891, I.M.U.R., Pernambuco, Brasil.



Fig. 5

GIBELLULOPSIS PISCIS Bat. & Maia n. sp.

Sinêmio.



Fig. 4

GIBELLULOPSIS PISCIS Bat. & Maia n. sp.

Conidióforos e fiálides.



Fig. 6

GIBELLULOPSIS PISCIS Bat. & Maia n. sp.

"Cabeças" de conídios.

INSTITUTO DE MICOLOGIA - UNIVERSIDADE DO RECIFE
(Publicação n. 107)

A. CHAVES BATISTA, M. L. NASCIMENTO
& E. A. F. DA MATTA *

Megaloxyphium ophidioglossum

Cif., Bat. & Nasc.

e seu cultivo artificial nos meios de laboratório

(COM 1 FIGURA NO TEXTO)

FORLÌ
TIPOGRAFIA VALBONESI
1959

A. CHAVES BATISTA, M. L. NASCIMENTO
& E. A. F. DA MATTA *

Megaloxyphium ophidioglossum
Cif., Bat. & Nasc.
e seu cultivo artificial nos meios de laboratório

(COM 1 FIGURA NO TEXTO)

MEGALOXYPHIUM OPHIDIOGLOSSUM Cif., Bat. & Nasc.

Empenhados na elucidação do problema das relações metagenéticas entre os fungos Capnodiales e as fórmas imperfeitas que lhes são associados tão frequentemente, as fumaginas, vimos estudando, de há longo, a possibilidade de cultivar tais fungos nos meios artificiais de laboratório.

À proporção que avançamos na pesquisa das características de sistemática de todos os gêneros de *Capnodiales* temos sido levados a investigar também os fungos *Asbolisiaceae*, que se integram no complexo fumagínico, pois ainda é una questão aberta a evolução dêsses fungos.

Numerosas tentativas têm sido efetuadas visando à obtenção de cultivos puros — quer das fórmas típicas de *Capnodiales*, sexuadas, raríssimas vezes obtidas, quer das fórmas imperfeitas, de Asbolisiaceae, igualmente difíceis de logradas, se é que já o foram, naquele carácter.

Deixados à margem todos os outros aspectos da biologia dêsses fungos, preocupamo-nos em conseguir, através da semeadura de ascosporos de *Trichomerium, Capnodium, Achaetobotrys, Chaetopotius*, o desenvolvimento reversivo de algum estágio de *Asbolisiaceae*, sem sucesso. Orientâmo-nos, então, no sentido inverso, buscando, com o cultivo de

* Do Instituto Biológico da Bahia.

Asbolisiaceae, a produção de estágios sexuados de *Capnodiales*. Foram baldados todos os nossos esforços, inicialmente, desde quando as semeaduras de Asbolisiaceae, quer sob fragmentos de micélio, quer sob a deposição de picnidiosporos, resultavam sempre negativas ou como cultivos mixtos, impurificáveis, na prática.

Em 1956, depois de explorar sem êxito o cultivo de uma nova espécie de Asbolisiaceae, Cif, Bat. & Nasc. descheveram na sob o binômio de *Megaloxyphium ophidioglossum* (Publ. n. 47, Inst. Micol. Univ. Recife).

A hipótese de que algum fator climático governaria a viabilidade da germinação dos picnidiosporos dêsse interessante fungo levou-nos a repetir as semeaduras de picnidiosporos e micélio, mensalmente, no Recife e em Salvador. Por fim, no período de Outubro e Novembro de 1957 logramos, quase ao mesmo tempo, cultivar *M. ophidioglossum*, tanto no Recife quanto em Salvador, utilizando inóculo proveniente do mesmo hospedeiro *Hibiscus rosa-sinensis*.

As culturas puras então alcançadas permitiram-nos apreciar o comportamento dêsse organismo sôbre diferentes meios artificiais de laboratório, com as suas diversificações de morfologia, mas não originaram até agora, siquer esboços de estruturas sexuadas. De qualquer maneira, parece-nos que os dados recém-obtidos têm significação importante para o eventual esclarecimento das condições próprias para a viabilidade dos cultivos artificiais dos fungos de fumagina. Aparentemente, funcionariam os fatores bioambientais como intervenientes na completa formação de reservas estimulativas da moltiplicação de estruturas de fungos dêsse grupo, nos meios de laboratório. O índice de humidade relativa do ar, menor do que 60%, a temperatura do ar de 24-26°C e a do solo de quase 30°C, interfeririam sôbre o fungo diretamente, permitindo lhe enrique cimento maior das substâncias nutritivas, ao passo que o hospedeiro, exposto às mesmas condições climáticas e mais ainda a um alto coeficiente de luminosîdade e sobretudo de exsudação, garantiria, nesse caso, os necessários fatores de crescimento, ajustadores de uma pronta maturidade das estruturas fúngicas que hospeda. Isso explicaria os resultados positivos atingidos nos cultivos de *M. ophidioglossum* sòmente no período de Outubro a Fevereiro, em que são prevalentes os requisitos bioambientais ora sumarizados.

Da semeadura de pequenos fragmentos de micélio ou de picnidiosporos de *M. ophidioglossum* advém o início da costituição de colônias já ao 3° dia, nos meios usuais de laboratório. De então por diante processa-

se o desenvolvimento dessas colônias, em placas de Petri, conforme relatamos a seguir, para as condições de temperatura ambiente de 23-25°C.

Sôbre Sabouraud-agar. — Aos lo dias as colónias têm 2,5 cm de diâm., apresentando-se rotundas, negras, velutinas, de área central irregularmente elevada e bordos radialmente sulcados, recobertos de uma poeira esbranquiçada, de picnidiosporos imaturos, ainda hialinos. portanto; há também exsudato hialino por tôda a superfície das colônias; reverso liso, negro, de margens cinéreas.

Aos 30 dias o micélio mostra-se sub-hialino a marron-claro, septado, constricto, não setoso, sem hifopódios; as hifas têm ramificações irregulares muito entrelaçadas; muitas delas erguem-se do substrato adquirindo porte erecto, ao redor dos picnídios; células hifais cilindráceas de 8-20 × 3,5-5 μ.

Picnídios marron-negros, cilindráceos, erectos, direitos 300-500 μ de altura; ápice dilatado, fimbriado, de 29-40 μ. de diam; base 24-30 μ; subparenquimáticos, de paredes formadas por células retangulares de 7,5-18 × 3,5-6 μ; são simples, raramente múltiplos ou ramificados.

Picnidiosporos hialinos a princípio, depois marron-claros, contínuos, lisos, formando cirro sôbre o ápice dos picnidios: 5-8 × 3,5-6 μ.

Sôbre batata-dextrose-agar. — Aos 10 dias as colônias são rotundas, de 2 cm de diam. verde negras, centro elevado e margens radialmente sulcadas, verde, recobertas por uma substância gelatinosa, subhialina; exsudato hialino abundante; reverso liso, negro. Aos 30 dias o micélio apresenta-se intricado, com hifas septadas, constrictas, muito ramificadas irregularmente, subhialinas a marron-claras, repentes e erectas, por tôda a superfície das colônias; as células hifais são cilíndráceas, de 8-21 × 3-6 μ.

Picnídios marron-negros, cilindráceos, erectos, direitos ou encurvados comumente simples, 182-1615 μ de altura, raramente ramificados, múltiplos ou com hifas ramificadas que se geram no ápice picnidial e sustentam conídios. Apice fimbriado de 24-27 μ de diâmetro e 16-25 μ de diâmetro basal. Picnidiosporos numerosos, cilindráceos a ovoides, contínuos, comumente hialinos, raros de côr marron amarelada 5-7 × 3-4 μ.

Sôbre Czapek-agar a 20 % Aos 20 dias. As colônias são circulares, 32 mm de diâmetro, verde-negras, de centro elevado e aspecto feltroso; bordos menos densos, de côr verde-musgo.

Exsudato hialino revestindo as colônias por inteiro. Reverso liso, negro, de bordos verde-claro.

Aos 30 dias estas colônias apresentam-se com uma zona central bem elevada (5 mm aproximadamente) de côr verde-musgo, 2-2,5 cm de diâm., semi-velutinas; uma zona mediana marron-negra, feltrosa, ligeiramente sulcada no sentido radial, de 10-13 mm de raio; bordos planos, menos densos, de tonalidade marron. O micélio é subhialino a marron-claro, septado, constricto, não hifopodiado, de ramificações irregulares, com células de 8,5-15 × 3,5-5 μ; hifas ascendentes, hialinas a subhialinas, em tôda a colônia, sendo mais abundantes na área central.

Picnídios apresentam-se de duas fórmas bem distintas. Na área central das colônias são marron-negros, de pequena altura, 480-750 μ membranosos, subparenquimáticos de células parietais, retangulares, de 6-15 × 4-6,5 μ, cilindráceos, com 21-25 μ de diâmetro basal; o ápice apresenta numerosas hifas subhialinas formadas de células de 7,5-17 × 4-6,5 μ, de ramificações arborescentes, estéreis; essas hifas também reunem-se formando pseudoprolongamentos picnidiais estéreis, de extremidade hialina, ramificados, 6-10 μ de diam; não são dilatados nem fimbriados.

Na região marginal das colônias, os picnídios são gelatinosos, densamente gregários e entrelaçados, marron-claros, encurvados, cilindráceos, comumente simples ou ramificados, nunca múltiplos, 700-1250 μ, de altura; ápice fimbriado, pouco dilatado, 27-30 μ de diâmetro; a base é de 40-104 μ de diâm; células parietais, pouco distintas, retangulares, de 7,5-23 × 3-9 μ; Também exibem no ápice hifas ramificadas, que não sustentam conídios, entretanto.

Picnidiosporos hialinos a princípio, numerosos, depois marron, contínuos, formando cirro marron-negro aderido ao ápice ou à porção central dos picnídios; medem de 6,5-10 × 3,5-6 μ.

Aos 50 dias do plantio, os picnídios da região central das colônias apresentam-se com as ramificações apicais recobertas de picnidiosporos, enquanto os-pseudo-prolongamentos apicais dos picnídios, vistos desde os 20 dias são agora verdadeiros picnídios múltiplos, contendo picnídiosporos ainda hialinos. Também numerosos apelotonamentos de picnidiosporos marron são encontradiços na superfície dos cultivos. Os picnídios, nessa idade de 50 dias ultrapassam de 1400 μde altura.

Sôbre malte-agar. — Aos 20 dias o micélio é subhialino a marron-claro, septado, constricto, não setoso, nâo hifopodiado, de ramificações irregulares, com células de 7-12,5 × 4-6 μ; há hifas erectas e ascendentes em tôda a colônia, muitas delas revestindo as paredes dos picnídios.

Picnídios marron, cilindráceos, erectos, direitos ou encurvados 218-1750 μ de altura; ápice dilatado, fimbriado ,de 18-43 μ de diâmetro; em alguns picnídios observa-se no ápice a formação de hifas subhialinas, de ramificações arborescentes, em cujas células da extremidade observa-se um esbôço de picnídio múltiplo; as células dessas hifas são de 4-10 × 2,5-3,5 μ; as paredes picnidiais apresentam-se subparenquimáticas, de células retangulares, distintas, de 6-30 × 3,5-7,5 μ.

Os picnídios têm diam. basal de 27-35 μ. São simples, múltiplos ou ramificados. Picnidiosporos contínuos, numerosos, de 6-9 × 3,5-6 μ.

Dos meios empregados o de malte-agar é o que melhor favoreceu ao alongamento picnidial cujas proporções corresponderam ao tamanho máximo dos picnídios assinalados sôbre *Polyscias gneyfoilei* Bailey, em acordância com a diagnose original.

O meio de Czapek-agar a 20 % foi o mais adequado para a produção dos picnídiosporos, cujas dimensões alcançaram de 6,5-10 × 3,5-6 μ, um pouco mais desenvolvidas do que normalmente acontece sôbre os hospedeiros naturais e outros meios de cultura artificial. Observamos também a constância da variabilidade da morfologia dos picnídios, segundo os limites previstos para a estabilidade dessa espécie, que é o tipo do gênero *Megaloxyphium*. Em nenhum dos meios de cultura estudados foi possível a formação de esclerócios ou de peritécios.

RÉSUMÉ

Ce travail donne les résultats de l'etude d'un champignon de fumagine (*Megaloxyphium ophidioglossum* Cif., Bat. & Nasc.) en culture artificielle. Après une longue période d'insuccès, champignon mensuellement semé en culture artificielle dans deux zones géographiques du Brésil, se développe dans les milieux de laboratoire seulement pendant les mois secs, chauds, d'octobre-février 1957-1958. Les auteurs supposent qu'il y ait quelques facteurs de croissance dans le métabolisme du champignon pendant cette période. Ils admettent que la richesse minérale de l'exsudat de l'hôte dans cette époque soit favorable au développement naturel du champignon, lequel pourra alors croître aussi dans les milieux artificiels de laboratoire.

M. ophidioglossum a été étudié en Sabouraud-agar, pomme de terre-dextrose-agar, malte-agar, et Czapek-agar 20 % jusqu'à 50 jours. La stabilité de cette polymorphes espèce a été confirmée dans les limites antérieurement décrites. Pas de transformations des pycnides en périthèces, ou apparition de sclérotes.

SUMMARY

This paper claims the first positive results for the sooty-mold fungus *Megaloxyphium ophidioglossum* Cif., Bat. & Nasc. in pure artificial culture media. After a long period of unsucessful trials in two distinct geographic areas of Brazil, the fungus very well developed during the dry and hot months of october-february 1957-1958. The AA. suppose that there are some growth factors in the fungus metabolism necessary for the artificial culture, probable some mineral compound in the exsudate of the host.

The *M. ophidioglossum* has been cultivated on Sabouraud-agar, potato-dextrose-agar, malt-agar and Czapek-agar, 20 % to 50 days. The stability of this polymorph species has been confirmed under the conditions previously described. Pycnidia were not evoluted to perithecia, nor sclerotia were formed.

Reprint from **Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia** Serie 5, Vol. **XVI,** pag. 97-103, 1959

ESTAMPA I.

Megaloxyphium ophidioglossum Cif., Bat. & Nasc.
sôbre Sabouraud-agar, aos 30 dias.

(no meio) Aspecto geral do picnídio;
(á direita) detalhe da ramificação da porção terminal do picnídio;
(á esquerda, ao alto) picnídio formado sôbre o meio de Czapek, a 20 %, aos 30 dias;
(á esquerda, em baixo) picnidio sôbre malte-agar, aos 30 dias.

1959

INSTITUTO DE MICOLOGIA - UNIVERSIDADE DO RECIFE
(Publicação n. 108)

A. CHAVES BATISTA & A. FERNANDES VITAL

NOVAS COMBINAÇÕES DE *Phaeosphaerella*: *P. banksiae* (Cke.) Bat. & Vital e *P. verrucispora* (Ahmad) Bat. & Vital

(COM 2 FIGURAS NO TEXTO)

FORLÌ
TIPOGRAFIA VALBONESI
1959

13 JUI 1960

A. CHAVES BATISTA & A. FERNANDES VITAL

NOVAS COMBINAÇÕES DE *Phaeosphaerella*: *P. banksiae* (Cke.) Bat. & Vital e *P. verrucispora* (Ahmad) Bat. & Vital

(COM 2 FIGURAS NO TEXTO)

No presente estudo os autores propõem duas novas combinações de *Phaeosphaerella*: *P. banksiae* (Cke.) Bat. & Vital e *P. verrucispora* (Ahmad) Bat. & Vital.

A análise dêstes fungos foi efetuada mediante o estudo de especimens da Universidade de Sydney, Australia do Sul e do Botanical Department, Government College, Lahore, Pakistan.

PHAEOSPHAERELLA BANKSIAE (Cke.) Bat. & Vital n. comb.

Sin. *Didymosphaeria banksiae* (Cke.) Cooke - *in* Grev. XIX, p. 90, 1890-1892.

Peritécios epífilos, aglomerados em áreas mais ou menos circulares de 1-5 mms de diam., um pouco descoradas, isolados ou raramente contíguos, globosos ou globoso-depressos, imersos, porém fendilhando a cutícula foliar através de uma papila que não apresenta abertura ostiolar, 90-125 μ de diam e 75-100 μ de alt., coriáceos, negros; paredes pseudo parenquimáticas, marron-negras 12,5-17,5 μ de espessura, formadas por células globoides ou poliédricas, de 4-12 μ de diam (fig. 1). Ascos basais, cilindro-clavados, 37,5-45 × 8-9,5 μ, octosporos sésseis ou curto-pedicelados, bitunicados, aparafisados. Ascosporos ovoides, sendo a célula superior mais larga do que a célula inferior, feodídimos, polo superior mais rotundo do que o inferior, 10-12 × 3,5-4,5 μ, mais ou menos dísticos (Estampa II).

Sôbre folhas de *Banksia serrata* Wentworth Falls, New South Wales, Coll. L. FRASER, V-1935, determinado por H. Sydow como *Didymosphaeria banksiae* Cke. Tipo, n. 25, University of Sydneyy - South Austrália.

Obs: A nova combinação proposta beseia-se no fato de *Didymosphaeria* ter ascos parafisados, enquanto o fungo estudado os possui aparafisados.

Asci aparaphysati ut *Phaeosphaerella*.



ESTAMPA I.

Phaeosphaerella banksiae (Cke) Bat. & Vital. n. comb.
Asco e ascosporos.

PHAEOSPHAERELLA VERRUCISPORA (Ahmad)
Bat. & Vital n. comb.

Sin. *Didymosphaeria verrucispora* Ahmad.
in Sydowia, II: 74, 1948, ilust.

Esp. tipo n. 2011, do herbário do Botanical Department, Government College; Lahore, Pakistan, sôbre ramos mortos de *Gossypium sp.*, Ladhar, Sheikhura, 29. VII. 1947, leg. et det. S. AHMAD.

Obs. É *Phaeosphaerella* por ser aparafisado.

SUMMARY

The AA. are proposing two new combinations for the genus *Phaeosphaerella*, named *P. banksiae* (Cke.) Bat. & Vital and *P. verrucispora* (Ahmad) Bat. & Vital.

RÉSUMÉ

Les auteurs proposent deux nouvelles combinaisons pour le genre *Phaeosphaerella*: *P. banksiae* (Cke.) Bat. & Vital et *P. verrucispora* (Ahmad) Bat. & Vital.

Reprint from **Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia** Serie 5, Vol. **XVI**, pag. 115-117, 1959



ESTAMPA II.

Phaesphaerella banksiae (Cke.) Bat. & Vital n. comb.

A)b) Dois distintos aspectos do ascostroma. Orig.

1957 1954

INSTITUTO DE MICOLOGIA - UNIVERSIDADE DO RECIFE
(Publicação n. 109)

A. CHAVES BATISTA & R. CIFERRI *

Novos fungos Peltasterales

(COM 8 FIGURAS NO TEXTO)

FORLÌ
TIPOGRAFIA VALBONESI
1959

13 JUL 1959

A. CHAVES BATISTA & R. CIFERRI *

Novos fungos Peltasterales

(COM 8 FIGURAS NO TEXTO)

O trabalho ora apresentado abrange o estudo suplementar de novas espécies de fungos da ordem PELTASTERALES (Bat. & Cif. Publ. 72, I.M.U.R.).

Ao mesmo tempo são ilustradas algumas espécies, cuja iconografia não fôra anteriormente publicada.

ASTERINOTHYRIACEAE

ASTERINOTHYRIELLA Bat. & Ciferri n. gen.

Tipo *A. landolphiae* nobis

Micélio superficial, asterinoide, hifopodiado. Picnostromas superficiais orbiculares, marron-negros, radiados, de ostíolo central; hipostroma ausente; membrana basal hialina; himênio invertido. Conidióforos cilindráceos, curtos. Picnidiosporos cilindraceos, lisos, 2 ou mais transverso-septados, hialinos.

Typus *A. landolphiae* nobis

Mycelium superficiale, asterinoideum, hyphopodiatum. Pycnostromata superficialia, orbiculata, atro-brunnea, radiata, cum ostiolo centrali; hypostromata nulla; hymenium inversum; pariete basali hyalina. Conidiophoris cylindraceis, minutis. Pycnidiosporae cylindraceae, leves, 2 pro more transversaliter septatae, hyalinae.

ASTERINOTHYRIELLA LANDOLPHIAE Bat. & Ciferri n. sp.

Plágulas hipófilas, efusas. marron-negras, membranosas. Micélio superficial, marron-claro. não setoso, telemórfico, de hifas septadas, não constrictas, com ramificações opostas. alternas e unilaterais, regulares,

* Do Instituto Botânico e Laboratorio Criptogâmico da Universidade de Pavia (Itália).

em ângulos de 45 a 90°; células hifais de: 12,5-25,5 × 2,5-4 μ. Hifopódios laterais, multilobados, alguns cilindráceos, 1 a 2 celulares, 7,5-14 × 5 μ. Picnostromas superficiais. dispersos. orbiculares, marron-claros, isolados, membranosos, glabros, com ostiolo central circular, 12,5-18,5 μ de diam., subparenquimáticos, 70-160 μ de diam. 24-36,5 μ de alt.; parede superior radiada, (Fig. 1) de células retangulares, 6,5-15 × 2.5-5 μ; margens fimbriadas; membrana basal tenue, hialina; himênio invertido (Fig. 2). Conidióforos cilindráceos, contínuos, hialinos, de 6,5-9 × 1,5-2 μ. Picnidiósporos cilindráceos, de polos rotundos, lisos, 2-3-transverso-septados, não constrictos, hialinos, 13,5-28 × 2,5 μ.

Sôbre folhas de *Landolphia florida*. Entebbe Road, Leg. C. G. Hansford, 3/944. Tipo, n. 3447. Herb. Mycologist. Dep. Agr. Uganda. Associado a *Asterina landolphiae* Hansf e *Eremotheca ugandensis* Hansf.

Plagulae hypophyllae, effusae membranosae, atro-brunneae. Mycelium superficiale, ex hyphis brunnescentibus, septatis, non constrictis, opposite, alternatim et unilateraliter ramosis in angulis 45-90°, ex cellulis, 12,5-25,5 × 2,5-4 μ, non setosis, compositum. Hyphopodia lateralia, multilobata vel cylindracea, 1-2 cellularia, 7,5-14 × 5 μ. Pycnostromata superficialia, sparsa, orbiculata, 70-160 μ diam., 24-36,5 μ alt., isolata, brunnescentia, glabrata, membranosa; ostiolo centrali, rotundato 12,5-18,5 μ diam.; paries superior subparenchymatica, radiata, ex cellulis rectangularibus, 6,5-15 × 2,5-5 μ composita; marginibus fimbriatis; paries basalis tenus, hyalina. Hymenium inversum. Conidiophoris cylindraceis, continuis, hyalinis, 6,5-9 × 1,5-2,5 μ. Picnidiosporae cylindraceae ad polos rotundatae, leves 2-3 transversaliter septatae, non constrictae, hyalinae, 13,5-27 × 2,5-3 μ.

In foliis *Landolphiae floridae*. Entebbe Road. Leg. C. G. Hansford, 3-944. Typus, n. 3447, Herb. Mycologist, Dep. Agric. Uganda. Socia *Asterinae landolphiae* Hansf. et *Eremothecae ugandensis* Hansf.

ASTEROSTOMELLA COMBRETI Bat. & Ciferri n. sp.

Plágulas anfígenas, marron-claras, isoladas, circulares, membranosas, 1-2 mms. de diâmetro. Micélio superficial. marron-claro, telemórfico, não setoso, septado, não constricto, com ramificações opostas, alternas e uni-laterais, regulares, em ângulos de 45-90°; células hifais de 16-22,5 × 3-5,5 μ. Hifopódios laterais, alternos. cilindráceos e multilobados, 2 celulares; célula basal cilindrácea, 11-16 × 5.5-8 μ. Picnostromas superficiais, marron-claros, orbiculares, isolados au confluentes, membranosos. glabros, de dehiscência estelar, 60,5-125 μ de diam.; sub-parenquimáticos; parede

superior radiada, de células retangulares, de 5-9 × 4-5 μ; margens formadas por hifas franjadas, marron-claras, não hifopodiadas, de: 12-5 15 × 2-4 μ membrana basal, tênue, hialina. Himênio invertido. Conidióforos cilindráceos, contínuos, hialinos, 3-4,5 × 1.5-2,5 μ. Picnidiosporos piriformes, contínuos, marron-escuros, com 1 faixa transversal marron-clara, lisos, de: 11-16 × 5,5-8 μ (Fig. 3).

Sôbre folhas de *Combretum racemosum* associado a *Asterina combreti* Syd. e *Dictyothyrium combreti* Hansf. Entebbe Road. Leg. C. G. Hansford, 5/944. Tipo n. 3455, Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda.

Plagulae amphigenae, brunnescentes, sparsae, rotundatae, membranosae, 1-2 mm diam. Mycelium superficiale, brunnescens, ex hyphis septatis, non constrictis, opposite, alternatim vel unilateraliter ramosis, in angulis 45-90°, ex cellulis 16-22,5 × 3-5,5 μ, compositum. Pycnostromata orbiculata, simplicia vel confluentia, brunnescentia, 60,5-125 μ diam., membranosa, glabrata, stellata, dehiscentia; pariete superiore subparenchymatica, radiata ex cellulis rectangularibus, 5-9 × 4-5 μ efformata; marginibus fimbriatis, ex hyphis non hyphopodiatis, ex cellulis 12,5-15 × 2-4 μ compositis. Hymenium inversum; pariete basali tenue, hyalina. Conidiophoris cylindraceis, continuis, hyalinis, 3-4,5 × 1,5-2,5 μ. Pycnidiosporae pyriformes, continuae, brunneae, cum fascia brunnescenti transversa, leves, 11-16 × 5,5-8.

In foliae *Combreti racemosi*, socia *Asterinae combreti* et *Dictyothyrii combreti* Hansf. Entebbe Road, Leg. C. G. Hansford, 5-944. Typus, n. 3455, Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda.

ASTEROSTOMELLA PSEUDOSPONDIADIS Bat. & Ciferri n. sp.

Plágulas hipófilas, efusas, marron-negras, membranosas. Micélio superficial, marron claro, não setoso, telemórfico, septado, não constricto, com ramificações opostas, alternas e unilaterais, em ângulos de 45 a 90°. Hifopódios laterais, alternos, multilobados, 1-célulares, de 6,5-9 × 5-7,5 μ. Conídios - presos diretamente no micélio, alternos. globosos, lisos, contínuos, marron-claros, 6,5-9 μ de diâmetro. Picnostromas - superficiais, orbiculares (Fig. 4) isolados ou confluentes, marron-claros, membranosos, glabros, deiscência estelar. 60,5-100 μ de diâmetro; 36,5-73 μ de altura; subparenquimáticos; parede superior radiada, de células retangulares, de 5-7,5 × 4-6,5 μ; bordos formados por hifas franjadas, marron-claras, telemórficas, não hifopodiadas. com células de 12,5-23 × 2-4 μ. Himênio invertido; parede basal radiada, marron-clara, 2-5 μ de daim (Fig. 5).

Conidióforos - cilindráceos, contínuos, hialinos, de 5-6 × 3-4 μ. Picnidiosporos priformes, lisos, continuos, marron-escuros, de 30-35 μ × 16-19 μ.

Sôbre fôlhas de *Pseudospondias microcarpa* associado a *Lembosia microcarpa* Hansf. e *Asterinella pseudospondiadis* Hansf. Entebbe Road, Leg. C. G. HANSFORD, XI - 943. Tipo, n. 3302, Herb. Mycologist, Dep. Agric. Uganda.

Plagulae hypophyllae, effusae, atro-brunneae membranosae. Mycelium ex hyphis brunnescentibus, opposite, alternatim vel unilateraliter ramosis in angulis 45-90°, septatis, non constrictis, ex cellulis 5-17,5 × 2-3 μ, non setosis, compositum. Conidia mycelii globosa, levia, continuas, brunnescentia 6,5-9 μ diam.

Hyphopodia lateralia, alternata, multilobata, continua 6,5-9 × 5-7,5 μ. Pycnostromata superficialia, orbiculata, sparsa vel confluentia, brunnescentia, membranosa, glabrata, 60,5-100 μ diam., 36,5-73 μ alt., stellata dehiscentia; pariete superiore subparenchymatica, radiata, ex cellulis rectangularibus, 5-7,5 × 4-6,5 μ efformata; marginibus ex hyphis fimbriatis cum cellulis 12,5-23 × 2-4 μ compositis; hymenium inversum; pariete basali radiata, brunnescenti, 2-5 μ, cr. Conidiophoris cylindraceis, continuis, hyalinis, 5-6,5 × 3-4 μ. Pycnidiosporae -pryriformes, leves, continuae, atro-bruneae, 30-35 × 16-19 μ.

In foliis *Pseudospondiadis microcarpae*, socia *Lembosiae microcarpae* Hansf. et *Asterinellae pseudospondiadis* Hansf. Entebbe Road, Leg. C. G. HANSFORD, XI-943. Typus, 3302, Herb. Mycologist, Dep. Agric. Uganda.

4797

ENTHALLOPYCNIDIUM RHODODENDRI
Bat., Nasc. & Ciferri n. sp.

Micélio epífilo, superficial, em película laminar, circular, de 580-925 μ de diam, plana (fig. 6), isolada ou confluente, de margens onduladas, uniestratificada, marron-clara, formada por hifas radialmente dispostas, anastomosadas, tendo células cilindráceas de 3,5-8 × 3,5-5,5 μ; margens apresentando células cilindráceas ou irregulares até 12 × 7 μ; hifas livres, hifopódios ou setas ausentes. Picnostromas circulares, originados sob a lâmina miceliana, isolados ou confluentes, dispòstos em círculos, nunca na região central, membranosos, plano-hemisféricos, semi-transpanrentes de 55-85 μ de diam; 21-30 μ de altura, pseudo-ostíolo central, cricular ou irregular, de 2,5-4,5 μ de diam; uniloculares; himênio invertido (Fig. 7). Picnidiosporos sésseis, bacilares, hialinos, contínuos, numerosos de 3-4 × 1-1,5 μ.

Sôbre fôlhas de *Rhododendron sp.*, Pennsylvania, U.S.A. Leg. C. L. SHEAR, 5-5-930. Tipo, n. 13482, Instituto de Micologia - Univ. de Recife e isotipo em The National Fungus Collections, U.S.A.

Mycelium epiphyllum, non setosum, nec hyphopodiatum, superficiale in pelliculis laminatis, circularibus 580-925 μ diam., planis, unistratosis, simplicibus vel confluentibus, ex marginibus undulatis, brunnescentibus, ex hyphis radialiter dispositis, nec liberis, ex cellulis cylindraceis, 3,5-8 × 3,5-5,5 μ compositis; marginibus ex cellulis cylindraceis vel irregularibus, usque 12 × 7 μ compositis; pycnostromata rotundata ab lamina mycelica tecta, simplicia vel confluentia, translucida, circulariter disposita sed non in area centrali stata, membranosa, plano-hemisphaerica, 55-85 μ diam., 24-30 μ alt., pseudo-ostiolata, 2,5-4,5 μ diam., uniloculata. Hymenio inverso. Pycnosdiosporae sessiles, bacillares, continuae, numerosae, hyalinae, 3-4 × 1-1,5 μ.

In foliis *Rhododendri sp.* Pennsylvania, U.S.A. Leg. C. L. Shear, 5-5-930. Typus, 13482, Inst. Micol. Univ. Recife, et isotypus in The National Fungus Collections, U.S.A.

PELTASTEROPSIS CHAMPEREIAE Bat. & Farr. n. sp.

Micélio reticulado, anfígeno, marron-escuro, de hifas septadas, não constrictas, tendo células de 1,5-19 × 5-6,5 μ; setas ausentes. Hifopódios laterais, alternos e opostos, contínuos, cilindráceos, 7-14 × 6,5-9,5 μ. Picnostromas gregários, anfígenos, dimidiado-escutelares, 55-80 μ de diam., marron-negros, de dehiscência estelar, membranosos; parede superior radiada, 3-5 μ de espessura, formada por células retangulares, 6-10 × 2,5-3 μ; margens não franjadas, parede basal marron-clara, tênue. Himênio invertido (Fig. 8). Conidióforos filiformes, marron-claros, continuos, 2-3,5 μ de extensão. Picnidiosporos elipsoides ou bacilares, contínuos, hialinos, 3,5-4,5 × 1-1,5 μ.

Sôbre fôlhas de *Champereia manillana*, associado a *Parasterina champereiae* Bat. Antipolo, Luzon, Filipinas. Leg. M. Ramos, 6-1-914. Tipo, ex Sydow, Fungi exotici exsiccati, n. 415, sob o nome de *Asterina elmeri* Syd., no Museu Botânico, da Universidad de Zürich.

Mycelium reticulatum, amphigenum, atro-brunneum, cum hyphis septatis, non constrictis, ex cellulis 12,5-19 × 5-6,5 μ compositis. Hyphopodia lateralia, alternata et opposita, continua, cylindracea, 7-15 × 6,5-9,5 μ. Pycnostromata gregaria, amphigena, dimidiato-scutata, 55-80 μ diam., atro-brunnea, stellata dehiscentia, membranosa; pariete superiore radiata 3-5 μ cr., ex cellulis rectangularibus, 6-10 × 2,5-3 μ composita; marginibus non fimbriatis; pariete basali brunnescenti, tenui. Hymenio inverso. Conidiophoris filiformibus, continuis, 2-3,5 μ longis, bunnescentibus. Pycnidiosporae ellipsoideae vel bacillares, continuae, hyalinae, 3,5-4,5 × 1-1,5 μ.

In foliis *Champereiae manillanae*, socius *Parasterinae champereiae* Bat.

Antipolo, Rizal, Luzon, Philippines. Leg. M. RAMOS, 6-11-914. Typus, n. 415, ex Sydow, Fungi exotici exsiccati, sub *Asterinae elmeri* Syd. in Bot. Mus. Universit. Zurich.

PELTASTEROPSIS SCOLOPIAE Bat., Maia & Ciferri

Micélio de *Parasterina grewiae*. Picnostromas superficiais, dispersos, orbiculares, 48,5-54 μ diam., marron-negros, de dehiscência irregular ou estelar e paredes compostas por células poligonais, radialmente dispostas, 5,5-8 × 5,5-7 μ, isolados ou confluentes; bordos não fimbriados. Himênio inverso; parede inferior nula. Conidióforos obsoletos. Picnidiosporos hialinos, lisos, bacilares a ciilndráceos, contínuos, 5,5-8 × 1,5-3 μ. Sôbre *Scolopia sp.* associado a *Asterostomella horrida* Bat. & Maia e *Parasterina grewiae* var. *granulosa* (Hansf.) Bat. & Maia n. comb. Entebbe Road. Leg. C. G. HANSFORD, 5-943. Tipo, 3193, Herb. Mycologist, Dep. Agric. Uganda.

Mycelium ut *Parasterinae grewiae*. Pycnostromata superficialia, sparsa vel confluentia, orbiculata, 48,5-54 μ diam., atro-brunnea, stellatim vel irregulariter dehiscentia; paries superior ex cellulis polygonalibus, radialiter dispositis, 5,5-8 × 5,5 7 μ, marginibus fimbriatis; hymenium inversum; paries inferior nulla, efformata. Conidiophoris obsoletis. Pycnidiosporae bacillaes vel cylindroceae, continuae, hyalinae, 5,5-8 × 1,5-3 μ.

In foliis *Scolopiae sp.* socius *Asterostomellae horridae* Bat. & Maia et *Parasterinae grewiae* var. *granulosae* (Hansf.) Bat. & Maia n. comb. Entebbe Road. Leg. C. G. HANSFORD, 5-943. Typus, 3193, Herb. Mycologist. Dep. Agr. Uganda.

ELACHOPELTIS PHOEBES Syd. var. **MINOR** Bat., Maia & Ciferri n. var.

Plágulas superficiais, epífilas, rotundas, até 5 mm. de diam., depois efusas. Micélio marron-claro, pouco visível, não setoso, não hifopodiado, ramificado em ângulos de 45°, oposta e alternadamente, formando uma membrana reticular entre as frutificações; células hifais levemente constrictas, 13,5-16,5 × 2,5-3 μ. Picnostromas dispersos, marron-claros, membranosos, orbiculares, dimidiados, 40,5-85 μ diam. e 19-21,5 μ alt., com paredes de 8-10 μ de largura, compostas por células retangulares, radialmente dispostas, 3-4 × 2-3 μ; bordos franjados, de hifas de 3-4 μ de diam (Fig. 9). Himênio invertido. Membrana basal hialina, pouco nítida (Fig. 10). Ostíolo central subcircular 3-5,5 μ diam. Picnidiosporos hialinos, contínuos, lisos, fusóides a cilindráceos 6-7,5 × 1-2 μ larg., retos ou levemente curvados.

Sôbre folhas de *Flacourtia ramontchii*, associado a *Uredo sp.*, *Asterostomella strophanti* P. Henn., *Micropeltis eschweilericola* Bat. & H. Lima, *Parasterina grewiae* Cooke var. *granulosa* (Hansf.) Bat. & Maia, *Eriomycopsis trichiliae* Hansf. e *Phoeodimeriella parvula* Hansf. Entebbe Road. Leg. C. G. HANSFORD, XI-943. Tipo, n. 3266. Herb. Mycoolgist, Dep. Agr. Uganda.

O typo ascostromata minora.

SUMMARY

This paper contains a supplementary study on the *Peltasterales* fungi (Bat. & Cif. Public. 72, I.M.U.R.).

The following fungi are described: *Asterinothyriella* Bat. & Cif. n. gen., having *A. landolphiae* Bat. & Cif. as the type, on the family Asterinothyriaceae; *Asterostomella combreti* Bat. & Cif. n. sp. on *Combretum racemosum*, *A. pseudospondiadis* Bat. & Cif. n. sp. on *Pseudospondias microcarpa*, *Enthallopycnidium rhododendri* Bat., Nasc. & Cif. n. sp. on *Rhododendron sp.*, *Peltasteropsis champereiae* Bat. & Farr n. sp. on *Champereia manillana*, *P. scolopiae* Bat., Maia & Cif. n. sp. on *Scolopia sp.*, *Elachopeltis phoebes* Syd. var. *minor* Bat., Maia & Ciferri n. var.

Are also illustrated *Asterostomella dispar* Speg., *A. kutuensis* (P. Henn.) Bat. & Cif., *A orthosticha* Syd. and *A. tonduzi* Syd.

RÉSUMÉ

Cette contribution est un supplément de l'étude sur les Peltasterales (Bat. & Cif. Publ. 72, I.M.U.R.).

Les champignons décrits sont: *Asterinothyriella* Bat. & Cif. n. gen. ayant *A. landolphiae* Bat. & Cif. comme type dans la famille Asterinothyriaceae; *Asterostomella combreti* Bat. & Cif. n. sp. sur *Combretum racemosum*; *A. pseudospondiadis* Bat. & Cif. n. sp. sur *Pseudospondias microcarpa*; *Enthallopycnidium rhododendri* Bat., Nasc. & Cif. n. sp. sur *Rhododendron* sp.; *Peltasteropsis champereiae* Bat. & Farr. n. sp. sur *Champereia manillana*; *P. scolopiae* Bat., Maia & Cif. n. sp. sur *Scolopia* sp.; *Elachoneltis phoebes* Syd. var. *minor* Bat., Maia & Ciferri n. val.

Sont également illustrés *Asterostomella dispar* Speg., *A. kutuensis* (P. Henn.) Bat. & Cif., *A. orthosticha* Syd. et *A. tonduzi* Syd.

Reprint from **Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia** Serie 5, Vol. **XVI**, pag. 85-96, 1959

ESTAMPA I.

FIG. 1 - (a) - Centro lado direito, e ao alto, lado direito - somente conidios. *Asterinothyriella landolphiae* Bat. & Cif.
FIG. 8 - (a, b, c) - Ao alto e à esquerda - *Peltasteropsis champereiae* Bat. & Farr.
FIG. 9 - Ao alto e à direita.
FIG. 10 - Sob. *a. Elachopeltis phoebes* Syd. var. *minor* Bat. Maia & Ciferri.

Asterostomella kutuensis (P. Henn.) Bat. & Cif. em baixo, a direita.
Asterostomella combreti Bat. & Ciferri, em baixo, à esquerda.



ESTAMPA II.

FIG. 2 - Lado esquerdo - *Asterinothyriella landolphiae* Bat. & Cif.
FIG. 7 - Ao alto - *Enthallopycnidium rhododendri* Bat., Nasc. & Ciferri.
Asterostomella tonduzi Syd. à direita, alto, 2°.
Asterostomella kutuensis (P. Henn.) Bat & Cif. ao alto, centro e em baixo, centro.
FIG. 5 - *Asterostomella pseudospondiadis* Bat. & Cif. ao centro, posição vertical.
Asterostomella dispar Speg. ao centro, lateral direita, picnidiosporos.



ESTAMPA III.

FIG. 3 - *Asterostomella combreti* Bat & Ciferri ao alto, à esquerda.
FIG. 6 - *Enthallopycnidiu mrhododendron* Bat., Nasc. & Cif. em baixo.
Asterostomella dispar Speg. ao centro e a direita.
Asterostomella tonduzi Syd. centro à esquerda.
Asterostomella orthosticha Syd. ao alto, lateral direita, picnidiosporos.



ESTAMPA IV.

FIG. 4 - *Asterostomella pseudospondiadis* Bat. & Cif. em baixo.
Asterostomella orthosticha Syd. ao alto e ao centro, à esquerda.
Asterostomella dispar Speg. ao cento, lateral direita.



ESTAMPA V.

FIG. 6 - *Enthallopycnidium rhododendri* Bat., Nasc. & Ciferri.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 13-51, 1960

ICONOGRAFIA E ESTUDO DESCRITIVO DE ESPÉCIES DE MELIOLACEAE (*)

A. CHAVES BATISTA

M. L. NASCIMENTO

H. S. MAIA

Esta contribuição continua a série de estudos que tem sido publicada pelo Instituto de Micologia, da Universidade do Recife, sôbre os fungos Meliolaceae.

Dêsse modo, ela compreende a ilustração e a redescrição de espécies taxonicamente bem estabelecidas e, sobretudo, a diagnose de novas espécies e de novas variedades de **Meliola.**

Asteridella cupaniae (Toro) Hansf. é assinalada sôbre **Cupania revoluta, A. rondeletifolii** Bat. n.sp. é descrita sôbre **Rondeletia** sp., **Balladyna chiococcae** Bat. & Nasc. n.sp. é estudada sôbre **Chiococca alba, B. sydowii** Petrak, é analisada sôbre especímen de **Neonauclea barthingii,** nº 1714, de F. Petrak, **Dialacenium cissi Syd** é identificado sôbre Melastomaceae, **Irenopsis omphaleae** Hansf. idem, sôbre **Eschweilera ovata, I. vitexifolii** Bat. & Carn. n.sp. é assinalado sôbre **Vitex sp., Meliola bidentata** Cooke var. **elongata** Bat. & Maia n. var. é estudado sôbre hospedeiro desconhecido, **M. caseariicola** Hansf. e reinvestigado através do exame do tipo, sôbre **Casearia engleri, M. cassiifolii** Bat. n.sp. é descrito sôbre **Cassia bacillaris, M. cochlospermifolii** Bat. n.sp. é estudado sôbre **Cochlospermum insignis, M. cupaniicola** Bat. n.sp. é assinalado sôbre **Cupania revoluta M. erythrinae** Syd. é revisto sôbre **Ery-**

Publicação nº 110 (*)

thrina sp., **M. parreirae** Bat. n.sp. é estudado sôbre **Cissampelos parreira**, **M. paullinifolii** Bat. n.sp. é creado sôbre **Paullinia pinnata**, **M. polytricha** Kalch. & Cooke é identificado sôbre **Pittosporum abyssinicum**, **M. remireae** Bat. n.sp. é estudado sôbre **Remirea maritima**, **M. sclerolobii** Hansf. é identificado sôbre hospedeiro indeterminado, **M. tecleae** Hansf. var. **toddaliae asiaticae** Hansf. é revisto sôbre **Toddalia aculeata**, e **M. amomicola** Stev. var. **longispora** Bat. n.var. é descrito sôbre **Amomis caryophyllata**.

ASTERIDIELLA CUPANIAE (Toro) Hansf.
Sin.: **Irene cupaniae** Toro
in Sydowia, I (1-6): 47, 1956.

Plágulas epífilas, isoladas ou confluentes, tênues, marron-negras, circulares a sub-circulares, 1-3 mm de diam.

Micélio superficial, marron-escuro, não setoso, septado, não consticto, de ramificações opostas, alternas e unilaterais regulares, em ângulos de 45 a 90°; células hifais de 10-40 x 8-13.5 u.

Hifopódios capitados, antrorsos, opostos, 2-celulares, gutulados, 13.5 — 21.5 x 8-13.5 u.

Hifopódios mucronados, ampuliformes, gutulados, 16 — 24.5 x 8 — 9.5 u.

Cleistotécios superficiais, globosos, marron-negros, verrugosos, sésseis, não setosos, isolados ou confluentes, 145.5-206.5 u de diam., subparenquimáticos, de paredes formadas por células poligonais e arredondadas 13.5-27 x 8-21.5 u. Fig. 1.

Ascos elipsoides, 2 esporos, 1-tunicados, sésseis, 46-51.5 x 32.5-38 u, aparafisados.

Ascosporos cilindráceo-elipsoides, lisos, 4 septados, constrictos, dísticos, marron-claros depois marron-negros, 38-43 x 16-21.5 u.

Sôbre folhas de **Cupania revoluta** — Itamaracá — Leg. A. Chaves Batista, 3.2.958. Mat. nº 12579, IMUR.



Fig. 1

ASTERIDIELLA CUPANIAE (Toro) Hansf.

a) Cleistotécio e micélio hifopodiado;
b) ascos;
c) ascosporos.

Orig.

ASTERIDIELLA RONDELETIFOLII Bat. & Nasc. n. sp.

Colônias anfígenas, isoladas, de 0,5 — 1 mm de diam, irregulares, marron-negras, superficiais.

Micélio superficial, marron, de hifas onduladas, septadas, não constrictas, sem setas, telemórficas, formadas por células de 13,5 — 24,5 x 5,5 — 6 u; ramificações opostas ou unilaterais, irregulares ou em ângulos de 45 a 90°.

Hifopódios capitados numerosos, laterais, alternos ou unilaterais, cilindráceo-clavados, bi-celulares de 14,5 — 25 u

Fig. 2

ASTERIDIELLA RONDELETIFOLII Bat. & Nasc.

Cleistotécio, micélio hifopodiado e ascosporos.

Orig.

de altura; célula basal cilindrácea de 2,5 — 7,5 x 6 — 7,5 u; célula apical cilindráceo-clavada ou irregular de 12 — 14,5 x 4,5 — 12 u; hifopódios mucronados, laterais, unicelulares,

direitos ou encurvados, lageniformes, unilaterais ou alternos, de 14,5 — 18 x 4,5 — 6,5 u.

Cleistotécios sub-globosos, não setosos, marron-negros, densamente agregados, de 150 — 176 u de diam, membranosos, sub-parenquimáticos ,de células parietais poligonais, 10 — 20 x 7,5 — 17 u. Fig. 2.

Ascos evanescentes à maturidade.

Ascosporos cilindráceos, marron, 4-septados, constrictos, 36 — 38 x 14,5 — 15 u.

Sôbre fôlhas de **Rondeletia sp**.

As colônias epífilas estão recobertas por densa vegetação de **Hormisciomyces prepusum** Bat. & Nasc. e **Hormisciella rubi** Bat., Monte Alegrillo, Puerto Rico. F. L. Stevens, 14-11-913. Tipo, 13391, IMUR e isotipo em The Fungus National Collections, U. S. A.

Plagulae amphigenae, irregulariformes, 0,5-1 mm diam, superficiales, atro-brunneae. Mycelium brunneus, ex hyphis undulatis, septatis, non constrictis, non setosis, opposite, ex cellulis 13,5 — 24 x 4,5 — 6 u compositum. Hyphopodia capitata, 2-cellularibus, 14,5 — 25 u alt; cellula basalis cylindracea, 2,5 — 7,5 x 6 — 7,5 u; cellula superior clavata vel irregulariformia, 12 — 14,5 x 4,5 — 12 u. Hyphopodia mucronata unilateralia vel alternata, lageniformia, 14,5 — 18 x 4,5 — 6.5 u. Cleistothecia sub-globosa, verrucosa, non setosa, 150 — 176 u diam, atrobrunnea, denseque aggregata, membranosa; parietibus sub-parenchymaticis, ex cellulis polygonalibus, 10 — 20 x 7,5 — 17 u efformatis, Asci evanescentes Ascosporae cylindraceae, brunneae, 4-septatae, constrictae, 36 — 38 x 14,5 — 15u. In foliis **Rondeletiae** sp. socius **Hormisciomycis prepusi** Bat. & Nasc. et **Hormisciellae rubi** Bat. Monte Alegrillo, Puerto Rico. F. L. Stevens, 14-11-913. Typus, 13391, IMUR et isotypus 4511, Priv. Herb. F. L. Stevens, in The Fungus National Collections, U. S. A.

BALLADYNA CHIOCOCCAE Bat. & Nasc. n.sp.

Colônias hipófilas, circulares, de 3-5mms. de diam. negras, superficiais.

Micélio marron, superficial, reticulado, setoso, hifopodiado, formado por hifas retilíneas ou levemente onduladas, telemórficas, septadas, não constrictas tendo células de 7,5 — 22 x 3,5 — 4u. Setas miceliais marron, septadas, de ápice rotundo, direitas, decumbentes, abundantes, 230 — 480 x 4,5 — 6 u. Hifopódios capitados, bi-celulares, laterais, alternos ou uni-laterais, cilindráceo-clavados, encurvados, numerosos, de 11 — 16,5 u de altura; célula basal de 3,5 — 5,5 x 3 — 4 u; célula apical de 7,5 — 11 x 4 — 5,5 u.

Peritécios marron, superficiais globosos ou subglobosos, curto-apendiculados quando jovens, setosos, de ostíolo ligeiramente papilado, 51,5 — 62 x 54 — 68,5 u; ostíolo pertuso;



Fig. 3

BALLADYNA CHIOCOCCAE Bat. & Nasc. n. sp.

a) Micélio hifopodiado;
b) Setas miceliais;
c) Peritécios;
d) Setas periteciais;
e) Asco e ascosporo.

membranosos, de paredes sub-parenquimáticas, formadas por células poligonais distintas, de 6,5 — 9,5 x 3,5 — 5 u. Setas periteciais numerosas (5-15) em todo o peritécio, marron, septadas, de ápice rotundo, decumbentes de 250 — 420 x 4,5 — 6 u. Fig. 3.

Ascos elipsoides, 2-tunicados, sésseis, aparafisados, 8 esporos, 24,5 — 27 x 15,55 — 18 u.

Ascosporos oblongos, hialinos a princípio, depois marron, 1-septados, levemente constrictos, conglobados, 10 — 12 x 4,5 — 5 u.

Sôbre folhas de **Chiococca alba** (L) Hetche-Maricao — Puerto Rico — F. L. Stevens, 3-4-913.

Tipo, nº 13411, IMUR, cedido pelo dr. J. A. Stevenson, de The Fungus National Collections — U. S. A.

Plagulae hypophyllae, circulariformes, 3-5 mm diam, atrae, superficiales. Mycelium brunneum, superficiale, setosum, reticulatum ex hyphis rectis vel sinuosis, septatis, non constrictis, ex cellulis 7,5-22-3,5-4u compositum. Setae myceliales brunneae, septatae, obtusae, numerosae, 230-480x4,56u. Hyphopodia capitata, 2-cellularia, alternata vel unilateralia, cylindro-clavata, 11-16,5u alt.; cellula basalis 3,5-5,5x3-4u. Perithecia brunnea, superficialia, globosa vel subglobosa, basaliter curto appendiculata, 51-62x54-68, 5u, ostiolo-papillata; parietibus membranosis, subparenchymaticis, ex cellulis polygonalibus, 6,5-9,5x3,5-6,5, efformatis. Setae perithecialis 5,15, brunneae, septatae, obtusae, 250-420x4,5-6u. Asci ellipsoidei, 2-tunicati, sessili, 8-spori, 24,5-27x15,5-18u. Ascosporae oblongae, primo hyalinae dein brunneae, 1-septatae, constrictae, 10-12x4,5-5u. In foliis **Chiococcae albae** — Maricao Puerto Rico — F. L. Stevens, 3/4/913, 13411, IMUR.

BALLADYNA SYDOWII Petrak
in Sydowia, 9: 532, 1955.

Plágulas anfígenas, marron-negras, membranosas, circulares a sub-circulares, isoladas ou confluentes, 1 — 10 mm. de diam.

Micélio superficial, marron-claro, setoso, telemórfico, de hifas septadas, não constrictas, apresentando ramificações opostas, alternas e uni-laterais, em ângulos de 45 a 90º; células hifais de 12,5 — 20 x 3 — 4 u.

Setas miceliais marron-negras, septadas, direitas ou encurvadas, de ápice acuminado, com 31 — 54 x 6 — 7,3 u.

Hifopódios laterais, alternos, cilindráceos, unicelulares, 6,5 — 9 x 4 — 5 u.

Peritécios superficiais, globosos, 21,5 — 38 u de diam., ástomos, sésseis, marron-claros, glabros, isolados ou confluentes membranosos, pseudo-parenquimáticos, de paredes formadas por células poligonais e arredondadas 2,5 — 5 u de diam. Fig. 4.

Ascos 2-tunicados, 4 — 6 esporos sub-globosos de 24,5 x 22 u, aparafisados, geralmente evanescentes à maturidade.

Ascosporos oblongos, lisos, 1-septados, constrictos, marron-claros de 13,5 — 16 x 5,5 — 8 u.



Fig. 4

BALLADYNA SYDOWII Petrak.

a) Peritécio sôbre micélio setoso, hifopodiado.
b) asco e ascosporos.

Orig.

Sôbre fôlhas de **Neonauclea barthingii** Filipinas, Luzon — Baguio, Prov. Benguet. Leg. M. S. Clemens, VI-1923. Espec. nº 1714, F. Petrak Mycotheca Generalis e 13071, IMUR.

DIALACENIUM CISSI Syd.

in Ann. Myc. XXVIII: 158, 1930

Plágulas epífilas, negras, circulares a sub-circulares, carbonáceas, isoladas, de 1 — 4 mm de diam.

Micélio superficial, não setoso, telemórfico, hifopodiado, ramificado alterna e unilateralmente em ângulos de 45º, com células de 20 — 25 x 6 — 7 u larg. Fig. 6.

Hifopódios irregularmente distribuidos, nodulares, 1-celulares, alternos e unilaterais, 7,5 — 10 x 10 — 14 u.

Haustórios presentes, desenvolvidos nas células epidérmicas do hospedeiro.

Ascostromas mucoso-difluentes, globoso-deprimidos a hemisféricos, glabros, 75 — 100 u diam., 37 — 80 u alt., sésseis, marron-negros, de paredes parenquimáticas, formadas por células poligonais radialmente dispostas, de 9 — 10 x 5 — 7,5 u diam., isolados. Fig. 5.

Ascos globosos a sub-globosos, 2-tunicados, sésseis a curto-estipitados, 4 — 8 esporos 45 — 62 x 32,5 — 40 u larg.

Paráfises filiformes, hialinas, septadas, de 1,5 — 2,5 u larg.

Ascosporos marron-oliváceos, lisos, 1-septados, constritos, polísticos, conglobados, 20 — 25 x 10 — 12,5 u.



Fig. 5

DIALACENIUM CISSI Syd.

a) Peritécio;
b) Asco parafisado;
c) Ascosporo.

Orig.

Sôbre fôlhas de Melastomaceae. Ipiranga até Moca. A. Usteri, 1905. Espec. cedido pelo Museu Bot. da Univ. de Zurich, sob a etiqueta de **Asterella melastomatis** (Lev.) Speg.



Fig. 6

DIALACENIUM CISSI Syd.

a) Micélio hifopodiado;

b) Primórdio de ascostroma.

Orig.

IRENOPSIS OMPHALEAE Hansf.

In Sydowia Ann. Myc., IX: 3, 1955.

Colônias anfígenas, superficiais, circulares de 6 — 8 mm de diam., ou confluentes, efusas. Micélio marron-negro, superficial, de hifas septadas não constrictas, sub-retilíneas ou onduladas, de células de 25 — 39 x 7 — 8,5 u; ramificações hifais opostas, em ângulos de 45° ou alternas. Hifopódios capitados, bicelulares, antrorsos, laterais, alternos, direitos ou recurvados de 24,5 — 37 u de altura; célula basal de 9,5 — 17 x 8,5 — 9,5 u; célula apical de 14,5 — 24,5 x 14,5 — 17 u, oblonga, piriforme ou irregularmente lobada. Hifopódios mucronados, laterais, direitos ou levemente encurvados de 18 — 38 x 7 — 9,5 u. Fig. 7. Setas micelianas ausentes. Cleistotécios marron-negros, sub-globosos, verrugosos, seto-

sos, Fig. 8, isolados, agregados ou dispersos, de 180 — 220 u de diam; paredes subparenquimáticas formadas por células poligonais de 12 — 22 x 8,5 — 14,5 u, às vêzes indistintas. Setas periteciais marron-negras, contínuas ou septadas, simples, em número de 10 — 18, eretas ou decumbentes, de ápice obtuso ou rotundo, de 130 — 187 x 7 — 11 u.

Ascos evanescentes à maturidade, aparafisados.

Ascosporos oblongos a elipsoides, 4 septados, marron-negros, constrictos de 45 — 54 x 19,5 — 23 u.



Fig. 7

IRENOPSIS OMPHALEAE Hansf.

Micélio hifopodiado.

Sôbre folhas de **Eschweilera ovata** (Camb.) Mart. — Camaragibe — Leg. Oswaldo Soares da Silva, 4-4-58.

Espec. nº 13031, IMUR.

Det. A. Chaves Batista.



Fig. 8

IRENOPSIS OMPHALEAE Hansf.

a) Cleistotécio setoso.

b) Ascosporos.

Orig.

IRENOPSIS VITEXIFOLII Bat. & Carneiro n. sp.

Colônias superficiais, marron-negras, hipófilas, rotundas, 1 — 1,5 cm de diam.



Fig. 9

IRENOPSIS VITEXIFOLII Bat. & Carneiro n. sp.

Cleistotécio setoso, micélio hifopodiado e ascosporos.

Micélio marron, superficial, hifopodiado, telemórfico, não setoso, hifas ligeiramente onduladas, ramificadas em ângulos de 45 a 90°, septadas, não constrictas, tendo células de 15 — 27 x 6 — 12 u.

Hifopódios capitados, bicelulares, marron-claros, unilaterais ou alternos, 22 — 27 x 16 — 22 u.

Hifopódios mucronados, opostos ou unilaterais, 15 — 23 x 8,5 — 11 u.

Cleistotécios globosos, marron, 240 — 290 u de diam, isolados, setosos, superficiais, membranosos, de paredes subparenquimáticas, formadas por células poligonais de 12 — 22 x 10 — 16 u.

Setas cleistoteciais deitadas, septadas, marron-negras, 54 — 150 u de extensão, ápice obtuso ou recurvado de 5,5 — 8 u e base de 8 — 13,5 u. Fig. 9.

Ascos evanescentes.

Ascosporos cilindráceos, marron, 4-septados, constrictos, 51 — 60 x 21,5 — 27 u.

Sôbre folhas de **Vitex** sp. associado a **Helminthosporium porothesicolum** F. L. Stevens. Maricao, Puerto Rico — F. L. Stevens, 20-9-913. Tipo, 13394, Instituto de Micologia, Univ. do Recife e isotipo nº 3732 ex. Priv. Herb. F. L. Stevens, em The Funguns National Collections.

Também assinalado sôbre **Vitex sp.** — Utuado, Puerto Rico, F. L. Stevens, 8-11-913. Espec. nº 13396, Inst. de Micologia, Univ. do Recife.

Plagulae hypohyllae, rotundatae, 10 — 15 mm diam, atrobrunneae, superficialis. Mycelium ex hyphis brunneis, superficialibus undulatis, ramosis in angulis 45 — 90º, septatis, non constrictis, ex cellulis 15 — 27 x 6 — 12 u, non setosis, compositum. Hyphopodia capitata unilateralia vel alternata, 2-cellularia, 22 — 27 x 16 — 22 u. Hyphopodia mucronata opposita vel unilateralia, 15 — 23 x 8,5 — 11 u. Cleistothecia globosa, brunnea, 240 — 290 u diam, isolata, setosa, superficialia, membranosa; parietibus sub-parenchymaticis, ex cellulis polygonalibus, 12 — 22 x 10 — 16 u efformatis. Setae cleistotheciales simplices, atrobunneae, septatae, 54 — 150 longae, apicaliter obtusae vel incurvatae, 5, 5 — 8 u diam et basaliter 8 — 13,5 u diam. Asci evanescentes. Ascosporae cylindraceae, brunneae, 4-septatae, constrictae, 51 — 60 x 21,5 — 27 u. In follis **Vitecis sp**. socii **Helminthosporii porothesicolum** F. S. Stevens. Maricao, Puerto Rico. F. L. Stevens, 20/9/913. Typus, 13394, Inst. Micologia, Universidade do Recife et isotypus 3722 ex-Priv. Herb. F. L. Stevens in The Fungus National Collections, U. S. A.

MELIOLA AMOMICOLA Stev. var. **longispora** Bat. n. var.

in Ill. Biol. Monogr. II: 508, 1916.

Colônias negras, quase sempre hipófilas, raramente epífilas, efusas, associadas a outros fungos.

Micélio superficial, setoso, marron, tendo hifas reticu-



Fig. 9a

MELIOLA AMOMICOLA Stev. var. **LONGISPORA** Bat. n. var.

a) Cleistotécio e micélio hifopodiado;
b) Seta micelial;
c) Asco e ascosporos.

ladas, onduladas, ramificadas em ângulos de 45 — 90°, e constituidas por células de 16 — 32,5 x 6 — 8 u.

Hifopódios capitados, bicelulares, célula apical cilindrácea, marron-claro, alternos a opostos 11 — 24 x 7 — 9,5 u.

Hifopódios mucronados, raros, ampuliformes, alternos de 15 — 24 x 5,5 — 8 u.

Setas miceliais esparsas, marron-negras, septadas, direitas ou encurvadas, simples, 258 — 600 u de altura, ápice rotundo, 3 — 11 u de diam. e base de 11 — 27 u.

Cleistotécios globosos, marron-negros de 54 — 180 u de diam. raros, superficiais, glabros, membranosos; parede subparenquimática, formada por células poligonais de 13,5 — 24,5 u Fig. 9 a.

Ascos evanescentes à maturidade, 2 esporos, 46 — 60 x 27 — 38 u.

Ascosporos marron, cilindráceos, 43 — 47 x 12 — 19 u, septos constrictos.

Sôbre fôlhas de **Amomis caryophyllata** (Jacq) Krug. & Urban, associado a **Phialetea aerospora** Bat. & Nasc. e **Stomiopeltella machadoi** Bat. & H. Lima. Porto Rico, Monte Alegrillo, F. L. Stevens, 14-11-913. Tipo, nº 14100, IMUR e isotipo em The National Funguns Collections, U. S. A.

A typo differt per ascosporos majores et setas myceliales minores.

MELIOLA BIDENTATA Cooke var. **elongata** Bat. & Maia n. var.

in Grevillea, 11: 37, 1882. (Beeli: 3131 — 3214).

Plágulas hipófilas, marron-negras, carbonáceas, diminutas, isoladas ou confluentes, de 1 — 3 mms de diam.

Micélio superficial, marron-escuro, setoso, hifopodiado, telemórfico, ramificado oposta e alternadamente em ângulos de 45°, com células de 32 — 38 x 7 — 8 u.

Setas micélias rígidas, de ápice mais claro, denteado ou não, de 1.000 — 2.700 u x 7 — 8 u; dentes de 10-13,5 u.

Hifopódios capitados, 2-celulares alternadamente dispostos, de 13,5 — 16,5 x 8 — 9,5 u.

Hifopódios mucronados, escassos, opostos ou unilateralmente dispostos, de 13,5 — 16 x 5,5 — 7 u. Fig. 10.

Cleistotécios marron-negros, globosos, a sub-globosos, glabros 97 — 195 u de diam., verrugosos, com células conoides de 8 — 10 u de diam. basal; paredes 11 — 13,5 u de diam., formadas por células poligonais de 10,5 — 13,5 x 8 — 10,5 u. Fig. 11 e 11 a.

Fig. 10

MELIOLA BIDENTATA Cooke var. **ELONGATA.** Bat. & Maia n. var.

a) micélio hifopodiado;
b) asco e ascosporo.



Fig. 11

MELIOLA BIDENTATA Cooke var. **ELONGATA.** Bat. & Maia n. var.

Secção longitudinal de cleistotécio.

Ascos evanescentes à maturidade 1-tunicados, 2 esporos, de 40,5 — 46 x 21 — 27 u.

Ascosporos cilindráceos, 4-septados, constrictos, dísticos, lisos de 35 — 38 x 14 — 16 u.

Sôbre fôlhas de planta ignota, associado a **Septoria ipirangae** Speg. e outros fungos. Ipiranga, até Cambucy — Brasil. Leg. A. Usteri, 1905. Tipo, nº 218, no Herb. Mus. Bot. Univ. de Zurich.

A typo differt per setas valde elongatas.

Fig. 11a

MELIOLA BIDENTATA Cooke var. **ELONGATA** Bat. & Maia n. var.

Cleistotecio, micélio hifopodiado e setas miceliais.

MELIOLA CASEARIICOLA Hansf.

Plágulas anfígenas, superficiais, negras, até 5 mms de diam.



Fig. 12

MELIOLA CASEARIICOLA Hansf.

a) micélio com hifopódios capitados e mucronados;
b) setas miceliais;
c) cleistotécio;
d) ascosporos.

Orig.

Micélio marron, de hifas ramificadas, oposta e alternadamente em ângulos de 45-90°, em denso retículo; células hifais de 8,5 — 25 x 4,5 — 9 u.

Setas miceliais numerosas, septadas, longas, erectas, acuminadas e com ápice agudo ou bidenteado, 220 — 480 u de alt; 8,5 — 11 u de diam basal e 5,5 — 8,5 u no ápice.

Hifopódios capitados, alternos, raramente opostos, 1-septados, 17 — 22,5 x 9 — 14 u, ápice truncado ou clavado.

Hifopódios mucronados, alternos e opostos, ampuliformes ou conoides, 9 — 13,5 x 4,5 — 10 u.

Cleistotécios anfígenos, espalhados, globosos, levemente verrugosos, marron-negros, não setosos 180 — 248 u diam, pseudoparenquimáticos, com células poligonais de 9,5 — 17 x 7 — 10 u.

Ascos evanescentes.

Ascosporos cilindro-elipsoides, 4-septados, constrictos, marron, 42,5 — 52 x 17 — 20 u. Fig. 12.

Sôbre fôlhas de **Casearia engleri,** Entebbe, tipo, n° 3724, Herb. Mycologist. Dep. Agr. Uganda. — Associado a **Parasterina caseariicola** (Hansf.) Bat., **Calonectriae meliolae,** Hansf. — Leg. C. G. Hansford, 12 — 945.

MELIOLA CASSIIFOLII Bat. n. sp.

Plágulas anfígenas, marron-negras, membranosas, isoladas ou confluentes, circulares a sub-circulares, 0,5 — 3 mm. de diam.

Micélio superficial, marron-escuro, telemórfico, septado, não constricto, setoso, hifopodiado, de ramificações opostas, alternas e laterais, regulares, em ângulos de 45 a 90°; células hifais de 21,5 — 35 x 8 — 11 u.

Hifopódios capitados oblongos, alternos ou opostos, bicelulares, de 19 — 27 x 13,5 — 16 u.

Hifopódios mucronados, opostos ou alternos, ampuliformes, de 14 — 24,5 x 8 — 11 u. Setas micelianas erectas, raramente encurvadas, septadas, não constrictas, marron-escuras, de ápice obtuso, 215 — 335 x 9,5 — 12,5 u.

Cleistotécios superficiais, globosos, marron-negros sésseis, isolados ou gregários, glabros, de 145,5 — 185 u de diam., paredes sub-parenquimáticos com células poligonais e subglobosas, de 8 — 19 x 5,5 — 13,5 u.

Ascos elipsoides ou oblongos, 1 tunicados, 2 — 3 — 4 esporos, sésseis, 43 — 60 x 21,5 — 38 u., aparafisados.

Ascosporos cilindráceos, obtusos, 4-septados, constrictos, conglobados, marron-negros, de 35 — 43 x 11 — 16 u. Fig. 13.



Fig. 13

MELIOLA CASSIIFOLII Bat. n. sp.

a) Micélio, setas e cleistotécio;
b) Ascos;
c) Ascosporos.

Sôbre fôlhas de **Cassia bacillaris** — Caruaru — Pern. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 6-4-58. Tipo, 13051, Inst. de Micol. Univ. do Recife.

Plagulae amphigenae, atro-brunneae, membranosae, simplices vel confluentes rotundatae, 0,5 — 3 mm., diam.

Mycelium superficiale, atro-brunneum, ex hyphis opposite, alternatim vel lateraliter ramosis, septatis, ex cellulis 21,5 — 35 x 8 — 11u, non setosis, efformatum. Hyphopodia capitata oblongag, alternata vel opposita, 2-cellularia, 19-27 x 13,5 — 16 u. Hyphopodia mucronata ampulliformia, 14 — 24,5 x 8 — 11. Setae myceliales erectae, raro incurvatae, septatae, atro-brunneae, obtusae, 215 — 335 x 9,5 — 12, 5 u. Cleistothecia sparsa vel gregaria, superficialia, globosa, 145,5 — 185 u diam, atro-brunnea, sessilia; parietibus sub-parenchymaticis ex cellulis polygonalibus vel sub globosis, 8 — 19 x 5,5 — 13,5 u compositis.

Asci ellipsoidei vel oblongi, 1-tunicati, 2-3-4 spori, sessiles, 43 — 60 x 21,5 — 38 u, aparaphysati.

Ascosporae cylindricae, obtusae, 4-septatae, constrictae, conglobates, atro-brunneae, 35 — 43 x 11 — 16. u.

In foliis **Cassiae bacillaris. Caruaru** — Pern. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 6/4/58. Typus, 13051, Inst. de Micol. Univ. do Recife.

MELIOLA COCHLOSPERMIFOLII Bat. n. sp.

Plágulas epífilas, marron-negras, isoladas ou confluentes, membranosas, circulares a sub-circulares, 1 — 6 mm de diam.

Micélio superficial, marron-negro, hifopodiado, telemórfico, septado, não constricto; hifas de ramificações opostas, alternas e laterais, regulares, em ângulos de 45 a 90°, tendo células de 19 — 29,5 x 6,5 — 8 u.

Hifopódios capitados oblongos, alternos, raramente opostos, 2 celulares, de: 16 — 21,5 x 9,5 — 13,5 u.

Hifopódios mucronados, opostos, ampuliformes, 13,5 — 21,5 x 5,5 — 8 u.

Setas miceliais cilindráceas, alongadas, direitas ou encurvadas, marron-negras, 2 a 6 septadas, não constrictas, ápice obtuso, 185 — 310 x 6 — 9 u.

Cleistotécios superficiais, globosos, marron-negros, sésseis, levemente verrugosos, isolados ou confluentes, 120 — 170 u de diam., membranosos, sub-parenquimáticos; paredes formadas por células poligonais e arredondadas, de 11 — 19 x 8 — 13,5 ú.

Ascos sub-globosos, 2 esporos, 1 tunicados, sésseis, 40,5 — 48,5 x 19 — 28,5 u, aparafisados.

Ascosporos cilindráceos, 4-septados, constrictos, marron-negros, 35 — 40,5 x 11 — 19 u. Fig. 14.



Fig. 14

MELIOLA COCHLOSPERMIFOLII Bat. n. sp.

a) Peritécio s/ micélio hifopodiado e setoso; Ascos e ascosporos.

Sôbre fôlhas de **Cochlospermum insigne.** St. Hil Caruaru — Pern. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 21-4-958. Tipo, 13109, IMUR.

Plagulae epiphyllae, atro-brunneae, rotundatae, 1-6 mm diam. Mycelium superficiale, ex hyphis atro-brunneis, opposite, alternatim vel lateraliter ramosis, (ang. 45 — 90°) septatis, non constrictis, ex cellulis 19 — 29,5 x 6,5 — 8 u compositum. Hyphopodia capitata oblonga, alternata raro opposita, 2-cellularia 16 — 21,5 x 9,5 — 13,5 u. Hyphopodia mucronata opposita, ampuliformia, 13,5 — 21,5 x 5,5 — 8 u. Setae myceliales cylindricae, elongatae, rectae vel incurvatae, 2 — 6 — septatae, non constrictae, 185 — 310 — x 6 9 u. Clestothecia superficialia, globosa, atro-brunnea, 120 — 170 u diam, minuta verrucosa, simplicia vel gregaria, sessilia; parietibus membranosis, sub-parenchymaticis, ex cellulis polyponalibus vel sub-globosis, 11 — 19 x 8 — 13,5 u, efformatis. Asci sub-globosi, 2-spori, 1-tunicati, sessili 40,5 — 48,5 x 19 — 28,5 u, aparaphysati.

Ascosporae cylindricae, 4-septatae, constrictae, atro-brunneae, 35 — 40,5 x 11 — 19 u.

In foliis **Cochlospermi insignis** St. Mil. Caruarú, Pern. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 21 — 4 — 58. Typus, 13109, IMUR.

MELIOLA CUPANIICOLA Bat. n. sp.

Beeli: 2111 — 4221

Colônias marron-negras, epífilas, rotundas 2 — mm de diam ou efusas, cobrindo parte do limbo.

Micélio constituido de hifas retas, profusa e alternadamente ramificadas, em ângulos de 45°, telemórficas, septadas, não constrictas, marron, constituidas de células de 21 — 38 x 6 — 7 u.

Setas miceliais de 232,5 — 240 u de altura e 9 — 13,5 u de diam basal, marron-negras, septadas, retas e sub-retas, erectas, de extremidade livre, obtusa.

Hifopódios mucronados laterais, ampuliformes, 14,5 — 22 x 4 — 7,5 u. Hifopódios capitados laterais, alternos, bicelulares, clavados, 19 — 30 x 9 — 12,5 u. Cleistotécios globosos, espalhados, marron-negros, 120 — 186 u de diam, de paredes sub-parenquimáticas, membranosas, constituidas de células poligonais, 5 — 17 x 4 — 15 u. Fig. 15.

Ascos evanescentes, contendo 2 a 4 esporos.

Ascosporos cilindráceo-elipsoides, 40 — 43 x 12,5 — 14 u, de extremidades rotundas, 3 septados, constrictos, marron.

Sôbre fôlhas de **Cupania revoluta.** Pau Ferro — Camaragibe — Pern. Leg. Oswaldo Soares da Silva, 13-4-58. Tipo, 13063, IMUR.

Fig. 15

MELIOLA CUPANIICOLA Bat. n. sp.

Cleistotécio, micélio setoso, hifopodiado e ascosporos.

Plagulae atro-brunneae, epiphyllae, rotundatae, 2 — 5 mm diam vel effusae.

Mycelium superficiale, ex hyphis rectis, dense alternatim ramosis, septatis, non contrictis, brunneis, ex cellulis 21 — 38 x 6 — 7u, compositum.

Setae myceliales 232,5 — 240 u alt., 9 — 13,5 u basaliter diam, atro-brunneae, septatae, rectae vel sub rectae, obtusae.

Hyphopodia mucronata lateralia, ampullacea, 14,5 — 22 x 4 — 7,5 u. Hyphopodia capitata alternata, 2-cellularia, clavata, 19 — 30 x 9 — 12,5 u.

Cleistothecia globosa, atro brunnea, 120 — 186 u diam, membranosa, sparsa; parietibus ex cellulis polygonalibus, 5 — 17 x 4 — 15 u efformatis.

Asci 2 — 4 spori, evanescentes.

Ascosporae cylindro-ellipsoideae, 3 3-septatae, constrictae, polis rotundatis, 40 — 3 x 12,5 — 14 u, brunneae.

In foliis **Cupaniae revolutae**. Páu Ferro — Camaragibe, Pern. Leg. Oswaldo Soares da Silva, 13/4/58, Typus, 13063, Instituto de Micologia, Univ. do Recife.

MELIOLA ERYTHRINAE Syd.

In Ann. Myc. vol. XV: 185, 1917.

Colônias marron-negras, epífilas, circulares, de 2-3 mm, de diâmetro, isoladas depois confluentes.

Micélio efuso, marron — claro, septado, superficial, hifopodiado, setoso, sem telemorfismo; hifas ligeiramente onduladas, de ramificações opostas ou unilaterais, formando ângulos de 90°, e constituidas por células de 19 — 40 x 5,5 — 10 u. Hifopódios capitados, bicelulares, piriformes, marron-claros, alternos, numerosos; célula apical globosa e basal cilindrácea, 13,5 — 22 x 11 — 16 u; hifopódios mucronados opostos e laterais, 16 — 22 x 7 — 9 u; setas miceliais marron-claras, septadas, direitas ou encurvadas, simples, ápice rotundo, 6 — 12 u de base, 307 — 500 u de altura. Cleistotécios subglobosos, de colapso deprimido, marron-negros, 80 — 210 u de diam., numerosos, gregários, membranosos, subparenquimáticos, de paredes formadas por células poligonais de 5,5 — 27 x 3 — 19 u. Ascos evanescentes à maturidade, 2 — 4 esporos. Ascosporos cilindráceos, oblongos, rotundos, 35 — 46 x 11 — 16, u, marron, 4-septados, constrictos. Fig. 16.

Sôbre **Erythrina sp.** — Papua — Leg. D. Shaw, X.1956. Det. Hansford, revisto por A. Chaves Batista, em 13-3-1958. Especimen Wari 7755 e 12758, IMUR.



Fig. 16

MELIOLA ERYTHRINAE Syd.

a) Cleistotécio e micélio hifopodiado;

b) seta micelial;

c) asco;

d) ascosporos.

Orig.

MELIOLA PARREIRAE Batista, n. sp .

Beeli: 3132 — 5222

Colônias marron-negras, 3 — 10 mm de diam., hipófilas, irregular e esparsamente distribuidas pelo limbo.

Micélio reticulado, profusa e irregularmente ramificado, de côr marron-negra, constituido de hifas septadas, não constrictas, cujas células medem de 26,1 — 61,5 x 7 — 8,5 u.



Fig. 17

MELIOLA PARREIRAE Bat. n. sp.

Micélio setoso e hifopodiado, cleistotécio e ascosporos.

Setas miceliais presentes, erectas, flexuosas, septadas, 250 — 480 x 5 — 10 u, marron-negras, de ápice 3 — 4 denteado, algumas vêzes profundamente.

Hifopódios capitados abundantes, bicelulares, opostos ou unilaterais; célula basal cilindrácea, 3,6 — 7 x 4 — 7,5 u. Célula apical oblonga a irregular, 9 — 17 x 7 — 9 u.

Hifopódios mucronados, raros, conoides, 14,7 x 5,2 u.

Cleistotécios globosos ou subglobosos, de colapso deprimido, às vêzes profundamente, de consistência membranosa, marron-negros, 95 a 125 u de diâmetro, apresentando células parietais poligonais a irregulares, de 12 — 25 x 9,8 a 11 u.

Ascos hialinos, evanescentes à maturidade, comportando dois a três ascosporos.

Ascosporos marron-claros, elipsoide-alongados, com extremidades rotundas, 4 septadas transversalmente, constrictos 43 — 59 x 13,5 — 15 u, Fig. 17.

Sôbre fôlhas de **Cissampelos parreira** Faz. Bulandi — Várzea — Recife — Leg. Oswaldo Soares da Silva, 15-4-58. Tipo, 13066, IMUR.

Coloniae atro-brunneae, 3 — 10 mm diam, hypophyllae, sparsae. Mycelium superficiale, reticulatum, ex hyphis irregulariter ramosis, septatis, atro-brunneis, ex cellulis 26 — 61,5 x 7 — 8,5 u compositum. Setae myceliales erectae, flexuosae, 520 — 480 x 5 — 10 u, septatae, atro-brunneae, 3 — 4 dentatae. Hyphopodia capitata 2-cellularia, opposita vel unilateraria, cellula basalis cylindracea, 3,6 — 7 x 4 — 7,5 u; cellula apicalisoblonga vel irregulariformis, 9 — 17 x 7 — 9 u. Hyphopodia mucronata conoidea, rara, 14,7 x 5,2 u.

Cleistothecia subglobosa, colapso-depressa, glabrata, 95 — 125 u diam, atrobrunnea, membranosa; parietibus ex cellulis polygonalibus vel irregularibus, 12 — 25 x 9,8 — 11 u, efformatis.

Asci 2 — 3-spori, evanescentes.

Ascosporae ellipsoide-elongatae, 4-septatae, constrictae, brunnescentiae, 43 — 59 x 13,5 — 15 u. Fig. 17.

In foliis **Cissampeli parreirae** — Faz. Bulandi, Várzea, Recife. Leg. Oswaldo Soares da Silva, 15/4/58. Typus, 13066, IMUR.

MELIOLA PAULLINIFOLII Bat. n. sp.

Plágulas anfígenas, tênues, membranosas, marron-negras, circulares, isoladas e confluentes, 1 — 8 mms de diam.

Micélio superficial, marron-negro, septado, não constricto, telemórfico, setoso, hifopodiado, com ramificações opostas, alternas e laterais, regulares, em ângulos de 45 a 90°; células hifais de 32,5 — 59 x 8 — 11 u.

Hifopódios capitados oblongos, alternos e opostos, erectos ou encurvados, bicelulares, de 21,5 — 30 x 13,5 — 16 u; célula basal quase sempre cuneiforme. Hifopódios mucronados pouco frequentes, alternos, direitos ou curvado — ampuliformes, 19 — 27 x 9,5 — 11 u.

Setas miceliais cilindráceas, alongadas, marron-negras, não constrictas, 4 a 7 septadas, ápice agudo, de 215 — 800



Fig. 18

MELIOLA PAULLINIFOLII Bat. n. sp.

a) Cleistotécio, micélio hifopodiado e setas do micélio;
b) Ascos;
c) Ascosporos.

x 12,5 — 15,5 u. Cleistotécios superficiais, globosos, marron-negros, sésseis, isolados, raros, confluentes, membranosos, glabros, 145,5 — 185 u de diâmetro, subparenquimáticos, de paredes formadas por células poligonais e subglobosas, de 16 — 27 x 8 — 16 u.

Ascos subglobosos a elipsoides, 1 — tunicados, sésseis, 2 — esporos, 46 — 54 x 21,5 — 27 u, aparafisados.

Ascosporos cilindráceos, 4 — septados, constrictos, lisos, marron-negros 40,5 — 46 x 16 — 19 u. Fig. 18.

Sôbre fôlhas de **Paullinia pinnata** Caruaru, Pernambuco. — Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 9-3-1958. Tipo 12748, IMUR.

Plagulae amphigenae, tenus, membranosae, atro-brunneae, rotundatae, 1 — 8 mm diam. Mycelium superficiale, atro-bruneum, septatum, haud constrictum, setosum, opposite, alternatim vel lateraliter ramosum, ex cellulis 32,5 — 59 x 8 — 11 u, compositum.

Hyphopodia capitata oblonga alternata et opposita, erecta vel dextro curvata, 2 — cellularia, cellula basalis plerumque cuneata, 215 — 30 x 13,5 — 16 u. Hyphopodia mucronata rara, alternata, erecta vel curvata, ampullacea, 19 — 27 x 9,5 — 11 u.

Setae myceliales cylindricae, elongatae, atrobrunneae, erectae, 4 — 7 septatae, non constrictae, simples, acutae, 215 — 800 x 12,5 — 15,5 u. Cleistothecia superficialia, sessilia, globosa, glabrata, 145, 5 — 185 u diam., levia, membranosa, subparenchymatica, parietibus ex cellulis polygonalibus vel subglobosis, 16 — 27 x 8 — 16u efformatis. Ascosporae cylindraceae, 4 septatae, constrictae, leviae, atro-brunneae, 46 — 54 x 21,5 — 27 u.

In foliis **PAULLINIAE PINNATAE** — Caruaru, Pernambuco, Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 9/3/1958. Typus 12748, IMUR.

MELIOLA POLYTRICHA Kalch. & Cooke

in Sacc., Syll. Fung. I: 67, 1882

Plágulas anfígenas, superficiais, marron-negras, circulares a sub-circulares, 2 — 4 mm de diam. Micélio anfígeno, superficial, marron-oliváceo, septado, não constricto, telemórfico, setoso, hifopodiado, com ramificações opostas, regulares, formando ângulos de 45°; células hifais de 16 — 27 x 9.5 — 11 u. Setas erectas ou encurvadas, agudas, marron-negras, septadas, não constrictas, células pouco visíveis, 194 — 291 x 12 u. Hifopódios capitados, globosos, contínuos, alternos, 19 — 24.5 x 13 — 16 u. Hifopódios mucronados, retos ou inclinados, alternos, 13.5 — 19 x 8 — 11 u. Cleistotécios anfígenos, superficiais, globosos, 155-207 u de diam., glabros, sésseis, marron-negros, membranosos, sub-parenquimáticos, tendo paredes formadas por células poligonais ou sub-globosas de 11 — 19 u de diam. Ascos elipsoides,



Fig. 19

MELIOLA POLYTRICHA Ralch. & Cooke.

a) cleistotécio e micélio hifopodiado, setoso. b) ascos; c) ascosporos.

Orig.

1-tunicados, sésseis, aparafisados, 2-esporos, 56.5 — 67.5 x 27 — 40.5 u. Ascosporos cilindráceo-oblongos, 4-septados, constrictos, lisos, 46 — 54 x 16 — 19 u. Fig. 19.

Sôbre fôlhas de **Pittosporum abyssinicum**, associado a **Echidnodes pittosperi** Hansf. e **Parasterina hansfordii** (Syd.) Bat. Kisubi, Entebbe, Uganda. C. G. Hansford leg. e det. Dez. 1944. Espec. nº 3651 do Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda.

MELIOLA REMIREAE Bat. n. sp.

Plágulas epífilas, marron-negras, membranosas, isoladas ou confluentes, circulares a subcirculares, 1 — 3 mm de diam.

Micélio superficial, marron-claro, septado, não constricto, setoso, telemórfico, hifopodiado; ramificações opostas, alternas e laterais regulares, formando ângulos de 45 a 90°; células hifais de 8 — 11 u de diam.

Hifopódios capitados, opostos, oblongos ou irregulares, bicelulares, de 16 — 19 x 9,5 — 13,5. Hifopódios mucronados ampuliformes. Setas miceliais erectas, direitas ou encurvadas, marron, simples, 3 — 10 septadas, não constrictas, ápice 1 — 5 dentes, de 110 — 356,5 x 6 — 12,5 u.

Cleistotécios superficiais, globosos, sésseis, marron-negros, isolados ou confluentes, glabros 121,5 — 170 u de diam.; subparenquimáticos, de paredes formadas por células poligonais e arredondadas, de 8 — 21,5 x 5,5 — 16 u.

Ascos subglobosos, 1-tunicados, 2 a 3 esporos, sésseis, 43 — 46 x 21,5 — 29,5 u, aparafisados.

Ascosporos cilindráceos, 1 a 4 septados, constrictos de epispório espêsso, conglobados, marron-claros a escuros, 35 — 40 x 11 — 14 u. Fig. 20.

Sôbre fôlhas de **Remirea maritima** — Galinópolis, Pernambuco. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 9-3-1958. Tipo, 12754, IMUR.

Plagulae epiphyllae, atro — brunneae, membranosae, rotundatae, 1 — 3 mm diam. Mycelium superficiale, brunneum, septatum, non constrictum, opposite, alternatim vel lateraliter ramosum, ex cellulis 8 — 11 u diam. compositum. Hyphopodia capitata oblonga vel irregulalaria, 2 — cellularia, opposita, 16 — 19 x 9,5 — 13,5 u. Hyphoopdia mucronata ampulliformia, 13,5 — 19 x 8 — 11 u. Setae myceliales erectae, rectae vel incurvatae, simplices, atrobrunneae, 3 — 10 septatae, non constrictae, apicaliter, 1 — 5 dentatae, 110 — 356,5 x 6 — 12,5 u. Cleistothecia superficialia, globosa, sessilia, 121,5 — 170 u diam.,



Fig. 20

MELIOLA REMIREAE BAT. n. sp.

a) Cleistotécio, micélio hifopodiado e setas do micélio;

b) Ascos;

c) Ascosporos.

glabrata; parietibus subparenchymaticis ex cellulis polygonalibusvel subglobosis, 8-21,5 x 5,5 — 16 u, efformatis Asci subglobosi, 1 — tunicati, 2 — 3 spori, sessiles, 43 — 46 x 21,5 — 29,5 u, aparaphysati. Ascosporae cylindraceae, 1 — 4 septatae, constrictae, episporiae crassae, conglobatae, brunnescentes dein atro brunneae, 35 — 40 x 11 — 14 u.

In foliis **REMIREAE MARITIMAE.** Galinópolis, Pernambuco . Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 9.3.1958. Typus 12754, IMUR.

MELIOLA SCLEROLOBII Hansf.

in Sydowia, IX: 24, 1955
Beeli: (3131.5221)

Plágulas epífilas, marron-negras, circulares, carbonáceas, isoladas 1 — 1,5 mms de diam.

Micélio superficial, setoso, marron-escuro, septado, hifopodiado, telemórfico, ramificado, oposta e alternadamente, em ângulos de 45°; células hifais de 32 — 35 — 7 — 9 u.

Setas miceliais marron-negras, retas ou recurvadas de

Fig. 21

MELIOLA SCLEROLOBII HANSF.

Secção longitudinal de cleistotecio.

ápice ponteagudo, claro, lisas, septadas, apresentando ramificação rudimentar, 110 — 200 x 8 — 11 u.

Hifopódios capitados, laterais, 2-celulares, célula basal

sub-cilindrácea, célula apical globosa a sub-globosa, alternos e unilateralmente dispostos, 16 — 17 x 9 — 11 u; Hifopódios



Fig. 21a

MELIOLA SCLEROLOBII HANSF.

a) micelio hifopodiado e seta micelial;
b) cleistotecio;
c) asco;
d) ascosporo.

mucronados, escassos, de disposição unilateral, 19 — 22 x 11 — 14 u.

Cleistotécios globosos, marron-negros, carbonáceos, gla-

bros, 68 — 180 u de diam, de colapso deprimido à maturidade, com paredes de 13 — 21 u de diam; células parietais poligonais, de 9 — 11 x 7 — 8 u, exibindo à superfície, células conoides de 10,5 — 12,5 x 7 — 10 u largura. Fig. 21

Ascos 2 — 3 esporos, 1-tunicados, evanescentes à maturidade, 46 — 55 x 22 — 30 u.

Ascosporos cilindráceos, obtusos, constrictos, lisos, 4-septados, 38 — 52 x 11 — 19 u, Fig. 21 a.

Sôbre fôlhas de planta desconhecida, associado a **Parasterina leeae** (Hughes) Bat. & Maia. Dr. A. Usteri, 5-7-1909 — Freguesia do Ó — Pernambuco. Originalmente identificado o especímen como **Asterina silvática** Speg. no Herb. Mus. Bot. Univ. Zurich.

MELIOLA TECLEAE Hansf. var. **TODDALIAE ASIATICAE** Hansf.

in Proc. Linn. Soc. Lond. Sess. 153: 11, 1941.
Farlowia, 3, 3: 298, 1948.

Plágulas epífilas, marron-negras, membranosas, orbiculares a subcirculares, isoladas a confluentes medindo 1-3 mm de diâmetro.

Micélio superficial, marron-escuro, não setoso, telemórfico, de hifas não constrictas e ramificações opostas, alternas e bilaterais em ângulos de 60° a 90°, formando denso retículo; células hifais de 21,5 — 32,5 x 3 — 7 u. Setas do micélio erectas, negras, opacas, simples, agudas, direitas ou encurvadas, 195 — 500 6 — 12 u.

Hifopódios capitados laterais, alternos, raro opostos, cilindráceos, retos ou encurvados, bicelulares, 19 — 29 u de extensão; célula apical 10 — 19 x 8 — 11 u.

Hifopódios mucronados retos ou encurvados, bicelulares com 13,5 — 22 x 5,5 — 10 u.

Cleistotécios globosos, verrugosos, 60 — 240 u de diam., superficiais, marron-negros, isolados ou agregados, sésseis, ástomos, subparenquimáticos, paredes formadas por células poligonais e arredondadas, 5 — 7,5 x 4 — 5 u. Fig. 22.

Ascos evanescentes.

Ascosporos elipsoides, de polos rotundados, marron-negros, 4-septados, constrictos, 40 — 47 x 17 — 20 u.

Sôbre fôlhas de **Toddalia aculeata**, associado a **Schiffnerula toddaliae** Hansf. **Paranectria toddaliae** Hansf., **Parasterina toddaliae** (Hansf.) Bat. e **Eriomycopsis sp.** — Entebbe Road — Uganda. Leg. C. G. Hansford, 5-943. Espec. nº 3187, Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda.



Fig. 22

MELIOLA TECLEAE Hansf. var **toddaliae asiaticae** Hansf.

a) Cleistotécio e micélio hifopodiado, setoso.
b) Ascosporo.

ABSTRACT

This contribution contains the description and the illustration of new species of Meliolaceae as well as the revision and the identification of many other species of this same family studied at the Instituto de Micologia, da Universidade do Recife.

These species and their related hosts are the following: **Asteridiella cupaniae** (Toro) Hansf. on **Cupania revoluta, A. rondeletiae** Bat. n. sp. on **Rondeletia sp., Balladyna chiococcae** Bat. & Nasc. n. sp. on **Chiococca alba, B. sydowii** Petrak on **Neonauclea barthingii, Dilacenium cissi** Syd on **Melastomaceae, Irenopsis omphaleae** Hansf. on **Eschweilera ovata, I vitexifolii** Bat. & Carn. on **Vitex sp., Meliola bidentata** Cook var. **elongata** Bat & Maia n. var. on unknown host, **M. caseariicola** Hansf. on **Cesearia engleri, M. cassiifolii** Bat. n. sp. on **Cassia bacillaris, M. cochlospermifolii** Bat. n. sp. on **Cochlospermum insigne, M. cupaniicola** Bat. n. sp. on **Cupania revoluta, M. erythrinae** Syd. on **Erythrina sp., M. parreirae** Bat. n. sp. on **Cis-**

sampelos parreira, M. paullinifolii Bat. n. sp. on **Paullinia pinnata, M. polytricha** Kalch. & Cooke on **Pittosporum alupsinicum, M. remireae** Bat. n. sp. on **Ramirea maritima, M. sclerolobii** Hansf. on unknown host, **M. tecleae Hansf. var. toddaliae asiaticae** Hansf. on **Toddalia asiatica** and **M. amomicola** Stev. var **longispora** Bat. n. var. is described on **Amomis caryophyllata.**

RÉSUMÉ

Cette contribution contient la description et l'illustration de nouvelles espèces de Meliolaceae, ainsi que la revision et l'identification de plusieurs autres espèces de la même famille étudiées dans l'Instituto de Micologia da Universidade do Recife.

Ces espéces et leurs hôtes respectifs sont: **Asteridiella cupaniae** (Toro) Hansf. sur **Cupania revoluta, A. rondeletiae** Batista n. sp. sur **Rondeletia sp., Balladyna chiococae** Batista & Nascimento sur **Chiococca alba, B. syddowii** Petrak sur **Neonauclea barthingii, Dilacenium cissi** Syd. sur Melastomaceae, **Irenopsis omphaleae** Hansf., sur **Eschweilera ovata ,I. vitexifolii** Batista & Carneiro, sur **Vitex sp., Meliola bidentata** Cooke var. **elongata** Batista & Maia n. var. sur hôte inconnu, **M. caseariicola Hansf. sur Casearia engleri, M. cassiifolii** Batista n. sp. sur **Cassia bacillaris, M. cochlospermifolii,** Bat. n. sp. sur **Cochlospermum insigne, M. capuniicola** Batista n. sp. sur **Cupania revoluta, M. erythrinae** Syd sur **Erythrina sp., M. parreirae** Batista n. sp. sur **Cissampelos parreira, M. paullinifolii** Batista n. sp. sur **Paullinia pinnata ,M. polytricha** Kalch. & Cooke sur **Pittosporum alupsinicum, M. tecleae** Hansf. var. **toddaliae asiaticae** Hansf. sur **M. amomicola** Stev. var. **longispora** Batista n. ver. décrit sur **Amomis caryophyllata.**

Atas do IMUR
Ano I, págs. 53-77, 1960

ANALYTICAL REVISION OF SPECIES OF THE GENUS HYSTEROSTOMINA Theiss & Syd. (*)

A. CHAVES BATISTA
&
A. FERNANDES VITAL

The Polystomellaceae here revised are considered on the genus **Hysterostomina** Theiss. & Syd. which we revalidate, notwithstanding the opinion of C. G. Hansford in accepting it as a synonym of **Hysterostomella** Speg.

The presence of paraphyses is a character strong enough to maintain **Hysterostomina** as distinct from **Hysterostomella**, which is not paraphysate.

The species now in foccus are:
Hysterostomina bosciae (Doidge) Bat. & Vital n. comb.,
H. bromeliae Bat. & Vital n. sp.,
H. doidgei Bat. & Vital n. sp.,
H. palmae Stev.,
H. rhytismoides (Schw.) Bat. & Vital n. comb.,
H. sabalicola (Tracy & Earle) Bat. & Vital n. comb.,
H. tenella Syd. rev. and
H. uleana (Rehm) Theiss. & Syd.

HYSTEROSTOMINA BOSCIAE (Doidge) Batista & Vital n. comb.

Syn.: **Hysterostomella bosciae** (Doide) Doidge

Doidge — **in** Bothalia, vol. IV: 869, 1948
——— — **in** Bothalia, vol. V: 198, 1950

Cyclotheca bosciae Doidge

Publicação nº 111 (*)

Doidge — **in** Bothalia, vol. I: 196, 1924.

Free mycelium null.



Fig. 1

HYSTEROSTOMINA BOSCIAE (Doidge) Bat. & Vital.

Aspect of the locules under longitudinal cuts.

Orig.

Ascostromata amphigenous, each one in correspondence with identifical structure in the other side of the host leaves, and each longitudinally linked by a common hypostroma. The hypophyllous ascostromata are more visible with a border neater than those of the epiphyllous face. Generally

the ascostromata are scattered, in small number per each host leaf, roundish, 1—1.5 mm diam., 67—135 u in height, black, and almost gelatinous. The superior wall is dark-



Fig. 2

HYSTEROSTOMINA BOSCIAE (Doidge) Bat. & Vital.

Cracking of the ascostroma.

Orig.

brown, with well ill-definable structure, 10—27.5 u thick, with radiate margins and composed of hyphae 2.5—3.5 u diam, indistinctly septate; the basal wall is little detached. Fig. 1.

Locules linear, irregularly in relation to their form and dimensions, curved, free or joined together, having a longitudinal irregular crack, Fig. 2. The hypostroma is multiple, Fig. 3, consisting of cylindrical, compact and brownish-black columns, 27.5—42 x 35—40 u linking the opposed ascostromata; in the middle of the leaf deepness there can be seen in these columns subhyaline and septate hyphae, 3—6.5 u diam, which take part in the development of the hypostroma. Asci cylindric-clavate, sessile to short pedicellate,



Fig. 3

HYSTEROSTOMINA BOSCIAE (Doidge) Bat. & Vital. n. comb.

Details of the hypostroma.

Orig.

2-tunicate, 8-spored, 37.5—50 x 10—15 u. Paraphyses filiform, simple, septate, hyaline, 1.5—2 u diam. Ascospores elliptical, 1-septate, the superior cell more developed, not constricted, at first hyaline then brown, irregularly distichous. Fig. 4.

On leaves of **Maerua legatii** Burtt Davy, Olifants River, Transvaal; Leg. E. J. Scott, 27-5-943. Spec. nº 34028, Union of South África, Dept. Agric. Mycol. Herb.

Est **Hysterostomina per ascos paraphysatos.**



Fig. 4

HYSTEROSTOMINA BOSCIAE (Doidge) Bat. & Vital.

a) marginal portion of the ascostroma;
b) ascus and paraphyses;
c) ascospores.

Orig.

HYSTEROSTOMINA BROMELIAE Batista & Vital n. sp.

Mycelium superficial absent. Ascostromata epiphyllous, superficial, scattered, rarely in small groups, at first linear then irregularly ellipsoid with the margins more or less undulate to lobate and the ends elongate-acuminated, pulvinate, crustaceous, black, rough, hard carbonaceous, 2.5 — 12.5 x 1.5 — 3.5 mm and 120 — 205 u in height. The superior wall of the ascostromata is dense, opaque, blackish-brown, parenchymatic, composed of a radial agglutination of brown hyphae, indistinct, septate, 3.5 — 5 u wide; this agglutinate hyphae are of a radial disposition and visible at the margins only under the microscope; at the maturity the superior layer of the ascostromata shows numerous linear or irregular cracks, 35 — 110 u wide, and almost radially, Fig. 5. The inferior wall mounted on the cuticle

of the leaf host, is 50 — 100 u thick, prosenchymatic, and formed by 2-3 layers of brown, oblong to elongate cells, separate one from the other by a lax layer of indistinct hyphae. Hypostromata multiple, in several pillars, Fig. 6



Fig. 5

HYSTEROSTOMINA BROMELIAE Batista & Vital n. sp.

a) Frontal view of the ascostromata (enlarged).
b) Longitudinal section of the ascostromata.
Orig.

blackish-brown, 73 — 112 u deep, 58 — 85 u wide, penetrating the host through the cuticle and the epidermal tissue up to the lacunous parenchym and composed of layers of parallel hyphae; the mycelium is dense distributed on the mesophyllo and composed of hyaline hyphae, apparently continuous, inter and intracellularly disposed, and connected with the pillars; it does not invade the vascular system of the host. Hymenia irregularly or radially developed, linear and multilocular, found below all the ascostromata. Locules immersed, oblong to ellipsoid, 125 — 375 u wide, 62.5 — 125 u

in height. Asci cylindric-clavate, erect, 4-8-spored, bitunicate, more or less 70 — 82.5 x 17.5 — 22.5 u, sessile. Paraphyses very numerous, longer than the asci, filiform, septate, branched, hyaline, 2 — 2.5 u in diam. Ascospores ellipsoid-



Fig. 6

HYSTEROSTOMINA BROMELIAE Batista & Vital n. sp.

a) multiple hypostroma.
b) Details of the endogenous mycelium and their connexion with one hypostroma pillar.

100 x Orig.

oblong, 1-septate, constricted, at first hyaline, then blackish-brown, glabrous, distichous to conglobate, 20 — 27.5 x 7.5 — 10 u, Fig. 7.

On live leaves of **Bromelia sp.** Vitória. Leg. S. J. Silva, 27-5-56. Type 5644, IMUR.

Obs.: We accept Theiss & Syd. **Hysterostomina** genus, empha-



Fig. 7

HYSTEROSTOMINA BROMELIAE Batista & Vital n. sp.

a) Ascospores, ascus and paraphyses;
b) Detail of the radiate margin of the ascostromata;
c) General aspect of the frontal surface of the ascostromata.

Orig.

sizing the good signification of the paraphyses to separate this genus from Hysterostomella Speg. as well as for the generic differentiation in Microthyriales (see Batista, Monografia dos Fungos Micropeltaceae, 1958).

Mycelio libero nullo. Ascostromata epiphylla, superficialia, sparsa, linearia vel irregulariter ellipsoidea, marginibus undulatis vel lobatis, extremitatibus elongatis-acuminatis, pulvinatis, crustaceis, atris, rugosis, duro-carbonaceis, 2.5-12. x 1.5-3.5mm, 120-205 u alt. Paries superior densus et opacus, atro-brunneus, parenchymaticus, ex hyphis agglutinatis, 3.5-5 u cr, radialiter dispositis, linearibus vel irregulariter dehiscentibus, rimis 35-110 u diam; paries inferior 50-100 u cr, 2-3-stratosus, brunneus, prosenchymaticus. Hypostromata multipla ex epidermalia oriunda et mycelium in mesophyllo penetrans, inter vel intracellularibus, hyalinis, efformata. Hymenia irregulariter vel radialiter, linearia et plurilocularibus efformata. Loculis immersís, oblongis vel ellipsoideis, 125-375 u diam., 62.5-125 u alt. Asci cylindraceo-clavati, 4-8-spori, bitunicati, 70-82.5 x 17.5-22.5 u, sessili. Paraphysibus numerosissimis, filiformibus, ramosis, septatis, hyalinis, 2-2.5 u cr. Ascosporae ellipsoideae-oblongae, 1-septatae, constrictae, primo hyalinae dein atro-brunneae, leviae, districhae vel conglobatae, 20 27.5 x 7.5-10 u — In foliis vivis **Bromeliis sp.** Vitória. Leg. S. J .Silva, 27.5.56. Typus 5644, IMUR.

HYSTEROSTOMINA DOIDGEI Batista & Vital, n. sp.

(Dedicated to E. M. Doidge)

Free mycelium null.

Ascostromata amphigenous, scattered or confluent, flattened, orbicular, Fig. 8, with rough surface, 2 — 5 mm diam., 140 — 175 u in height, carbonaceous, black, plurilocular. The superior wall is black, opaque, 20 — 32,5 u thick, radiate, Fig. 9, and composed of brown hyphae, 5 — 7 u diam.; the inferior wall is brownish, having polygonal cells, 2,5 — 5 u long diam. Fig. 10.

Locules linear, curved or in **S**, **V** and **Y**, irregularly disposed, 330 — 600 u long. 115 — 160 u in height and 140 — 195 u wide, longitudinally cracked, the crack being 25 — 75 u wide. Asci ellipsoid to clavate, 2-tunicate, short pedicellate, 8-spored, 80 — 120 x 25 — 32 u. Paraphyses filiform, simple, septate, hyaline to brownish, 1 — 3,5 u. Ascospores ellipsoid, 1-septate, little constricted, brown, distichous 25 — 30 x 10 — 12,5 u. Hypostroma multiple epidermal, dark-brown, sometimes fused, composing a long plate, connected with the inferior wall of the ascostroma through columns of 17,5 — 35 x 17,5 — 35 u. Fig. 11.

On leaves of **Olea capensis** — Van Standen's Pass, Cape.



Fig. 8

HYSTEROSTOMINA DOIDGEI Bat. & Vital n. sp.

Frontal view of one ascostroma showing the irregular distribution of the locules.



Fig. 9

HYSTEROSTOMINA DOIDGEI Bat. & Vital n. sp.

Border part of the superior wall of the ascostroma.

E. M. Doidge, 13-11-917. Type, 10888 — Union of South Africa, Dep. Agric. Mycol. Herb. Associated with **Porina limbulata** (Krmph.) Vain? following R. Santesson.

Mycelio libero nullo.

Ascostromata amphigena, sparsa vel confluentia, plane-convexa, orbiculata, rugulosa, atra, 2-5 mm diam, 140-175 u alt., carbonacea,



Fig. 10

HYSTEROSTOMINA DOIDGEI Bat. & Vital n. sp.

Ascostroma under longitudinal cut.

pluriloculata; paries superior opacus, 20-32,5 cr, radiatim, ex hyphis brunneis, 5-7 u diam; paris basalis brunnescens ex cellulis polygonalibus, 2,5-5,5 diam. efformatus. Hypostromata multipla, brunnea, epidermalia, connectata per columnas 17,5-35 x 17,5-35 u composita. Loculis linearibus, curvis vel in **S V** et **Y** formis, irregulariter dispositis, 330-600 u long., 115-160 u alt, 140-195 u diam, longitudinaliter rimosis, 25-75 u diam. compositis.

Asci ellipsoidei vel clavati, 2-tunicati, curtopedicellati, 8-spori, 80-120 x 25-32 u. Paraphyses filiformes, simplices, septati, hyalini vel brunnescentes, 1-,5 u diam. Ascosporae ellipsoideae, 1-septatae, parvae constrictae, brunneae, 25-30 x 10-12,5 u.

In follis **Oleae capensis. Cape.** E. M. Doidge, 13-11-917. Typus, 10888, Union of South Africa, Dp. Agric. Mycol. Herb.

Obs.: This species has been determined as **Coconia porrigo** (Cke.) Sacc. by Doidge (Bothalia, 1:7, 1921, under number 10888.

From the examination of this material, however, we saw that it could not be fited to the genus **Coconia.** Its ascostromata does not possess annular locule not locules in concentric rings, and its hypostroma is limited to the epidermal — tissue, so that these characteristics correspond to the genus **Hysterostomina** Theiss. & Syd. On the other hand the dimensions of the asci and ascospores of the fungus

are not in accordance with the species **Coconia porrigo,** either.

We are then in condition to describe it as a new species



Fig. 11

HYSTEROSTOMINA DOIDGEI Bat. & Vital n. sp.

Ascus, paraphyses and ascospores.

Orig.

of **Hysterostomina** since in this genus no species described agrees with this fungus.

The specific epithet is offered as a hommage to Dr. E. M. Doidge who first collected and checked this fungus.

HYSTEROSTOMINA PALMAE Stevens

On Palm, British Guiana: Tumatumari, 1922
On Coccothrinax sp, Saint Michel, Haiti, 1924

"Spots discolored, yellowish, showing from both leaf sides, bordering the stromata by a band several millimeters wide. Stromata radiate, epiphyllous, roughly circular, nearly en-



Fig. 12

HYSTEROSTOMINA PALMAE Stevens.

a) An hystological cut of ascostromata showing multiple hypostroma;
b) sector of the superior wall of the ascostromata;
c) ascus and paraphyses.

Orig.

tire, black, 2 — 4 mm in diameter, superficial, but firmly attached. No free mycelium. Hypothecium, well developed, extending up into the mesophyll, brown, and attached to the inferior wall of the stromata base. Perithecia linear, irregularly arranged, 460 u in length, about 180 u wide, 110 — 145 u deep. Cleft 70 to 90 u wide, covering layer 18 to 25 u thick. Asci 8-spored, numerous; spores dark 1-septate, 18 — 21 x 7 u, one cell darker and slightly larger than the other asci 43 — 45 x 18 u, thickened at the apex. Paraphyses numerous, filiform." Fig. 12.

Stevens — **in** Illin. Biolog. Monog. VIII, Nr. 3, p. 10, 1923.

OBS.: We have examined the material n° 6413 of the collections of the "Bureau of Plant Industry (United States Department of Agriculture) determined by W. W. Diehl and collected by O. F. Cook on **Coccothrinax** sp., St. Michel, Haiti, 1924.

This material has been lent to us by the University of Michigan and its characters correspond entirely to the original description made by Stevens (op. cit.), above quoted.

HYSTEROSTOMINA RHYTISMOIDES (Schw.) Bat. & Vital, n. comb.

Syn.: **LEMBOSIA RHYTISMOIDES** (Schw.) B. & C.
B. & C., **in** Exot. Fungi Schwein, p. 292
Sacc., **in** Syll. Fung., II: 743, 1883
——— **in** Syll. Fung., XXIV: 410, 1926

HYSTEROSTOMELLA RHYTISMOIDES (Schw.) Rehm.
Rehm., **in** Hedwigia, pág. 301, 1898
Sacc., **in** Syll. Fung., XVI: 656, 1902
——— **in** Syll. Fung., XXIV: 410, 1926

HYSTEROSTOMELLA REHMII Maubl.
Maubl., **in** Bull. Soc. France, XXIII: 143, 1907

PARMULINA REHMII (Maubl.) Th. & Syd.
Th. & Syd., **in** Ann. Myc., XIII: 197, 1915

Without free mycelium. Stromata epiphyllous, Fig. 13, rare hypophyllous, elliptic, 1.5 — 3 x 1 — 1.5 mm, black, carbonaceous, plurilocular; the superior wall is opaque in the central area and radiate in the periphery, having 16 —

37.5 u in thickness and anastomosed hyphae of 3 — 5 u diam.; rima longitudinal, 56 — 100 u wide and margins entire or crenulate; the inferior wall is brown, 5 — 15 u thick. Locule linear irregularly disposed or convergent, to



Fig. 13

HYSTEROSTOMINA RHYTISMOIDES (Schw.) Bat. & Vital.

Stromata on a piece of **Bactris** leaf.

Orig.

the central area, multiascigerous, 64 — 88 u in height, 112 — 200 u wide Fig. 14. Hypostromata multiple, Fig. 15, brown-blackish, compact, subcuticular, 12.5 — 32.5 u height, 50 — 125 u wide. Asci ellipsoid or cylindric-clavate, sessile, 8-spored, 2-tunicate, 60 — 80 x 20 — 24 u. Paraphyses filiform, septate, simple, hyaline, 1.5 u diam. Ascosporos elliptic lengthened, 1-septate, little constricted, at first hyaline then brown, 2 — 3 seriate, 22.5 — 26.5 x 8 — 10 u.

On leaves of **Bactris** — Sta. Catarina, Brasil. Leg. E. Ule, 8-1885. This specimen is the type of **Hysterostomella rehmii** Maubl. and has the n° 507, Museum Botanicum Berolinense, E. Ule, Fungi Brasilienses, now as Exsic. Mus. Stockhl. We designate it as the type of the proposed new comb.

Parallely we have examined also the following specimens of this same fungus:

On leaves of **Palmae** Tucum — Icaraí, Paraná, Brasil, P. Dusen, 23-9-1908, as **Hysterostomella rehmii** Maubl.

On leaves of **Palmae** — Tucum — Icaraí, Paraná, Brasil, P. Dusen, 23-9-1908 as Micromycetes rariores selecti, Det. by Rehm. as **Hysterostomella rehmii** Maubl.

On **Palmae** — São Francisco, Brasil, n° 507, as **Hysterostomella rhytismoides**, Det. by Rehm.

Est **Hysterostomina** per stromata pluriloculata, hypostromata plura affixa, ascos paraphysatos et ascosporos brunneos, 1-septatos.

Discussion — This fungus has been described as **Lembosia rhytismoides** (Schw.) B. & C. **apud** Sacc. Syll. Fung. II: 743, 1883. In 1898 Rehm. (loc. cit.) considered it as **Hysterostomella rhytismoides** (Schw.) Rehm. However this

Fig. 14

HYSTEROSTOMINA RHYTISMOIDES (Schw.) Bat. & Vital.

Ascostroma showing multiple hypostroma and asci in a locular cavity.

Orig.

binomium has ben preoccupying by Spegazzini since 1889 and for this reason Maublanc (loc. cit.) changed the name to **Hysterostomella renmii** Maubl. Later on, Theis. & Syd.



Fig. 15

HYSTEROSTOMINA RHYTISMOIDES (Schw.) Batista & Vital. n. comb.
a) ascostromata under longitudinal cut;
b) detail of the margin of the superior wall;
c) ascus and ascospores;
d) ascospores.

Orig.

(loc. cit) changed again the name, calling it then **Parmulina rehmii** (Maubl.) Theiss. & Sydow.

Now, from the examination of Maublanc type material we verified that the stromata have multiple hypostroma and the asci are paraphysate. The characters of hypostroma, lacking the central foot, typical of **Parmulina**, and the presence of paraphyses, besides the phaeodidymous ascospores led us to recombine the name of this fungus on the genus **Hysterostomina**.

HYSTEROSTOMINA SABALICOLA (Tracy & Earle) Bat. & Vital n. comb.

Syn. **Hysterostomella sabalicola** Tracy & Earle

Tracy and Earle — **in** Bull. of the Torr. Bot. Club, pág. 185, 1901.
Sacc. — **in** Syll. Fung. XVII: 892, 1905.
Theiss. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 226, 1915.
Petr. & Cif. — **in** Ann. XXVIII: 383, 1930.
in Ann. Myc. XXX: 191, 1932.

Free mycelium absent.

Ascostromata amphigenous, mostly epiphyllous, meanwhile roundish to elliptical, 1 — 3 x 1 — 2 mm. black, carbonaceous, easily fragmentable; the surface is smooth, showing however salient points in correspondence with the locule. The superior wall is blackish-brown, opaque, 10 — 20 u thick, radiate at the margins where there can be seen the hyphae, 2,5 — 3,5 u diam; dehiscence by a longitudinal crack, 7,5 — 12,5 u wide, the inferior wall is brownish, 7,5 — 10 u in thickness, pseudoparenchymatic. The hypostroma is multiple Fig. 16, and composed of cylindrical pillars, 10 — 25 u wide, brown, opaque from which a tangle mass of brown and ellipsoid cells, 7,5 — 17,5 x 5 — 10 u is developed as subcuticular to epidermal; hyaline cells are in continuation of this mass penetrating deep the mesophyll of host. Locules linear irregularly disposed, trapezoidal in section, 80 — 150 u wide at the base and 49 — 88,5 in height. Asci ellipsoidei, 47,5 — 55 x 20 — 25 u, sessili, 2-tunicati, 8-spored.

Paraphyses filiform, septate, longer than the asci, simple, hyaline, 1 — 1,5 u diam.

Ascosporos clavate, 1-septate, little constricted, at first hyaline then brown, 16 — 25 x 7,5 — 10 u.

On leaves of **Sabal palmetto.** Longboat Key, Fla. U.S.A. Leg. S. M. Tracy, 4-22-1900.

Typus, 6597, ex Herb. S. M. Tracy, associate with **Graphiola phoenicis** (Mong.) Poit.



Fig. 16

HYSTEROSTOMINA SABALICOLA (Tracy & Earle) Bat. & Vital.

a) ascostromata under a longitudinal section;

b) detail of the margin of the ascostromata;

c) ascospores.

Orig.

We have also studied the following specimens of this same fungus: N° H. 15770, em Mycoflora Domingensis, Prof. R. Ciferri on **Sabal causiarum** (O. F. Cke) Becc. El jovero, 26-8930, previously det. by F. Petrak; N° 3993, ex Micoflora Domingensis, Prof. R. Ciferri, on **Sabal causiarum** —San José de las Matas, 11-4-930, det. by Petrak. all of them in perfect accordance with the above redescription. The specimen 4002, ex Mycoflora Domingensis, S. Ciferri, 28-2-931, on **Sabal causiarum** does not have any material for analyses.

Est **Hysterostomina** per ascos paraphysatos.

HYSTEROSTOMINA TENELLA Syd., rev. Bat. & Vital

Syd — **in** Ann. Myc. XIII: 228, 1915
Doidge — **in** Bothalia, vol. I: 9, 1921
Sacc. — **in** Syll. Fun., XXIV: 410, 1926

Syn.: **HYSTEROSTOMELLA TENELLA** H. & P. Syd.

H. & P. Syd. — **in** Ann. Myc. X: 442, 1912
Pole Eavns & Bottomby — **in Ann. of the Bolus** Herb. 2, p. 185, 1918
Doidge — **in** Bothalia, vol. IV: 870, 1948
Doidge — **in** Bothalia, vol. V: 198, 1950

Ascostromata on the stems, as black crusts, which generally encircle the branches of the host completely, in an extension of more than 15 mms; these crusts are carbonaceous, easily detached from the matris, with rough surface and multiloculate. The superior wall is 12.5 — 25 u thick, blackish-brown, opaque, radiate at the margins, where can be seen the hyphae, 2.5 — 5 u diam; the inferior wall little developed; brownish, mucilaginous. The hypostroma is multiple, but limited to the stomatal cavities, darkbrown, cylindraceous or prismatic, 20 — 25 x 12.5 — 17.5 u, Fig. 17. Loculis oblong or irregular, densely but irregularly disposed, 57 — 100 u in height, 47.5 — 80 u in diam. Asci ellipsoid to clavate, sessile, 8 spored, 2-tunicate, 47.5 — 57.5 x 17.5 — 20 u. Paraphyses filiform, simple, septate, hyaline, 1.5 — 2 u diam. Ascosporos ellipsoid or oblong, 1-septate, constricted, brown, 12.5 — 17 x 6 — 7.5 u. Fig. 18.

On stems of **Asparagus subulatus** Thunk — Kentani, Cape, Leg. A. Pegler, 19-3-912. Spec. n° 2240 Union of South Africa, Dep. Agric. Mycol. Herb.



Fig. 17

a) **ASPARAGUS SUBULATUS** with the black crusts of **Hysterostomina tenella** Syd.
b - c - d) Several aspects of the hypostroma of **H. tenella** Syd.

Obs.: This fungus has been named **Hysterostomella tenella,** H. & P. Syd, 1912; in 1915, (loc. cit.) Sydow renamed it as **Hysterostomina tenella** taking into consideration that the asci are paraphysate. Later on Doidge (in Bothalia IV: 870,



Fig. 18

HYSTEROSTOMINA TENELLA Syd.

a) Detail of the margin of the ascostromata;
b) ascus and paraphyses;
c) ascospores.

Orig.

1948 and V: 198, 1950, restored the old designation of **Hysterostomella,** putting aside the signification of the paraphyses. Now we revalidate the name **Hysterostomina** to distinguish the paraphysate fungi of the group, as intended Sydow, before.

HYSTEROSTOMINA ULEANA (Rehm.) Theiss. & Syd.

Theiss. & Syd., **in** Ann. Myc. XIII: 229, 1915

Syn.: **HYSTEROSTOMELLA ULEANA** Rehm.

Rehm., **in** Hedw. p. 301, 1898
Sacc., **in** Syll. Fung. XVI: 655, 1902
Theiss. & Syd., **in** Ann. Myc. XIII: 229, 1915

Syn.: **HYSTEROSTOMELLA ULEANA** (Rehm.) var. **ASCLEPIADEAE** P. Henn.
P. Henn., **in** Hedwigia, p. 90, 1904
Sacc., **in** Syll. Fung. XVII: 892, 1905
Theiss. & Syd., **in** Ann. Myc. XIV: 444, 1916

Without free mycelium. Stromata amphigenous, princi-

pally hypophyllous, roundish, 3 — 6 mm diam., black, Fig. 19, membranous, multilocular. The superior wall is in several layers 12.5 — 25 u in thickness, opaque at the central area and brown on the margins where radiate hyphae, 3 — 6 u



Fig. 19

HYSTEROSTOMINA ULEANA (Rehm) Theiss. & Sydow.

Stromata on a leaves of Apocynaceae.

diam., can be seen; ostiole linear, 45 — 67.5 u wide; the inferior wall is brownish and made up of polyedric and roundish cells, 2 — 5.5 u diam. Locule linear, irregularly disposed, multiascigerous, 62.0 — 95 u in height, 75 — 120 u in wideness. Hypostroma multiple, Fig. 20, epidermal,

globose-depressed, 30 — 45 x 15 — 20 u, crenate at the base and connected with the ascostromata through a cylindric column, 12.5 — 14.5 x 5 — 7.5 u, blackish-brown. Asci ellipsoid, nodose stipitate, 8-spored, 2-tunicate, 40 — 52.5



Fig. 20

HYSTEROSTOMINA ULEANA (Rehm) Theiss. & Syd.

a) stromata under longitudinal cut;
b) margin of the superior wall;
c) ascus and paraphyses.

Orig.

x 12.5 — 17.5 u. Paraphyses filiform, hyaline, septate, simple, but agglutinate, about 1.5 u diam. Ascosporos ellipsoide or oblong, 1-septate, constricted, at first hyaline, then brown, irregularly distichous, 11 — 12,5 x 6,5 — 7,5.

On leaves and stems of **Apocynaceae.** Tijuca, Rio de Janeiro, Brsail. Leg. E. Ule, 4-1893. Type nº 2054.

For the examination of type species we are indebted to the Mus. Bot. Stockhl.

We have examined another specimen from the same source labeled as **Hysterostomina uleana** (Rehm) Theiss. & Sydow and **Bagnisiella uleana** Rehm n. sp. on **Cabralea,** Meliaceae, coll. at Rio de Janeiro, by Ule, 9.1882.

The **Hysterostomina** was not found while the **Bagnisiella** is really **Botryosphaeria uleana** (Rehm) Bat. & Vital n. comb.

RESUMO

Revalidando o gênero HYSTEROSTOMINA Theiss. & Syd. que reconhecem como autônomo, por possuir paráfises, em relação a **HYSTEROSTOMELLA** Speg. que é aparafisado, os A. A. estudam neste trabalho as seguintes espécies :
HYSTEROSTOMINA BOSCIAE (Doidge) Bat. & Vital n. comb. sôbre **Maerua legatum,**
H. BROMELIAE Bat. & Vital n. sp. sôbre **Bromelia sp.,**
H. DOIDGEI Bat. & Vital n. sp. sôbre **Olea capensis,**
H. PALMAE Stevens sôbre **Coccothrinax sp.,**
H. RHYTISMOIDES (Schw.) Bat. & Vital sôbre **Palmae,**
H. SABALICOLA (Tracy & Earle) Bat. & Vital n. comb. sôbre **Sabal palmetto** e **S. causiarum,**
H. TENELLA Syd. rev.
H. ULEANA (Rehm) Theiss. & Syd. sôbre Apocynaceae.

RÉSUMÉ

Les auteurs font la revalidation du genre **HYSTEROSTOMINA** Theiss. & Syd car il possède des paraphyses se diversifiant ainsi de **Hysterostomella** Speg. qui n'en a pas, et étudient ces espèces: **Hysterostomina bosciae** (Doidge) Batista & Vital n. comb. sur **Maerua legatum, H. bromeliae** Batista & Vital n. sp. sur **Bromelia sp., H .doidgei** Batista & Vital n. sp., sur **Olea capensis, H. palmae** Stevens sur **Coccothrinax sp., H. rhytismoides** (Schw.) Batista & Vital sur **Palmae, H. sabalicola** (Tracy & Earle Batista & Vital n. comb. sur. **Sabal palmetto** et **S. causiarum H. tenella** Syd. rev. H. uleana (Rehm) Theiss & Syd. Apocynaceae.

Sspecial thanks are due to Prof. Abel A. Serpa for revising the text in English.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 79-92, 1960

(112)

A REVISION OF SOME SPECIES OF THE GENERA **MELANOPLACA** Syd., **MENDOGIA** Racib. and **PALAWANIA** Syd.

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

Some species of the genera **Melanoplaca** Syd., **Mendogia** Racib. and **Palawania** Syd. are revised in this paper.

The illustration which follows the redescription of each species is a contribution to a better understanding of the general characteristics of the fungi of the family Polystomellaceae.

The fungi here studied are: **Melanoplaca dipteridis** Syd., **Mendogia bambusina** Rac., **Palawania cocoes** Syd., **P. dovyalidis** (Doidge) Nel., **P. grandis** (Niessl.) Syd. and **P. orbiculata** (Syd.) Doidge.

To the Mycol. Herb., Union of South África, our best thanks for the opportunity to see the fungi above mentioned.

MELANOPLACA DIPTERIDIS Syd.

Syd. — **in** Ann. Myc. XV: 222 and 412, 1917
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 414, 1926.

Colonies epiphyllous, black, slightly elevate, roundish, 2 — 5 mm diam., generally confluent, spread, visible on the opposite side of the host leaf through transparence. Free mycelium null. Ascostromata very small, black, granuliform, crustaceous, 86 — 170 u diam., 60 — 90 u in height, numerous, free or confluent, unilocular. The superior wall is blackish-brown, generally opaque, 8 — 22,5 u in thickness, the margins being formed by radiate hyphae 2,5 — 4 u diam., irregularly cracked; the inferior wall is subhyaline to brownnish, 4,5 — 13 u thick.

(*) Publicação nº 112

The hypostroma is characterized by a subcuticular plate of one layer of subglobose brown cells, 3 — 7,5 u diam connected with the inferior wall of the ascostromata by means of several pillars. Locules irregularly depressed-globose, polyascigerous, 73 — 157 x 49 — 80 u. Asci ovoid to oblong-ovoid 2-tunicate, sessile, 8 spored, 30 — 49 x 25



Fig. 1

MELANOPLACA DIPTERIDIS Syd.

a) b) ascostromata and picnostromata under a longitudinal cut;
c) ascostromata margin;
e) ascus;
f) ascospores.

— 36 u aparaphysate. Ascospores oblong, 1-septate, hyaline at first then brown, irregularly disposed, 20 — 25 x 7,5 — 10 u.

Pycnostromata similar to the ascostromata but developed beneath the cuticle, then irrumpent; conidiophores not seen. Pycnidiospores ellipsoid, continuous, hyaline,

2 — 3 x 1 — 1,5 u in all the cavity of the pycnostromata produced. Fig. 1.

On leaves of **Dipteris conjugata**, Luzon, Prov. Bengnet, Bagnio, Leg. M. S. Clemens, VI, 1923. Spec. n° 156, F. Petrak, Mycotheca Generalis.

Obs.: **Sydow** (loc. cit.) has not described the pycnostromata, now mentioned.

The type species which we have also examined is in a full accordance with the above description. Spec. n° 9239, ex Flore of the Philippines (Herb. of the Bureau of Science) on **Dipteris conjugata** Pauai, **Bengnet** Luzon.

Leg. M. S. Clemens, Jan. 1915.

MENDOGIA BAMBUSINA Rac.

Rac. — **in** Parasit. Algen und Pilze Javas III: 301, 1900.
Sacc. **in** Syll. Fung. XVI: 669, 1902.
Sin.: **Uleopeltis bambusina** Syd.
H. & P. Syd — **in** Ann. Myc. XII: 565, 1914.
Th. & Syd — **in** Ann. Myc. XIII: 218, 1915.
Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XV: 408, 1917.

Ascostromata black, carbonaceous, scattered, superficial, roundish, 2 — 3,5 mm diam., flattened, the central part being sterile and surrounded by one or two elevate rings which correspond to the locules; these rings may be concentric or confluent, as well as interrupted. The superior wall of the ascostromata is blackish-brown, 16 — 34 u in thickness, opaque, clearing to the borders where the radiate structure can be seen with hyphae 4,5 — 5,5 u diam.; the inferior wall is hyaline, 10 — 35 u thick and composed of subglobose cells, 2,5 — 5,5 u diam. The hypostroma is multiple, diminute, reduced to small expanded portions of the ascostromata, inverted conoid, brown, 7,5 — 10 x 5.5 — 7,5 u and limited to the epidermal tissue of the host. Fig. 2.

Locules linear, anular, of trapezoidal section in a transversal cut, 140 — 180 u wide, 52,5 — 80 u in height, showing longitudinal crack, 11 — 32 u wide. Asci cylindric-clavate, sessile or short stipitate, 8-spored, 2-tunicate, parallel, 50 — 80 x 17,5 — 25 u. Paraphyses filiform, simples, longer than the asci, septate, hyaline, 1,5 — 2 u thick.

Ascospores ovoid-oblong, 4 — 7 transversally septate,

Fig. 2

MENDOGIA BAMBUSINA Rac.

a) longitudinal section of ascostromata;
b) detail of the margin;
c) ascus and paraphyses.

Orig.

muriform, little constricted, irregularly distichous, smooth, hyaline, 20 — 25 x 7,5 — 10 u.

On culm of **Bambusa sp.** Angat, Bulacan, Luzon, Philippines. Coll. M. Ramos, Sept. 1913. Distributed by the Herbarium of the University of California as **Uleopeltis bambusina** Syd.

Obs.: We have also examined the following specimens of this fungus, all of them in accordance whit the diagnosis characteristics, while a little immature: On "Bamboo wood" from Philippine Islands, intercepted at New York City, by Whitlock & Kostal, Feb. 17, 1935, det. by E. K. Cash. Spec. nº 54460, U.S.A. National Fungus Collections.

On "Bamboo" ex México, intercepted at Laredo, Texas, Aug. 14, 1943, by A. H. Lewis, det. by E. K. Cash. Spec. nº 32532, U. S. A. National Fungus Collections.

PALAWANIA COCOES Syd.

Syd. — **in** Philipp. Journ. of Sc.,
Sect. C., Bot., IX, nº 2, p. 172, 1914
Th. & Syd. **in** Ann. Myc. XIII: 250, 1915
Sacc. **in** Syll. Fung. XXIV: 414, 1926
Petr. & Deighton — **in** Sydowia, VI: 314, 1952

Free mycelium absent.

Stromata on the external part of the palm leaves, at first single, roundish to ellipsoid then being confluent in lengthened crusts on the longitudinal direction, up to 12 mm long and 6 mm wide, black and carbonaceous. The superior walls are 12,5 — 30 u in thickness, brownish-black in the central area and brownish to the margins where radiate hyphae can be seen, with 2,5 — 5,5 u diam.; the margins, properly, may be entire or irregular.

The inferior wall is 6 — 11 u thick, hyaline, with indistinct structure. Locules roundish to ellipsoid, polyascigerous, irregularly disposed, and having bad defined ostiole.

Hypostromata multiple, composed of dark brown pillars which are formed by brown and intermixed hyphae, 25 — 50 u in height, 15 — 37,5 u wide; from these pillars bundles of hyphae down into the host tissues, chiefly through the intercellular spaces, as well as simple hyphae that come from the base portion of the pillars. Fig. 3, a-b-c.



Fig. 3

PALAWANIA COCOES Syd.

Details of the hypostroma.

Orig.

Asci ellipsoid, sessile to short pedicellate, 8-spored, 2-tunicate, 57 — 76 x 22,5 u.

Paraphysis numerous, filiform, simple or branched, septate.



Fig. 4

PALAWANIA COCOES Syd.

a) Paraphysate ascus;
b) ascospores;
c) Detail of the margin of the ascostromate.

Ascospores ellipsoid, hyaline at first, then brownish, 1-septate, little constricted, irregularly distichous, 20 — 25 x 8 — 10 u. Fig. 4 a - b - c.

On leaves of **Cocos sp.** Taytay, Palawan, leg. E. D. Merril, April, 1913.

Type, n° 8764, ex Herb. of the Bureau of Science — Flore of the Philippines — New York Botanical Garden.

PALAWANIA DOVYALIDIS (Doidge) Nel.
in Ann. Univ. Stell. XX A2: 22, 1942
Syn. **Palawaniella doyalidis** Doidge
in Bothalia, 1: 198, 1924

Free mycelium null. Ascostromata epiphyllous, superficial, black, isolate, gregarious or confluent, compounding roundish concentric groups from 2 to 7 mm diam., Fig. 5; individually they are blackish-brown, convex-flattened, 176 — 360 x 175 — 220 u, almost orbicular, 56 — 80 u in height, carbonaceous; the superior wall is opaque, radiate in structure, subparenchymatic, 12 — 20 u thick and made up of rectangular or polygonal cells, 4.5 — 9 x 4— 5.5 u; these

cells, at the margins, are more lengthened, 5.5 — 15 x 3.5 — 10 u; the basal wall is very thin, indistinct. Hypostroma epidermal, multiple, formed by brown hyphal knots or balls of polygonal cells, 3.5 — 8 x 2.5 — 3 u located inside the epidermic cells and connected with the basal portion of the ascostroma through many brownish filaments; from the inferior part of these knots may be developed some delicate subhyaline hyphae strands in the direction of the palisade tissue. Locule flat, 1 — 2 each ascostroma opening by the cracking of the superior wall, in semicircular, longitudinal



Fig. 5

PALAWANIA DOVYALIDIS (Doidge) Nel.

Ascostromata disposition.

Orig.

or irregular stellate fissures. Asci clavate or ellipsoid, short pedicellate, 2-tunicate, 8-spored, 33 — 54 x 13.5 — 17 u. Paraphyses filiform, simple, septate, hyaline, 1 — 2. 5 u diam. Ascospores clavate, 1-septate, constricted with unequal cells at first hyaline, then brown, polystichous, 15 — 18 x 5 — 8.5 u. Fig. 6.

On leaves of **Dovyalis rhamnoides** Wilderness, George District, 10-5-1923. Leg. E. M. Doidge, n° 17117, type in Union of South Africa, Dep. Agric. Mycol. Herb.

It is associated with **Palawaniopsis dovialydis** Bat. & Nasc. n. sp. probably as the imperfect stage of this **Palawania.**



Fig. 6

PALAWANIA DOVYALIDIS (Doidge) Nel.

a) A longitudinal cut of the ascostroma showing the hypostroma disposition;
b) Asci and paraphyses;
c) ascospores.

Orig.

PALAWANIA GRANDIS (Niessl) Syd.

Syd. — **in** Philipp. Journ. Sc. (Cc) Botany, vol. IX, N° 2, pág. 171, 1914.
Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII:
———— — **in** Ann. Myc. XV: 412, 1917

Syn.: **Microthyrium grande** Niessl

Rabh. — **in** F. eur. N° 2467

Seynesia grandis Wint.

Wint. — **in** Hedwigia, pág. 107, 1886
Sac. — **in** Syll. Fung. IX: 1064, 1891

Seynesia calamicola P. Henn & Nym.

P. Henn & Nym — **in** Monsunia, pág. 160, 1899
Sacc. **in** Syll. Fung. XVI: 641, 1902.
F. L. Stevens — **in** The Microthyriaceae, pág. 24, 1939

Free mycelium lacking.

Stromata around the leaf rachis, superficial, roundish, 330-560 u diam. 65 — 93 u in height, unilocular, black, smooth, little carbonaceous, easily detached from the host, and generally confluent, forming irregular crusts. The superior wall is blackish-brown, opaque, in the central area and radiate to the margins where brown hyphae of 2 — 5 u wide can be seen; the margins are regular or undulate, with some elevate parts; the inner side of this wall is clearly pseudo-parenchymatic.

Ostiole central, roundish, 22 — 37.5 u diam. The inferior wall is hyaline to brownish, 2.5 — 7.5 u wide with bad defined structure. The hypostroma is multiple, having pillars of 12.5 — 22.5 u in height, 15 — 27 u wide, dark, brown, prosenchymatic; it produces brown masses of hyphae which are developed in the subpidermical tissues sometimes as compact plates; the vascular is not reached by these hyphae. The locule is plane-convex, 120 — 260 u diam and 50 — 70 u in height.

Asci ellipsoid-elongate, short pedicellate, when young, 2-tunicate, 65 — 85 x 20 — 22.5 u.

Paraphyses numerous, filiform, septate, simples or branched, longer than the asci, 1.5 — 2 u diam. Ascospores



Fig. 7

PALAWANIA GRANDIS (Niessl.) Syd.

a) ascostromata under a longitudinal section;
b) Detail of the margin of the superior;
c) ascus and paraphyses;
d) ascospores.

Orig.

ellipsoid-elongate, 1-septate, constricted, at first hyaline then brown, distichous, 22.5 — 27 x 8 — 10 u. Fig. 7.

On leaves of **Calamus sp.** Tayatay, Palawan. Leg. E. D. Merrill, Apr. 1913. Det. H. Syd. Spec. nº 8739, Herba. of the Bureau of Science — Flore of the Philippines.

Also we have studied the following specimens:

Nº 8757 — on **Calamus sp.** Taytay, Palawan, Philippines — Leg. E. D. Merrill, Apr. 1913. Bureau of Science; the locule are empty in this material;

Nº 8794 — Bureau of Science, Philippines, without any structure of this fungus.

Nº 266 — on **Daemonorops** sp. Mount. Maquiling. Los Banos, Laguna, Philipp. C. F. Baker, Dec. 1915. Det. by H. Sydow.

Nº 8872 — on **Flagelaria indica**, Taytay, Palawan. Leg. E. D. Merrill, May, 1939. Det. by H. Sydow. Bureau of Science, Philipp.

Nº 8847 — on **Drymaria quercifolia,** Taytay, Palawan, Philipp. Leg. E. D. Merril, Apr. 1913. Det. by H. Syd. Bureau of Science, Philipp.
It does not have ascospores.

Nº 8808 — on **Oncosperma harrida** Taytay, Palawan, E. D. Merrill, Apr. 1913. Bureau of Sciences, Philipp. Det. H. Syd.

PALAWANIA ORBICULATA (Syd.) Doidge

in Bothalia, IV: part IV, p. 242, 1948

Seynesia orbiculata Syd.
in Ann. Myc. 10: 39, 1912

Palawaniella eucleae Doidge,
in Bothalia I: 16, 1921

Hysterostomina eucleae (Doidge) von der Bul.
in S. Afric. Journ. Sci. 22: 192, 1925

Palawania eucleae (Doidge) Nel.
in Ann. Univ. Stellenbosch, XX A2: 22, 1942

Palawaniella orbiculata (Syd.) Doidge
in Bothalia, IV: 329, 1942

Free mycelium null. Stromata epiphyllous, superficial, scattered or confluent, roundish, 1.5 — 7 mm diam., convex,



Fig. 8

PALAWANIA ORBICULATA (Syd.) Doidge.

a) Ascostroma under longitudinal cut, showing the hypostroma;
b) Detail of the margin of the superior wall;
c) Ascus and paraphyses;
d) Ascospores.

carbonaceous, blackish-brown. The superior wall is radiate, subparenchymatic, up to 12 — 17 u in thickness, composed of rectangular or polygonal cells, 4.5 — 8 x 3 — 5.5 u, black at the center, brown at the margins which are undulate, and cracked by stellate or longitudinal fissures; the inferior wall is very delicate, subhaline. Hypostroma epidermal, multiple, filling the epidermic cells with hyphae balls constituted of polygonal cells, 4.5 — 9 x 2.5 — 3.5 u, the hyphae balls are connected with the basal part of the ascostroma by fine hyaline to brownish filaments 1 — 1.5 u diam.; from this hypostroma there grow a few hyphae to the subepidermical tissues. Locule roundish or irregular, 120 — 200 x 115 — 160 u, having 49 — 54 u in height. Asci clavate to ellipsoid, 2-tunicate, short pedicellate, 8-spored, 34 — 57 x 19.5 — 27.5 u. Paraphyses filiform, simples, septate, hyaline, 1 — 2.5 u diam. Ascospores oblong to cylindric-clavate, hyaline at first then 1-septate, constricted brown, 17 — 21 x 7 — 10 u. Fig. 8.

On leaves of **Euclea lanceolata** E. Mey. Piesanghoek, Transvaal. Leg. W. Bosman, 11-1-1931, nº 25868. Union of South Africa. Dep. Agric. Mycol. Herb.

Also on **Euclea macrophylla** E. Mey. and **Euclea natalensis** A. D. C.

Revis. by A. Chaves Batista & M. L. Nascimento, 15-5-1957.

RESUMO

Focalizam os A. A., neste trabalho, os seus estudos de revisão taxanômica sôbre algumas espécies de fungos **Polystomellaceae.**

Assim, são redescritos os seguintes fungos : **Melanoplaca dipteridis** Syd. sôbre **Dipteris cunjugata, Mendogia bambusina** Rac. sôbre **Cocos sp., Palawania dovyalidis** (Doidge) Nel. sôbre **Dovyalis rhamnoides, P. grandis** (Niessl.) Syd. sôbre Calamus sp. e outros hospedeiros e **P. orbiculata** (Syd.) Doidge sôbre **Euclea lanceolata, E. macrophylla** e. **E. natalensis.**

RÉSUMÉ

Ce travail contient une revision taxonomique sur quelques espèces de champignons Polystomellaceae : **Melanoplaca dipteridis** Syd. sur. **Dipteris conjugata, Mendogia bambusina** Rac. sur **Cocos sp., Palawania dovyalidis** (Doidge) Nel. sur **Dovyalis rhamnoides, P. grandis (Niessl** Syd. sur Calamus sp et d'autres hôtes et **P. orbiculata** (Syd) Doidge sur **Euclea lanceolata, E. macrophylla** et **E. natalensis.**

Atas do IMUR
Ano I, págs. 93-115, 1960

A TAXONOMIC STUDY OF SOME SPECIES OF THE GENERA **PARMULINA** Theiss. & Syd., **PLEIOSTOMELLA** Syd., **POLYCYCLUS** Höhnel and **POLYRHIZON** Theiss. & Syd. (*)

A. CHAVES BATISTA

A. FERNANDES VITAL

We are presenting the results of our study on the revision of some fungi species of the genera **Parmulina** Theiss. & Syd., **Pleiostomella** Syd., **Polycyclus** Höhnel and **Polyrrhizon** Theiss. & Syd. on the family Polystomellaceae.

For this work the A. A. are indebted to several mycologists and official mycological entities, chiefly Prof. R. Ciferri, from Pavia, Italy, and Mus. Bot. Stockhl., Dept. Agric. Union of South Africa.

The species revised are the following: **Parmulina callista** Syd., **P. stenochlaenae** (Syd.) Petrak, **P. stigmatopteridis** (Ferd. & Wge) Theiss. & Syd., **P. uleana** (P. Henn.) Theiss. & Syd., **Pleiostomella halleriae** Doidge, **Polycyclus andinus** (Pat.) Theiss. & Syd., **Polyrrhizon bewsii** Doidge, **P. celastri** Doidge and **P. pterocelastri** Doidge.

PARMULINA CALLISTA Syd.

in Ann. Myc. XXV: 21, 1927
Ann. Myc. XXX: 225, 1932

Stromata hypophyllous to amphigenous, scattered, roundish or elliptic, flat, 1 — 2,5 mm diam., 100 — 150 u in height. The superior wall is carbonaceous, black, opaque, 16 — 25 u in thickness, the margins being radiate and composed of brown hyphae, 2.5 — 5 u in diam.; the inferior wall is dark-brown, 20 — 25 u thick, connected with a central hypostroma. Fig. 1, little defined, and up to 250 u wide,

(*) Publicação nº 113



Fig. 1

PARMULINA CALLISTA Syd.

Stromata implanted with a central hypostroma.

Orig.



Fig. 2

PARMULINA CALLISTA Syd.

a) Stromata and locules;
b) Stromata with a central foot;
c) Locule;
d) Ascus and ascospores.

Orig.

epidermal, from which the hyaline hyphae go into the palisade tissue of the other face of the leaf in the same mode as does **P. uleana** (P. Henn.) Theiss. & Syd. Locule numerous, linear, radially disposed, up to 1 mm long and 100 — 130 u wide, longitudinally dehiscent. Asci clavate, 2-tunicate, 45 — 55 x 13 — -8 u. Paraphyses fibrous producing brownish epithecium. Ascospores oblong-clavate, 1-transversally septate, constricted distichous to tristichous, at first hyaline, then brown, 15 — 17 x 5 — 6.5 u, easily fragmentable at the septum. Fig. 2.

On leaves of **Ocotea floribunda** — Cord. Centr. prov. de Vega at Rio Maimon. Leg. E. L. Ekman, 18-12-930. Spec. nº 4003, Herb. Prof. R. Ciferri, Mycoflora Domingensis.

PARMULINA DIMORPHOSPORA (Maire) Theiss. & Syd.

in Ann. Myc. XIII: 197, 1915
Syn. **Parmularia dimorphospora** R. Maire
In Ann. Myc. VI 149, 1908.
Syll. Fung. XXII: 554

Through the courtesy of the Bot. Mus. Stockhl. we have examined one exsiccate labeled as: "Herbier R. Maire. **Parmularia dimorphospora** Maire, Brésil: Mandaqui, pr. São Paulo, in foliis Murtaceae, A. Usteri leg. 18-1-1907. R. Maire".

Unfortunately, there was no more fungus structure in this exsiccate.

PARMULINA EXCULPTA (Berk.) Theiss. & Syd.

in Ann. Mycol. XII: 194, 1914
Syn.: **Dothidea exculpta** Berk. Hook.
Kew Journ. pag. 232, 1854.
Phyllachora exculpta (Berk.) Sacc.
Syll. Fung. II: 613, and IX: 1019.

Through the courtesy of the Bot. Mus. Stockhl. we examined the following exsiccates:

Ex Herb. Sydow, on **Aporosa lindleyana** Ceylon, Rambukan, 4,1868, det. as **Phyllachora exculpta** (Berk.) Sacc. The ascostroma are empty.

PARMULINA STENOCHLAENAE (Syd.) Petrak

F. Petrak — **in** Ann. Myc. XXVII: 377, 1929
Sin.: **CHAETASPIS STENOCHLAENAE** Syd.
Syd — **in** Ann. Myc. XV: 219, 1917

Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 419, 1926.

Free mycelium null.

Stromata amphigenous, single, roundish, 1.5 — 4.5 mm diam., black, flattened at the periphery and elevated at the



Fig.3

PARMULINA STENOCHLAENAE (Syd.) Petrak.

Detail of the stromata central foot.

Orig.

central part. The superior wall is dark-brown, in several layers, 7.5 — 20 u in thickness and made up of radial hyphae, 2.5 — 4 u diam., indistinct septate; at the center there is a longitudinal crack, 60 — 80 u wide; the margins are little fimbriate. The inferior wall is dark-brown, 7.5 — 17.5 u thick.

Locules linear, radially disposed around a sterile center, 100 — 120 u wide and 50 — 70 u in height. The hypostroma is simple, central, Fig. 4 epidermal, brown, having a cylindrical foot which reaches 180 u wide withe a dilate base. Fig. 3.

Asci cylindric-clavate, sessile or short filiform. Ascospores ellipsoid, brownish, 1-septate, not constricted, irregularly distichous, 12 — 15 x 2.5 — 4 u.

Fig. 4

PARMULINA STENOCHLAENAE (Syd.) Petrak.

a) Stromata with a central foot and pycnidial loculis;
b) A ascigerous loculum;
c) Ascospores.

Orig.

Pycnidial locules immersed in the central area of the stromata, ellipsoid to flattened, simple or multiple, 225 — 562 u diam. 45 — 75 u in height; the individual locules may be 27 — 115 u diam and 35 — 70 u in height; the pycnidial walls are dark-brown, 10 — 35 u wide. Fig. 5.



Fig. 5

PARMULINA STENOCHLAENAE (Syd.) Petrak.

Pycnostromata under a transversal section.

Orig.

Conidiofores not observed. Pycnidiospores fusoid, in all pycnidial cavity, continuous, guttulate, hyaline, 7.5 — 12.5 x 1.5 — 2 u.

On leaves of **Stenochlaena palustris** San Antonio, Province of Laguna, Luzon, Philippines. Leg. M. Ramos, Oct. 1915. Spec. n° 23753, ex Herb. Sydow, Mus. Bot. Stockhl. Coll. Flora of the Philippines.

Obs.: This fungus was labeled as **Chaetaspis stenochlaenae** Syd. (loc. cit.) and supposed to have setose ascostromata. Later, Petrak, 1929 (loc. cit.) verified that the setae belonged to other associate fungus.

Our observations agree entirely with those of von Petrak.

PARMULINA STIGMATOPTERIDIS (Ferd. & Wge.) Theiss. & Syd.
in Ann. Myc. XIII: 196, 1915

Syn.: **Parmularia stigmatopteridis** Ferd. & Wge.
in Bot. Tidsskrift, XXIX: 319,
Syll. Fung. XXII: 513, 1913

Free mycelium null. Stromata black, at first punctiform, up to 1 mm diam. scattered, then gregarious forming irregular crusts which reach 4 mm wide and 15 mm in extension, between the secondary nerve of the leaves. Fig. 6. The superior wall of the stromata is radiate, brown, and composed of rectangular hyphal cells, 2.5 — 8.5 x 1.5 — 3 u, showing a longitudinal crack, 7.5 — 19 u wide; the inferior wall is



Fig. 6

PARMULINA STIGMATOPTERIDIS (Ferd. & Wge.) Theiss. & Syd.
Locules, under longitudinal cut.
Orig.

pseudo-parenchymatic, brown, 5 — 12.5 u thick, connected with a central hypostroma, Fig. 7, brown and developed into the epidermal tissue. Locule linear, radiate. Asci cylindric-clavate, 8-spored, sessile, 2-tunicate, 30 — 42.5 x 10 — 12.5 u. Paraphyses filiform, septate, hyaline, 1 — 1.5 u thick. Ascospores elliptic-clavate, at first hyaline, then brown, 1-septate, but sometimes the inferior cell of the ascospore has one more septum, constricted 11 — 14 x 4 — 5 u. In the



Fig. 7

PARMULINA STIGMATOPTERIDIS (Ferd. & Wge.) Theiss & Syd.

a) Stromata with a central foot;
b) Locules, not completely developed;
c) Detail of the stromata border;
d) Ascus and paraphyses;
e) Ascospores.

bicellular ascospores the superior cell is larger than the inferior cell.

On leaves of **Phegopteris allaeoptera** M. Merida. Leg. Engl. Spec. not numb. Mus. Stockhl. ex Herb. Syd.

We have also examined two other specimens of this same fungus, which are in perfect accordance with the description: n° 688, coll. by Sggers at Dominica 12, 1881, on **Stigmatopteris rotundata**, and n° 2536, coll. by W. Maxon, at Jamaica, 1904, on **Dryopteris patens**, both from Mus. Bot. Stockhl. ex Herb. Syd.

PARMULINA ULEANA (P. Henn.) Theiss. & Sydow
Theiss & Sydow — **in** Ann. Myc. XIII: 196, 1915

Syn.: **Parmularia uleana** P. Henn.
P. Henn. — **in** Hedwigia, p. 206, 1898
Sacc. — **in** Syll. Fung. XIV: 709, 1899

Free mycelium absent. Stromata epiphyllous, Fig. 8, roundish, black, carbonaceous, 1 — 2 mm diam., pluriloculare. The superior wall is blackish-brown, opaque at the central area, 20 — 37.5 u in thickness, radiate, the hyphae free



Fig. 8

PARMULINA ULEANA (P. Henn.) Theiss & Syd.

Ascostroma on a piece of leaf of **Aechmea pectinata.**

at the margins, 5 — 10 u diam.; ostiole linear, 16 — 56 u wide; the inferior wall is brownish, 5 — 12 u diam. Locules linear, radially disposed, pluriascigerous, 230 — 315 u in wideness, 88 — 105 u in height, Fig. 9. Hypostroma as a

central cylindraceous foot, Fig. 10, blackish-brown, 51 — 125 u in height, 44 — 106 u wide, from which develops the internal hyaline mycelium up to the mesophyllum. Asci ellipsoid,



Fig. 9

PARMULINA ULEANA (P. Henn.) Theiss & Syd.

a) ascostromata under longitudinal cut;
b) portion of the free end of the superior wall;
c) ascus and paraphyses.

Orig.

sessile, 8-spored, 2-tunicate, 60 — 70 x 20 — 25 u. Paraphyses filiform, hyaline, septate, simple, but agglutinate, about 1 u diam. Ascospores ellipsoid or oblong, 1-septate, cons-

tricted, the cells unequal, at first hyaline, then brown, 22.5 — 25 x 7.5 — 10 u, 2 — 3 seriate.

On leaves of **Aechmea pectinata,** Mauá Square, Rio de Janeiro, Brasil, Leg. E. Ule, Sept. 1895.



Fig. 10

PARMULINA ULEANA (P. Henn.) Theiss & Syd.

A longitudinal cut of the ascostromata showing the central foot and the internal mycelium.

Orig.

This specimen which we have studied — Rabenhorst Pazschke, Fungi Europaei et extraeuropaei, n° 4367, appears to be part of the type.

We are indebted to the Mus. Bot. Stockhl. for lending us this material.

PLEIOSTOMELLA HALLERIAE Doidge
in Bothalia, 1: 17. 1921.

Free mycelium null. Stromata superficial, scattered, epiphyllous, roundish, up to 3 mm diam. and 100 to 115 u in height, black. The superior wall is radiate, 30 — 45 u in thickness, brown, opaque, becoming lighter to ward the margins which are entire and composed of brown hyphae, 2.5 — 4 u wide, rarely septate; the inferior wall is 30 — 36 u thick, brown and attached to a multiple hypostroma, from which the hyaline hyphae go into the parenchymatic tissue; the hypostroma is connected with ascostroma by thin hyphal filaments, continuous or septate, brownish, about 1 to 1.5 u in diam., Fig. 11. Locule numerous, roundish, 190 — 250 u diam. or ovoidal, 250 — 280 x 15 — 160 u densely grouped in concentric circles. Asci ovoid to clavate, 66 — 70 x 20 —

23 u, brick-red under the iodine, 2-tunicate, sessile. Paraphyses filiform, hyaline, 1 — 1,5 u thick, soon disappearing. Ascospores oblong, at first 1-septate, constricted, then muriform, 5 — 7 transversally septate with 1 longitudinal septum, hyaline, 22 — 24 x 9 — 10 u.



Fig. 11

PLEIOSTOMELLA HALLERIAE Doidge.

a) Ascostroma implantation;
b) Detail of the ascostroma border.

Orig.

On **Halleria lucida** — Van Stadens'Pass, Cape, Union of South Africa, 13-11-917. Spec. nº 10872 coll. by E. Doidge. **Obs.:** — This specimen was not fully ripe and for this reason we took the dimensions of asci and ascospores from the original diagnosis.

POLYCYCLUS ANDINUS (Pat.) Theiss. & Sydow

in — Ann. Mycol. XIII: 210, 1915
Sydowia, IV: 535, 1950
Fragmente zur Mykologie, p. 82, 1909

Syn.: **Hysterostomella andina** Pat.
in — Bull. Herb. Boiss. p. 73
Syll. Fung. XI: 385, 1895

Without free mycelium.

Stromata black, roundish or elliptic, epiphyllous, 1 — 1.5 mm diam., single or 2 — 3 grouped, having 3 to 5 concentric rings Fig. 13 a, in relation to the hypostroma which, through a pression against the epiderme, produces an ash-colored protuberance on the leaf surface. Fig. 12.

The superior wall of the stromata is dark-brown, 5 — 15 u



Fig. 12

POLYCYCLUS ANDINUS (Pat.) Theiss. & Syd.

The black spots are the ascostroma on a leaf of Filicum.

Orig.



Fig. 13

POLYCYCLUS ANDINUS (Pat.) Theiss. & Syd.

a) Frontal view of one ascostroma;
b) A longitudinal cut of the ascostroma, showing the central hypostroma and the locule.

Orig.

in thickness, opaque, clearing to the margins Fig. 15, where the characteristic radiate structure can be seen, formed by rectangular cells, 2.5 — 7 x 2 — 5 u; the free end of the

margins is undulant, and so, entire. The inferior walls are also dark-brown, 17.5 — 45 u thick, having several layers; from these layers the basal one shows grouped parallel cells while the top layer, darkless than the other is composed of roundish or ellipsoid cells, loosely disposed; sometimes the layer of parallel cells is disposed over a pseudo tissue of polyhedric cells irregularly disposed. The locules are gene-



Fig. 14

POLYCYCLUS ANDINUS (Pat.) Theiss. & Syd.

a) One locule under longitudinal cut;
b) ascospores.

Orig.

rally entire, 42.5 — 85 u in height, 50 — 100 u wide, with a longitudinal rima as long as the wideness of the locule, Fig. 13 b. Hypostroma central formed by a pseudoparenchymatic body, ellipsoid, 214 — 270 u wide, 112 — 170 u in height, brown, sub-epidermal, from which brown hyphae, are developed, freely or in ropes, going to the mesophyllum.

Asci cylindric-clavate, 40 — 50 x 12 — 18 u, bitunicate, sessile or short stipitate, 8-spored, aparaphysate. Ascospores lengthened-ellipsoid, 1-septate, constricted, the cells unequal,



Fig. 15

POLYCYCLUS ANDINUS (Pat.) Theiss. & Syd.

Detail of the structure of the margin.

Orig.

at first hyaline, then brown, irregularly distichous, 13 — 15 x 1 — 5 u. Fig. 14.

We took this description from the examination of the type material — Rhem Ascomyceten, 1174 — Labeled as **Hysterostomella andina** Pat. Prov. Pichincha, Jorge, Ecuador. Dr. v. Lagerheim, 7.1892. On **Filicum sp**.

Note: This specimen is becoming poor in asci.
Acknowledgment is made to Mus. Bot. Stockl. for the loan of this material.

POLYRHIZON BEWSII Doidge

in Bothalia, 1: 12

Free mycelium null. Stromata amphigenous, simple or compound, scattered, gregarious or confluent, roundish to



Fig. 16

POLYRHIZON BEWSII Doidge.
Details of the stromata organization, seen under a longitudinal cut.

Orig.



Fig. 17

POLYRHIZON BEWSII Doidge.

Photographic aspect of the stromata implantation.

Orig.

Fig. 18

POLYRHIZON BEWSII Doidge.

Ascus, paraphyses and ascospores.

Orig.

irregular, 670 — 1000 u diam., 170 — 300 u in height, blackish-brown, carbonaceo-gelatinous. The superior wall is 24 — 37 u thick, rough, radiate, cracked at the maturity and having rectangular cells, 9 — 16.5 x 5 — 6.5 u. The stromata is attached to the leaf host by a central foot, 140 — 300 u wide which goes down as far as the mesophyllum. Fig. 16 e 17. This foot is composed of polygonal brown cells. 4.5 — 12 x 3 — 8 u, and its base is in connexion with the intramatrical mycelium tne hyphae of which are hyaline and intercellularly distributed. Sometimes this internal mycelium continues to the opposite side of the leaf where there grows another stromata. Asci clavate, 2-tunicate, 8-spored, short pedicellate, 60 — 100 x 30 — 45 u. Paraphyses simple or branched, septate, constrict, hyaline, 1.5 — 5 u thick. Ascospores oblong or cylindrical, at first hyaline the brown-blackish, 1-septate, constrict, smooth, distic, 26.5 — 33 x 13.5 — 15 u. Fig. 18.

On leaves of **Elaeodendron oethiopicum** Thumb. Natal. Leg. Bews & E. M. Doidge, 27-7-1918.

This specimen, nº 11592, Union Department of Agriculture we have studied through the kindness of Dr. Talbot, South África. Revis. by A. Chaves Batista & M. L. Nascimento, May 5-1957.

POLYRHIZON CELASTRI Doidge

in Bothalia, I: 197

Free mycelium null.
Ascostroma epiphyllous, Fig. 19, in concentric circles,



Fig. 19

POLYRHIZON CELASTRI Doidge.

Ascostroma scattered on a leaf of **Celastrus acuminata.**

Orig.

Fig. 20

POLYRHIZON CELASTRI Doidge.

Collective ascostroma.

Orig.

Fig. 21

POLYRHIZON CELASTRI Doidge.

Detail of the hypostroma in one young cutted ascostroma.

Orig.

superficial, on brownish leaf spots, 3.5 — 5 mm diam. Single ascostroma Fig. 20 roundish, 300 — 600 u diam., 28 — 50 u in height, sterile in the central are with few locules circularly disposed. The superior wall is opaque, blackish-brown, coria-

Fig. 22

POLYRHIZON CELASTRI Doidge.

Ascus, paraphyses and ascospores.

Orig.

ceo-gelatinous, radiate at the margins where the cells may be seen, 8 — 16 x 3 — 7 u; the inferior wall is brownish, thin. Hypostroma central for each single ascostroma, Fig. 21, multiple for the collectivity brown, prosenchymatic, composed of oblong cells, 4 — 7 x 3 — 5.5 u, epidermal, but

sending some strands of hyaline hyphae to the mesophyllum. Asci clavate, short pedicellate, 8-spored, 2-tunicate, 88 — 105 x 31 — 35 u. Paraphyses simple or branched, septate, constricted hyaline, 1 — 4 u diam. Ascospores oblong, at first hyaline, then blackish-brown, 1-septate, constrited smooth, 24 — 28 x 11 — 14.5 u. Fig. 22.

On leaves of **Celastrus acuminata** Sysy. Depwalls, Knysna District, Cape — E. M. Doidge, 13-5-923. Type, n° 17207, associate with **Meliola evansii** Doidge — Union of South Africa, Dep. of Agr., Myc. Herb.

POLYRHIZON PTEROCELASTRI Doidge
in Bothalia, IV: part IV, 871, 1948

Without free mycelium.

Ascostromata amphigenous, chiefly epiphyllous, scattered or confluent, carbonaceous, black, orbicular, 1,5 — 4 mm diam., multiple or composed, circinate; individual ascostroma 100 — 800 u diam.; the superior wall is brown, radiate 5 — 9 u thick, margins fimbriate having sinuose, brown and septate hyphae, the cells of which are 20 — 28 x 1,5 — 5 u; the inferior wall is dark-brown, prosenchymatic, 12 — 20 u diam. Hypostroma multiple, columnar, prosenchymatic, dark-brown, 30 — 60 u diam., epidermal but sending hyphae 1,5 — 2,5 u into the mesophyllic tissue, frequently reaching the other face of the leaf. Locules disposed in a circle, subglobose, 120 — 400 u diam., 80 — 135 u in height. Asci clavate or ellipsoid, sessile or short pedicellate, 2-tunicate, 8-spored, 66 — 80 x 22 — 38 u. Paraphyses filiform, simple or branched, septate, longar than the asci, 1,5 — 2 u thick. Ascospores clavate, 1-septate, constricted, with unequal cells, brown, sometimes apiculate, 23,5 — 29 x 8 — 11 u, distichous, rarely tristichous. Fig. 23.

On leaves of **Pterocelastrus galpini** Loes.

Kromrivier, Rustenburg District, Cape. Leg. E. M. Doidge and A. M. Bottomley, 14-12-938. Type, 327 76, Union of South Africa. Dept. Agric. Mycol. Herb.

Obs.: This description results from the examination of the type species through which we found the associated fungus **Peltistroma pterocelastri** Batista & Vital n. sp.

We are indebted to Dr. J. A. Lima for his help in this study.



Fig. 23

POLYRHIZON PTEROCELASTRI Doidge.

a) Ascostroma under a longitudinal cut;
b) ascus and paraphyses;
c) ascospores;
d) Detail of the margin of the ascostroma. Orig.

RESUMO

Revendo a Sistemática dos fungos Polystomellaceae os AA. tiveram oportunidade de examinar os fungos abaixo indicados, analizando-os à luz da Histologia, e êste trabalho é assim o produto dessas investigações, confirmatórias amplamente da diagnose original que define cada uma das espécies ora mencionadas: **Parmulina callista** sôbre **Ocotea floribunda, P. stenochlaenae** (Syd) Petrak, sôbre **Stenochlaena palustris, P. stigmatopteridis** (Ferd. & Wge) Theiss. & Syd. sôbre **Phegopteris allaeoptera, Dryopteris patens** e **Stigmatopteris rotundata, P. uleana** (P. Henn.) Theiss. & Syd, sôbre **Aechmea pectinata, Pleiostomella halleriae** Doidgei, sôbre **Halleria lucida, Polycyclus andinus** (Pat.) Theiss. & Syd, sôbre **Filicum sp, Polyrhizon bewii** Doidgei, sôbre **Elae odendron aethiopicum, Polyrhizon celastri Doidgei** sôbre **Celastrus acuminata,** e **P. pterocelastri** Doidgei sôbre **Pterocelastrus galpini** Loes.

RÉSUMÉ

En revisant la Systématique des champignons **Polystomellaceae,** les A.A purent examiner les sous — indiqués, les analysant à la lumière de la Histologie; ce travail est donc une confirmation de la diagnose originelle qui définit chaque espèce: **Parmulina callista** sur **Ocotea floribunda, P. stenochlaenae** (Syd) Petrak, sur **Stenochlaena palustris, P. stigmatopteridis** (Ferd. & Wge) Theiss. & Syd. sur **Phegopteris allaeoptera, Dryopteris patens** et **Stigmatopteris rotundata, P. uleana** (P. Henn.)Theiss. & Syd, sur **Aechmea pectinata Pleiostomella halleriae** Doidgei, sur **Halleria lucida, Polycyclus andinus** (Pat.) Theiss. & Syd., sur **Filicum sp., Polyrhizon bewsii** Doidgei, sur **Elae odentron aethiopicum, Polyrhizon celastri** Doidgei sur **Celastrus acuminata,** et **P. pterocelastri** Doidgei, sur **Pterocelastrus galpini** Loes.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 117-131, 1960

(114)

A REVISION OF SOME SPECIES OF **POLYSTOMELLA** Speg., **PROTOTHYRIUM** Arnaud and **RHAGADOLOBIUM** P. Henn. & Lindau. (*)

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

This paper contains the results of the revision made by the AA. on some fungi of the family POLYSTOMELLACEAE.

The following species have been studied: **Polystomella banisteriae** (P. Henn.) Theiss. & Syd., **P. caulicola** Doidge, **P. melastomatis** Pat., **Prototothyrium tricalysiae** Doidge, **Rhagadolobium cucurbitacearum** (Rehm) Theiss. & Syd., and **R. hemiteliae** P. Henn. & Lind.

POLYSTOMELLA BANISTERIAE (P. Henn.) Th. & Syd. **in** Ann. Myc. XIII: 244, 1915.

Material nº 31, ex collection E. Ule. Appendix Mycothecae brasiliensis, on **Hiraeae sp.**, Amazonas, Juruá, Leg. E. Ule., determined as **Cocconia banisteriae** P. Henn.

Obs.: — Stromata entirely empty.

POLYSTOMELLA CAULICOLA Doidge

Doidge — **in** Bothalia I: 16, 1921
Doidge — **in** Bothalia V: 203, 1950

Without free mycelium.

Ascostromata caulicolous, carbonaceous, at first simple, discoid, then confluent, flattened, Fig. 1-a, longitudinally lengthened, up to 10 mm., generally 2 mm wide and 80 — 112 u in height, plurilocular. The superior wall is dark-

(*) Publicação nº 114

brown, 20 — 32,5 u thick, opaque, radiate, little fimbriate at the margins, Fig. 2, the cells being 2,5-5 u diam.; the inferior wall is hyaline or brownish, 5-7,5 u thick. Hypostroma multiple, Fig. 1-b, composed of several brown pillars, 17,5 — 45 u wide, and hyaline separate filaments, 1 u wide

Fig. 1

POLYSTOMELLA CAULICOLA Doidge

a) Locules seen in a longitudinal cut of a ascostroma.;

b) Detail of the hypostroma.

Orig.

from which the internal mycelium is developed, growing deep by an intra and intercellular process. Asci cylindric-clavate, sessile or short-pedicellate, 2-tunicate, 8-spored, 40 — 72,5 x 15 — 17,5 u.

Paraphyses filiform, branched, septate, hyaline 1 — 2 u

diam. Ascospores ellipsoid, 1-septate, not constricted, hyaline, 17 — 20 x 6 — 9,5 u, distichous.

On **Asparagus sp.** Banks of Orange River, Aliwal North, Leg. P. J. Pienaar, 11-1-912, Type, n° 2093, Union of South Africa, Dept. of Agric., Myc. Herb.



Fig. 2

POLYSTOMELLA CAULICOLA Doidge.

a) Margin of the superior wall of the ascostroma;
b) Ascus and paraphyses.

Orig.

POLYSTOMELLA MELASTOMATIS Pat.

Pat. — **in** Hedwigia 31: 304, 1892
Th. & Syd. **in** Ann. Myc. XIII: 246, 1915
Sin.: **Dothidella melastomatis** Pat.

Pat. **in** Bull. Soc. Myc. France VII: 177, 1891
Sacc. **in** Syll. Fung. XI: 375, 1895

Free mycelium absent.
Ascostromata epiphyllous, at first roundish then irre-



Fig. 3

POLYSTOMELLA MELASTOMATIS Pat.

Frontal view of the ascostromata.

Orig.



Fig. 4

POLYSTOMELLA MELASTOMATIS Pat.

Longitudinal section of the ascostromata.

Orig.



Fig. 5

POLYSTOMELLA MELASTOMATIS Pat.

a) Detail of the margin of the ascostromata;
b) c) d) internal mycelium.

Orig.

gular, by confluence, appearing as black crusts, 0,5 — 2 mm diam., and having, at maturity, many roundish ostioles, Fig. 3, each one of 25 — 37,5 — 32,5 u in thickness, dark-brown, radiate, with entire margins and made up of brown hyphae, 3,5 — 5,5 u in diam.; the inferior wall is hyaline to subhyaline, 2,5 — 5 u in thickness. Fig. 4.

The locules are incomplete to bad defined, 190 — 315 u wide, 67,5 — 90 u in height. Hypostroma multiple, little developed and composed by thin, hyaline filaments, which come down from the inferior wall of the ascostromata and



Fig. 6

POLYSTOMELLA MELASTOMATIS Pat.

Paraphysate ascus and ascospores.

Orig.

produce subcuticular and subglobose haustoria 5,5 — 10 x 5 — 5,5 u, or the haustoria are not formed and the hyphae runs below the cuticle, 2,5 — 3,5 u thick, reaching, sometimes the peidermal tissues through the intercellular spaces, Fig. 5.

Asci cylindro-clavate, sessile to short-pedicelate, 8-spored, 50 — 75 x 10 — 12,5 u, 2-tunicate.

Paraphysis filiform, septate, branched, 1,5 — 2 u diam.

Ascospores oblong, 1-septate, the superior cell being 2 — 3 times longer than the inferior one, and also larger, 10 — 16 x 4,5 — 5 u, hyaline. Fig. 6.

On leaves of **Melastoma.** Machangara, Quito, Equador. Leg. Prof. V. Lagerheim, 2-1892.

Spec. nº 1068, now in New York Botanical Garden, U.S.A.

Obs.: — The dimensions supplied by Patouillard (loc. cit.) for the locules (30 to 3,5 u wide) are clearly a consequence of a mistake since that mycologist has described the asci of this fungus as having 65 to 95 u long.

PROTOTHYRIUM TRICALYSIAE Doidge

In Bothalia, IV: part IV, 868, 1948

Without free mycelium.

Ascostromata amphigenous, superficial, crustaceous, black, scattered, roundish, 60 — 80 u in height and about 4 mm., diam. The superior wall is flat-convex, irregularly radiate, with irregular margins where subtorulous hyphae, 4 — 6 u diam. can be seen; the inferior wall is one-layered, but thin, olivebrown. Hypostromata multiple, epidermal, hyaline, connected at several points with the inferior wall of the ascostroma, and reaching the mesophyllum.

Asci erect from the basal portion of the ascostroma, not grouped in locules, clavate, 2-tunicate, short pedicellate, 50 — 60 x 20 — 25 u, aparaphysate.

Ascospores oblong, 1-septate, little constricted, olivaceous, 20 — 23 x 7,5 — 9 u, distichous on leaves of **Trichalysia lanceolata** Schum.

Eshowe, Zululand, Cape — E. M. Laughton Nov. 1941 Det. E. M. Doidge. Nº 33554, Union of South Africa, Mycol. Herb. Depart. of Agric.

Obs.: The material in this specimen is now rare and immature, so that from the examination of the slides that it contains we accept the measures given by Doidge.

RHAGADOLOBIUM CUCURBITACEARUM (Rehm) Theiss. & Syd.

Sin.: **Dothidella cucurbitacearum** Rehm

Rehm	— Hedwigia p. 376, 1897.
Saccardo	— Syll. Fung. XIV, p. 677, 1899.
Theissen & Sydow	— Ann. Myc. p. 275, 1914.

Free mycelium null.

Ascostromata hypophyllous, Fig. 7, innato-superficial,

gregarious, black, orbicular to irregular, Fig. 8, pulvinate, 3 — 7 mm diam. soft, membranous, pseudo parenchymatic, the superior wall made up of polyhedric, brownish and radially disposed cells, 3,5 — 7,5 x 2 — 6,5 u; the basal region is composed of dense, brownish hyphae, having polygonal cells, 2,5 — 7,5 x 2 — 6,5 u, which penetrate the host tissues through the stomata, Fig. 9, to continue with the endogenous mycelium of hyaline, branched and septate hyphae, with cells of 5 — 10 x 2 — 4 u, reaching the mesophyll by the

Fig. 7

RHAGADOLOBIUM CUCURBITACEARUM (Rehm.) Theiss. & Syd.
Distribution of the ascostromata in **CUCURBITA PEPO**
Hypophyllous face of the leaf limb.
Orig.

intercellular way. Ascostromata plurilocular, the locules being globose, 55 — 112,5 u diam., separated by a hyaline plectenchymatic tissue; ostiole not differentiated. Asci clavate, 2-tunicate, 5 — 8 spored, short-pedicellate, 55 — 80 x 11,5 — 14 u, aparaphysate. Ascospores clavato-fusoide, 1-septate,



Fig. 8

RHAGADOLOBIUM CUCURBITACEARUM (Rehm.) Theiss. & Syd.

Aspects of the ascostromatas in **CUCURBITA PEPO**. Orig.

constricted, distichous to polystichous, hyaline, 10,5 — 12 x 3,5 — 5 u, Fig. 10.

On leaves of **Cucurbita pepo** — Pau Ferro, São Lourenço. A. Chaves Batista, 24-12-955. Spec. nº 5083, IMUR.

Theissen e Sydow — Ann. Myc. pp. 241-242, 1915.

Obs.: The following specimens from the Stockholm Botanical Museum have also seen:

nº 65.378 — Of the Pathological and Mycological Collections of the Bureau of Plant Industry (U.S.D.), on **Sechium edule**, Finca la Caja, Costa Rica, 1928, Coll. by H. Schmidt determined by J. A. Stevenson.

nº 65.380 — (2 samples) of the Pathological and Mycological Colletions of the Bureau of Plant Industry (U.



Fig. 9

RHAGADOLOBIUM CUCURBITACEARUM (Rehm.) Theiss. & Syd. Histological cut of 10 u thickness, of a portion of Ascostroma where can be seen 3 loculus and the hypostroma. Orig.



Fig. 10

RHAGADOLOBIUM CUCURBITACEARUM (Rehm.) Theiss. & Syd.

Ascus, ascospores and ascostroma.

Orig.

S. D. A.), on **Sechium edule**, Finca La Caja, Costa Rica, Colle. H. Smith, III-1927, det. J. A. Stevenson.

nº 1.415 — Ex Herb. Rehm, on **Cucurbitaceae**, Blumenau, Brasil, V-1888, collected by Ule, and determined as **Dothidella cucurbitacearum** Rehm n. sp., 1897, revised as Rhagadolobium.

nº 676 — Of the Museum Botanicum Berolinense, ex Herb. J. Schroeter, on **Cucurbitaceae**, Rio de Janeiro, Brasil, collected by Ule, and determined as **Dothidella cucurbitacearum** Rehm n. sp.; revised as Rhagadolobium.

nº 844 — Of the Sydow, Fungi exotici exsiccati on **Cucurbita pepo**, El Limón pr. Puerto La Cruz, Venezuella, 1928, determined by H. Sydow.

nº 35 — Of Dr. Petrak, Mycotheca Generalis, on **Cucurbita pepo**, Costa Rica, Grécia, 1925, collected by H. Sydow. The asci are not ripe.

nº 2.496 — Of the Herb. Ciferri, on **Trichosanthes sp.** Rep. Dom., prov. La Veja, coll. E. L. Ekmon, 3-11-29.

RHAGADOLOBIUM HEMITELIAE P. Henn. & Lind.

P. Henn. & Lind — **in** Engl. Bot. Jahrb. XXIII; 287, 1897
Sacc. — **in** Syll. Fung. XIV: 816, 1899
v. Höhnel — **in** Fragmente zur Mykologie, nº 633, 1910
v. Höhnel — **in** Ann. Myc. IX: 170 (1911)
Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 240, 1915
v. Höhnel — **in** Fragmente zur Mykologie nº 1061, 1918
J. A. Nannfeldt — **in** Morphologie und systematik der Discomyceten, p. 213, 1932

Syn.: **LAUTERBACHIELLA PTERIDIS** Henn. & Lind.

P. Henn. — **in** Engler Bot. Jahrb., 25: 508, 1898
Sacc. — **in** Syll. Fung. XVI: 788, 1902
v. Höhnel — **in** Fragmente zur Mykologie, nº 632, 1910
v. Höhnel — **in** (loc. cit. 1911)
Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 220, 1915.
Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XV: 409, 1917
v. Höhnel — **in** Fragmente zur Mykologie, nº 1061, 1918
J. A. Nannfeldt — (loc. cit.)

Fre mycelium null.

Stromata hypophylla, roundish, black, 1 — 2 mm. diam., 124 — 140 u in height, single, slightly crustaceous; the supe-



Fig. 11

RHAGADOLOBIUM HEMITELIAE P. Henn & Lind.

a) Stromata without defined locule, and a hypostroma;

b) detail of the border of the superior wall.

rior wall is dark brown at the center 40 — 50 u in thickness, radially cracked, the borders being brownish transparent, radiate, and composed of hyphae 2.5 — 5 u diam.; the inferior wall is ashy and 40 — 50 u wide. Locules multiple. Hypostroma multiple, Fig. 11, conoid, brown, opaque, 37.5 — 52.5 u wide, 12.5 — 22.5 u in height, subepidermal; from the basal portion of the hypostroma grown hyaline hyphae 2 — 3 u diam., in the deep tissues, by the intercellular and intracellular ways, reaching the mesophyllum. Asci cylindric clavate. 2-tunicate, aparaphysate, 50 — 70 x 4 — 5 u. Ascospores clavate to subfusoid, 1-septate, hyaline, constricted, 8 — 10 x 3.5 — 4 u.

On leaves of **Pteris sp.** New Guinea, Leg. by Lauterbach, 13-5-1896. This specimen were labeled as **Lauterbachiella pteridis** P. Henn.

Obs.: This specimen which we have examined through the kindness of the Mus. Bot. Stockhl. is too poorly developed so that we could not see well the type of the locules nor to mensurate the asci and ascospores; the measures for that structures we took from Saccardo (loc. cit.).

The position of this fungus we accept following von Höhnel opinion (Fragment zur Mykologie, nº 1061, 1918) which claims that there is not any difference between the genera **Rhagadolobium** and **Lauterbachiella**, since the first genus has linear locules when young and then roundish locules at the maturity.

However, we maintain **Rhagadolobium** as Polystomellaceae, following Theissen & Sydow (loc. cit.) in view of its radiate stromata with a multiple hypostroma.

We have examined also one specimen on **Hemitelia samoana** with the label of **R. hemiteliae** P. Henn & Lind, Samoa, leg. by, Dr. Reinerke, but the ascostroma found were unripe.

Another specimen of this same origin has showed us complete absence of any fungi.

Note: Our acknowledgement is made to the Mus. Bot. Stockhl. for the loan of this material, which is ex Herb. Sydow.

RESUMO

São examinadas, nesta publicação os seguintes fungos POLYSTOMELLACEAE: **Polystomella banisteriae** (P. Henn.) Th. & Syd. sôbre **Hirea sp., P. caulicola** Doidge, sôbre **Asparagus sp., P. melastomata** Pat. sôbre **Melastoma, Protothyrium trichalysiae** Doidge, Rha-

gadolobium cucurbitacearum (Rehm) Theiss. & Syd. e **R. hemiteliae** P. Henn. & Lind.

RÉSUMÉ

Dans cette publication sont examinés ces champignons appartenants à la famille POLYSTOMELLACEAE : **Polystomella banisteriae** (P. Henn.) Theiss. & Syd., **P. caulicola** Doidge, **P. melastomatis** Pat., **Protothyrium tricalysiae** Doidge, **Rhagadolobium cucurbitacearum** (Rehm) Theiss. & Syd., et **R. hemiteliae** P. Henn. & Lind.

HERB.

A. CHAVES-BATISTA e A. F. VITAL

115

DOIS NOVOS GÊNEROS DE FUNGOS *POLYSTOMELLACEAE*

SEPARATA DA
REVISTA DE BIOLOGIA
1 (3-4): 280-286
1958

REVISTA DE BIOLOGIA

REVISTA BRASILEIRA E PORTUGUESA DE BIOLOGIA EM GERAL

VOL. 1 — 1958 — N.º 3-4

ÍNDICE

1. R. W. G. Dennis — Some *Xylosphaeras* of tropical Africa 175
2. Mário de Carvalho — Experimentação algodoeira Resultados de alguns ensaios . . 209
3. Johanna Döbereiner e Alaides Puppim Ruschel — Uma nova espécie de *Beijerinckia* . 261
4. M. M. Ventura e R. Vieira da Cunha — Acessório para a densitometria direta de eletroforogramas sôbre papel 273
5. A. Chaves-Batista e A. F. Vital — Dois novos gêneros de fungos *Polystomellaceae* . . 280
6. A. Chaves-Batista, H. Silva-Maia e Marie L. Farr — Novos gêneros e novas espécies de fungos *Asterinaceae* 287
7. A. Chaves-Batista — Alguns *Dothideaceae* e *Phyllachoraceae* estudados em Pernambuco 299
8. K. Arens, M. G. Ferri e L. M. Coutinho — Papel do factor nutricional na economia d'água de plantas do *Cerrado* 313
9. A. Chaves-Batista e H. da Silva-Maia — Estudo iconográfico de alguns fungos *Valsaceae* e *Xylariaceae* 325
10. *Noticiário* 333

Os trabalhos deste Número foram escritos ou aceites, para publicar, por: J. Pinto-Lopes (1.), A. Quintanilha (2), H. C. Monteiro (3), M. Ventura (4), A. Chaves-Batista (5, 6, 7, 9), M. G. Ferri (8).

EDITORES

C. CHAGAS
INSTITUTO DE BIO-FISICA
AVENIDA PASTEUR, Nº 458
RIO DE JANEIRO

A. MACHADO
MUSEU DO DUNDO
LUNDA
ANGOLA

J. PINTO-LOPES
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA
DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

F. RESENDE
INSTITUTO BOTANICO
FACULDADE DE CIENCIAS
LISBOA

LISBOA·LOURENÇO MARQUES·LUNDA·RIO DE JANEIRO

DOIS NOVOS GÊNEROS DE FUNGOS *POLYSTOMELLACEAE*

por

A. CHAVES-BATISTA e A. F. VITAL

Instituto de Micologia — Universidade do Recife — Brasil

Publicação N.º 115

(*Recebido em Julho 16, 1958*)

Os A. A. propõem neste trabalho a criação de dois novos gêneros de fungos, na família *Polystomellaceae*.

O gênero *Polystomellina*, n. gen. fundado sôbre a espécie tipo *P. didymopanacis* nobis destina-se a conter os fungos de ascostromas destituidos de micélio livre, radiados, uni ou pluriloculares, com hipostroma múltiplo, ascos parafisados e ascosporos hialofragmos.

O gênero *Polycyclinopsis*, n. gen. com a espécie tipo *P. solani* abrangerá os fungos de micélio superficial não hifopodiado, ascostromas de lóculos concêntricos, hipostroma hialino, ascos parafisados e ascosporos dídimos, hialinos.

POLYSTOMELLINA Batista & Vital nov. gen.

Micélio livre ausente. *Estromas* superficiais, orbiculares, confluentes ou isolados, elevados na sua porção mediana, uniloculares ou exibindo mais de um lóculo, de parede superior prosenquimática-radiada, facilmente dilacerável à maturidade e margens membranoso-peliculosas, planas, radiadas, contexto membranoso; lóculos sub-globosos, moles; himênio simples, anelar, com área central estéril; hipotécio membranoso, fino; hipostroma epidermal ou sub-epidérmico, múltiplo. *Ascos* octosporos, parafisados. *Ascosporos* hialofragmos.

Tipo, *P. didymopanecis*, nobis

Mycelio libero nullo. Stromata superficialia, orbiculata, confluentia vel isolata, medio elevata, unilocularia vel pauci locularia, paries superior prosenchymatico-radiatus. facile seccedens, margine alata plana, membranaceo-contexta, efformatus; locula subglobosa, molliuscula; hymenium simplex, annulatim, centro sterile, compositum; hypotheciis membranosis, tenuibus hypostromata multiplicia ex epidermalia vel subepidermalia oriunda. Asci octospori, paraphysati: sporae hyalophragmiæinae.

POLYSTOMELLINA DIDYMOPANACIS Batista & Vital n. sp.

Micélio livre ausente.

Ascostromas epífilos, raros, de disposição gregária, superficiais, orbiculares, 90-162,5 de diam., elevados na área mediana, de 47,5-75 *u*, isolados ou confluentes, uniloculares ou apresentando 2-3 lóculos, Fig. 1; parede superior marron, prosenqui-

Fig. 1 — POLYSTOMELINA DIDYMOPANACIS Batista & Vital n. sp.
a) Corte histológico de ascostroma plurilocular.
b) Corte histológico de um ascostroma, revelando a área apical desintegrada.
c) Asco, paráfise e ascosporos.

Orig.

mática reticulada, de células poligonais, 3,3-10 *u* de diam. e células retangulares, de 5,5-9 × 2-4,5 *u*, contexto membranoso, 6,5-12,5 *u* de espessura e margens membranoso peliculosas, planas, com hifas radiantes-paralelas, anostomosadas; lóculos subglobosos, moles; himênio simples, Fig. 2, anelar, com a área central estéril; hipotécio



Fig. 2 — POLYSTOMELLINA DIDYMOPANACIS Batista & Vital n. sp. Secção transversal de um ascostroma indicando a área central estéril e os ascos de disposição radiada.

Original



Fig. 3 — POLYSTOMELLINA DIDYMOPANACIS Batista & Vital n. sp. Aspecto fotomicrográfico da distribuição dos ascos.

450 x Original

membranoso, subhialino, de 2-3 *u* de diam.; hipostroma formado na epiderme ou de modo subepidermal, múltiplo, isto é, ligando-se ao hipotécio em vários pontos, por meio de hifas hialinas, de 1-1,5 *u* de diam., com haustórios pequeninos, globulosos. Ascos elipsoides, 8-esporos, sésseis, 30-37,5 × 12,5-15 *u*, dispostos radialmente, da periferia para o centro, Fig. 3. Paráfises septadas, hialianas, 1-1,5 *u* de diam., densas, separando os ascos no himênio anelar. Ascosporos cilindro-clavados, 3-5-septados, constrictos, fragmentáveis, polísticos, hialinos, 20-25 × 7,5-8,5 *u*.

Sôbre folhas vivas de *Didymopanax morototoni*, associado a *Tricyomerium coffeicolum* (Putt.) Speg., *Gymnoxyphium splendidium* Ciferri, Batista & Araujo e *Septonema* sp. — Vitoria, Leg. Severino José da Silva, 23-4-56. T,po 5473, Instituto de Micologia, Universidade do Recife.

Mycelio libero nullo. Ascostromata epiphylla, rara, gregaría, superficialia, orbiculata, 90-162,5 *u* diam., 47,5-75 *u* alt, isolata vel confluentia, uniloculata, vel 2-3 loculata, loculis subglobosis, mollibus, composita; paries superior brunneus, prosenchymaticus vel reticulatus, membranaceus, 6,5-12,5 *u* cr, ex cellulis poligonalibus, 3,3-10 *u* vel rectangularibus, 5,5-9 × 2-4,5 *u*, marginibus membranoso-pelliculosis, planis, efformatus. Hymenium simplex, annulatim, centro sterile, hypoteciis membranosis, subhyalinis, 2-3 *u* cr, compositum. Hypostromata epidermalia vel subepidermalia, plures, afixa hyphis hyalinis, 1-1,5 *u* diam., et haustoria globulosa, minuta, efformata. Asci ellipsoidei, 8-spori, sessili, 30-37,5 × 12,5-15 *u*, radialiter dispositi, paraphysibus filiformibus, septatis, hyalinis, 1-1,5 *u* diam. Sporae cylindro-clavatae; 3-5-septatae, constrictae, seccedentes, polystichae, 20-25 × 7,5-8,5 *u*.

In foliis vivis *Didymopanaci morototoni* socia diversi Capnodiacei – Victoriae – Leg. Severino José da Silva, 23-4-56. Typus 5473, Instituto de Micologia, Univeridade do Recife, Prov. Pernambuco, Brasil, Amer. Austr.

POLYSTOMELLACEAE

POLYCYCLINOPSIS Batista Vital, et H. Lima n. gen.

Micélio superficial, de hifas sinuosas, ramificadas, septadas, marron-claro, não hifopodiadas. *Ascostroma* tênue crustáceo, superficial, negro, opaco, orbicular ou irregular, — composto por lóculos conóides, concêntricamente dispostos, de contexto radiado, com hipostroma subcuticular ou subepidérmico, extenso, pseudoparenquimático, hialino, continuo, conectado em vários pontos, através da cutícula. *Ascos* cilindro-clavados, estipitados, 8 esporos, parafisados. *Ascosporos* clavado-fusoides, 1-septados, constrictos, hialinos.

Afim de *Polycyclina* Theiss. e Syd, distinguindo-se por possuir micélio livre e pelo hipostroma hialino.

Tipo do genero, *Polycyclinopsis solani* Batista, Vital et H. Lima n. sp.

Mycelium superficiale, cum hyphis sinousis, ramosis, septatis, brunnescentibus, haud hyphopodiatis. Stromata superficialia, tenuiter crustacea, atra, opaca, orbiculata vel irregularia, loculis pluribus conoideis, concentricis, composita, radiato-contexta; hypostroma pseudoparenchymaticum, subcuticulare vel subepidermale, longum, continuum, hyalinum, punctis pluribus affixum. Asci cylindro-clavati, stipati, 8-spori, paraphysati. Sporae clavato-fusoideae, 1-septatae, constrictae, hyalinae. Affinibus *Polycyclina*, Theiss et Syd., sed cum mycelio libero et hypostromata hyalino. Typus, *Polycyclinopsis solani* Batista, Vital et H. Lima n. sp.

POLYCYCLINOPSIS SOLANI Batista, Vital et H. Lima n. sp.

Micélio livre superficial, epífilo, pouco desenvolvido, constituido por hifas sinuosas, ramificadas, indistintamente septadas, marron-claras, não hifopodiadas, 2,5-4 *u* de diam. *Ascostroma* epífilo, superficial, orbicular ou irregular, até 2,5 mms. de diâmetro, irregularmente giboso, tênue crustáceo, opaco, multilocular, lóculos individuais conóides, 140 200 *u* de diam., 60-80 *u* de altura, cada um dêles com ostíolo arredondado, aberto, de 25-42,5 *u* de diam.; parede superior de natureza pseudoparenquimática, 10-22,5 *u* de espessura, radiante, em duas ou três camadas, formadas por células hifais mal delimitadas na sua extensão e de 3,4 *u* de diam.; bordos fimbriados. *Hipostroma* subcuticular ou subepidérmico como um pseudo parênquima denso, de células hialinas, de 1,5-2,5 *u* de diam., e hifas hialinas de 1,5 *u* de diam., que chegam até ao mesófilo, lateralmente contínuo, ao longo de toda a base do ascoma e com êste conectado em numerosos pontos por agrupamentos de hifas, através da cutícula. *Ascos* cilindro-clavados, abundantes, erectos, 8-esporos, 50-70 × 12,5-15 *u*, e pedicelo de até 30 *u* de extensão. *Paráfises* filiformes, simples, hialinas, 1 *u* de diam. *Ascosporos* clavado-fusoides, 1-septados, constrictos, célula superior oblonga e célula basal aguda, desiguais, hialinos, 12,5-15 × 4-6,5 *u* dísticos a polísticos. Fig. 4.

Sôbre fôlhas vivas de jurubeba — *Solanum paniculatum* L. — Granja Bemtevi, Páu Ferro, São Lourenço. Associado a *Asterina fimbriata* Kalchbr. Leg. A. Chaves Batista, 21.6.55. Tipo 2471, Instituto de Micologia, Universidade do Recife.

Mycelio libero pauci evolutum, superficiale, epiphyllum, ex hyphis sinuosis, irregulariter ramosis, indistincte septatis, brunnescentibus haud hiphopodiatis, 2,5-4 *u* diam. Ascostromata epiphylla, superficialia, submyceliaria, orbiculata vel irregularia usque 2,5 mm diam., irregulariter gibbulosa, tenuiter crustacea, atro-opaca, multilocularia; loculis isolatis conoiceis, 140-200 *u* diam., 60-80 *u* alt., ostiolo rotundato, pertuso, 25-42,5 *u*; paries superior pseudo parenchymaticus, 10-22,5 *u* cr, radians, 2-3 stratosus, ex cellulis 3-4 *u* diam., marginibus fimbriatis; hypostromata subcuticularia vel subepidermalia, densa, ex hyphis usque mesophyllum, 1,5 *u* diam., hyalinis, punctis pluribus affixa. Asci cylindro-clavati, numerosi, erecti, 8-spori, 50-70 × × 12,5-15 *u*, stipati usque 30 *u* longi. Paraphyses filiformes, simplices, hyalini, 1 *u* diam. Sporae clavato-fusoideae, 1-septatae, constrictae, cellulae inaequales, cellula



Fig. 4 — POLYCICLINOPSIS SOLANI Batista, Vital et H. Lima nov. gen., nov. sp.
a) ascoma composto, com hipostroma hialino; *b*) micélio livre; *c*) asco e paráfises.
Orig.

superior oblonga et cellula basalis acuta, 12,5 15 × 4-6,5 *u*, distinchae vel polystichae. In foliis vivis *Solani paniculati* L. Páu Ferro, São Lourenço, socia *Asterinae fimbriatae* Kalchbr. Leg. A. Chaves Batista, 21.6.55. Typus 2471, Instituto de Micologia, – Prov. Percambucencis Brasiliae, Amer. Austr.

ABSTRACT

Two new genera are proposed on the family Polystomellaceae. *Polystomellina* Bat. & Vital, without free mycelium and ascostroma radiant, uni to plurilocular, hypostroma multiple, asci paraphysate and ascospores hyalophragmious, with *P. didymopanacis* Bat. & Vital as the type, and *Polycyclinopsis* Bat. Vital & H. Lima, having superficial mycelium, not hyphopodiate, ascostroma with concentric locule, hypostroma hyaline, asci paraphysate and hyalodydimous ascospores; *P. solani* Bat. Vital & H. Lima is the type.

REVISTA DE BIOLOGIA

A *Revista de Biologia* é uma revista internacional que aceita, para publicação, trabalhos, cujo conteúdo represente progresso na resolução de problemas respeitantes a qualquer ramo da biologia. Trabalhos de compilação só poderão ser aceites se apresentarem pontos de vista novos, ou contribuírem pelo seu aspecto crítico (mas nunca polémico), para o estímulo da investigação.

Só excepcionalmente serão aceites trabalhos contendo mais do que 50 páginas, incluíndo figuras. As figuras serão limitadas ao mínimo indispensável. Todos os Autores do Ultramar devem reter cópia do manuscrito. As provas são enviadas por avião não acompanhadas do original, que será remetido junto com as separatas.

O Autor, ou Autores, de cada trabalho recebem 50 exemplares grátis. Emendas feitas nas provas, além dos erros tipográficos, serão onerados aos Autores.

Os originais serão enviados a qualquer dos redactores ou editores que os poderão aceitar sem alterações, ou propor alterações sem as quais o trabalho não poderá ser impresso.

Para a secção *Noticiário* aceitam-se de bom grado críticas de livros e principalmente de grupos de trabalhos, cuja articulação em conjunto contribua para a clareza na compreensão dos problemas em causa, auxiliando assim a sua resolução. Referência sucinta a acontecimentos (viagens, descobertas, falecimentos, etc.), que interessam à biologia serão também insertos nesta secção.

*

* *

This is an international journal publishing work in any branch of the biological sciences. Reviews will only be accepted if they present a new approach or may stimulate further research by their critical (but not controversial) nature.

As a rule, papers should not exceed 50 pages, including plates, and these must be reduced to a minimum.

Overseas contributors should keep a copy of their original manuscript as this will not accompany the air-mailed galley proofs; the manuscripts will be returned with the reprints. Contributors are entitled to 50 reprints free of cost. Authors are asked to reduce corrections in the proof to typographical errors; excessive corrections will be charged to the authors.

Manuscripts submitted to the editors may be subject to alterations before being accepted for publication.

The section of *notices* will gladly accept reviews on books and especially on groups of related papers whose combined results provide a clearer insight of the problem under review. Brief notes on expeditions, discoveries, etc. of biological interest may also be included in this section.

COMPOSTO E IMPRESSO NA TIPOGRAFIA MATEMÁTICA, LDA. — RUA DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 134, 1.º, ESQ. — TELEF. 29449 — LISBOA

FASCÍCULO ENCERRADO
EM 27-12-1958

ESTA REVISTA É MANTIDA PELA RUBRICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS INSTITUTOS BOTÂNICO DE LISBOA E DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE MOÇAMBIQUE

Atas do IMUR
Ano I, págs. 133-157, 1960

A TAXONOMIC REVISION OF SOME SPECIES OF THE GENUS **HYSTEROSTOMA** Theiss. (*)

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

In this contribution to the revision of the species of the genus **Hysterostoma** Theiss., on the family of the **Polystomellaceae**, the following fungi have been analyzed: **Hysterostoma acokantherae** (P. Henn.) Theiss. & Syd., **H. colae** Hansf. emend. Bat. & Vital, **H. floridana** (T. & E.) Bat. & Vital n. comb., **H. maritzburgensis** Bat. & Vital n. sp., **H. microspora** Doidge, **H. mimusopsidis** (Doidge) Bat. Vital & Nasc. n. comb., **H. orbiculata** (P. & H. Sydow) Syd. and **H. rapaneae** Syd.

The best acknowledgments of the AA. are expressed to the National Fungus Collection, USA., and Mycol. Herb. Union of South África, for their valious specimens loaned to them.

HYSTEROSTOMA Theiss.

Stromata attached to the epiderm by several points, scutate, carbonous, surrounded by radiate and loose hyphae, many locules dissorderly disposed, having the central part with tiny elevations; ostiole hysteroid. Asci paraphysate. Spores 2-celled, brown. It is distinguished from **Hysterostomella** Speg., mainly by the presence of paraphyses.

Theiss — **in** Ann. Mycol. XI: 509, 1913
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 405, 1926
Theiss & Syd. — **in** Ann. Mycol. XIII: 237 (1915), XV: 411, 1917
C. G. Hansf. — **in** The foliicolous Ascomycetes their parasites and Associated fungi, p. 168, 1946

(*) Publicação nº 116

F. E. Clements & C. L. Shear — **in** The Genera of Fungi, pp. 97 and 298.

HYSTEROSTOMA ACOKANTHERAE (P. Henn.) Th. & Syd.

Theiss. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 238, 1915
Sacc. — **in** Notae Mycol. XXII: 189 (R. Acc. Pad) 1917
Sacc. — **in** Syl. Fung. XXIV: 413, 1926
E. M. Doidge — **in** Bothalia, Vol. IV: 213, 1941
C. G. Hansford — **in** The foliicolous Ascomycetes, their parasites and associated fungi, p. 177, 1946
E. M. Doidge — **in** Bothalia, vol. V: 202, 1950

Syn.: Dimerosporium acokantherae P. Henn.

P. Henn. — **in** Engl. Bot. Jahrb XVII: 117
Sacc. — **in** Syll. Fung. XI: 259, 1895

Free mycelium composed of brown, sinuous hyphae, 4 — 7.5 u diam., irregularly branched.

Stromata hypophylla, roundish, 3 — 5.5 mm. diam., Fig. 1, black, carbonaceous, with a rough surface; the superior wall is blackish-brown, opaque, having fimbriate borders where the hyphae are brown and radiate, Fig. 2; the inferior wall is brownish, 7.5 — 20 u thick. Locules roundish, ellipsoid or irregular, having, under histological cut, 112 — 165 u wide, and 100 — 140 u in height, stellate or irregularly cracked. The hypostroma is multiple, made up of a plaque



Fig. 1

Black stromata of **Hysterostoma acokantherae** (P. Henn) Theiss & Syd. on a leaf of **Acokanthera sp.**
Orig.

of 1 to 3 layers of hyaline and septate hyphae, which grows under the epidermal tissue and is connected with the leaf surface through the stomata, by brown pillars, 45 — 70 u in height, 37.5 — 55 u wide; these pillars are composed of



Fig. 2

HYSTEROSTOMA ACOKANTHERAE (P. Henn.) Theiss. & Syd.

Ascostroma and free mycelium.

Orig.



Fig. 3

HYSTEROSTOMA ACOKANTHERAE (P. Henn.) Theiss. & Syd.

a) Ascostroma under a longitudinal cut;
b) ascus and paráphyses;
c) ascospores.

Orig.

dense groups of hyphae which grows down to the palisade and lacunous tissues, intercellularly, Fig. 3. Asci ellipsoid to clavate, sessile, 8-spored, 2-tunicate, 50 — 82 x 34 — 47 u; paraphyses filiform, septate, branched. Ascospores elliptic-clavate, at first hyaline, then brown, 1-septate, constricted polystichous 23 — 30 x 8 — 13 u.

On leaves of **Acokanthera sp.** — Nelsprint Transvaal, Leg. L. C. C. Liebenberg, XII, 1933. by C. G. Hansford. Spec. nº 29906, from the Union Departament of Agriculture, South Africa. It is associated with one indet. Moniliaceae.

HYSTEROSTOMA COLAE Hansf. emend. Batista & Vital

C. G. Hansford, **in** Proc. Linn. Soc. London, 1944-45, p. 196
C. G. Hansford, **in** The Foliicolous Ascomycetes, their parasites and associated fungi, p. 177, 1946.

Colonies amphigenous, most abundant on the epiphyllous face of the host, roundish, up to 3 mm diam. Free mycelium little developed and composed of irregularly branched hyphae and radiate brown hyphae at the periphery, flexuous, indistinct septate, 3 — 5 u diam., without hyphopodia, but supporting laterally numerous and single conidia, globose, conoidal to cylindrical, 0-5-septate, constricted, brown, rough, sessile, 10 — 50 x 7.5 — 12 u, Figs. 4 and 5. Ascostromata scattered or gregarious, roundish, up to 200 u diam., or ellipsoid, 225 — 300 x 146 — 182 u, black, carbonaceous; the superior wall is 8 — 15 u wide; opaque, blackish-brown, of radiate structure; the inferior wall is brownish or subhyaline, 5 — 12 u thick. Hypostroma subcuticular composed of a plate of radiate hyphae, 10 — 17.5 u thick, connected with by brown hyphae. Haustoria epidermal, coralloid, hyaline; the connexion with the hypostroma we have not seen. Locules roundish or leng thened, 47.5 — 70 u in height, 45 — 80 u wide, longitudinally dehiscent, this crack being 7.5 — 22.5 u wide. Asci elliptic-clavate, sessile or short pedicellate, 2-tunicate, 8-spored, 47 — 50 x 20 — 25 u. Paraphyses filiform, septate, simple, longer than the asci, 1.5 — 2 u diam., hyaline. Ascospores ellipsoid or oblong, 1-septate, constricted, smooth, brown, with unequal cells, 17.5 — 20 x 8 — 9.5 u. Fig. 7.

On leaves of **Cola natalensis** Oliv. Fig. 6, Mt. Edgecombe, Natal. Leg. J. Medley Wood, Dec. 1909. Spec. nº 33310, Union of South Africa, Dept. of Agriculture, Mycological Herb.

Obs.: The asci are really paraphysate.



Fig. 4

HYSTEROSTOMA COLAE Hansf. emend. Bat. & Vital.

a) Ascostromata and free mycelium;

b) Ascostromata under a longitudinal cut, showing the hypostroma plate.



Fig. 5

HYSTEROSTOMA COLAE Hansf. emend. Bat. & Vital.

a) Ascostromata and free mycelium;
b) Longitudinal section of an ascostroma.



Fig. 6

HYSTEROSTOMA COLAE Hansf. emend. Bat. & Vital.

Producing spots on a leaf of **Cola natalensis** Oliv.



Fig. 7

HYSTEROSTOMA COLAE Hansf. emend. Bat. & Vital.

Ascus, paraphyses and ascospores.

Orig.

HYSTEROSTOMA FLORIDANA (T. & E.) Bat. & Vital n. comb.

Sin.: **Hysterostomella floridana** Tracy & Earle.
T. & E. — **in** Bull. Torr. Bot. Club, p. 185, 1901.
Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 226, 1915.
Sacc. — **in** Syll. Fung. XVII: 892, 1905.

Free mycelium around the ascostromata and composed of brown, tortuous, too much branched and septate hyphae, 3,5 — 6 u diam., sometimes the mycelial hyphae run together; not setose, nor hyphopodiate. Fig. 8.

Ascostromata epiphyllous, roundish, flattened, rough at the center, scattered, black, little carbonaceous, plurilocular. The superior wall is brownish-black, opaque, 7,5 — 27,5 u thick, the margins continuing with the mycelial hyphae; the inferior wall is of bad defined structure, brownish, 3,5 — 17 u in thickness. The hypostroma is formed by a mass of hyphae and roundish hyaline cells beneath the cuticle; there are many filaments, at several points, hyaline or subhyaline, 1 u diam., connecting the hypostroma with the inferior wall of the ascostromata. Locules linear, irregularly disposed, 87,5 — 125 u wide, 55 — 110 u in height,

longitudinally crackd. Asci ellipsoid to clavate, 2-tunicate, sessile, 8-spored, 40 — 50 x 17,5 — 25 u. Paraphyses filiform, simple, septate, hyaline, not numerous, 1 — 2 u diam. Fig. 9.

Ascospores ellipsoid-lengthened, 1-transversally septate, constricted, at first hyaline then brown, smooth, 17,5 — 25 x 6 — 9,5 u.

On **Ardisia pickeringii** — Manatee. Fla. U.S.A. Leg. S. M. Tracy, 5-11-900, Cotype — Specimen — Herb. S. M. Tracy, n° 6612, U.S.A. National Museum. (Type for us).

Est **Hysterostoma** per mycelium liberum et ascos paraphysatos.



Fig. 8

HYSTEROSTOMA FLORIDANA (T. & E.) Bat. & Vital.

Free mycelium and ascostroma.

Obs.: — The asci and ascospores are longer than those indicated by Trace & Earle, (loc. cit.) The paraphyses now observed had likewise been omitted formerly.



Fig. 9

HYSTEROSTOMA FLORIDANA (T. & E.) Bat. & Vital.

a) ascostromata under a longitudinal section;
b) detail of the hypostroma;
c) ascus and paraphyses;
d) ascospores.

HYSTEROSTOMA MARITZBURGENSIS Batista & Vital, n. sp.

Colonies epiphyllous, roundish, 4 — 7 mm diam., not easily detached, black. Free mycelium composed of radiate and irregularly branched hyphae, tortuous, brown, septate, 3 — 5 u diam., connected with the margins of the stromata, not setose, nor hyphopodiate. Stromata ellipsoid-lengthened or irregular, 165 — 400 u diam., 95 — 150 u in height, black, irregularly disposed on the colonies, single or confluent. The superior wall is dark brown, indistinctly radiate, opaque, 10 — 21 u thick, cracking longitudinally at the maturity. The inferior wall is brownish, little developed. Hypostroma multiple, composed of dark-brown hyphae walls developed inside the epidermal cells and of hyphae strands which goes into the palisade tissue; above the epidermal cells can be seen almost parallel hyaline and septate hyphae, tangencially distributed in relation to the cuticle. Locules linear, 62.5 — 100 u wide and 50 — 67.5 u in height, polyascigerous. Asci ellipsoid to ovoidal, sessile, 8-spored, 2-tunicate, 34 — 40 x 20 — 26.5 u. Paraphyses filiform, numerous, branched, septate, 1 — 2 u diam., hyaline. Ascospores ellipsoid to elliptic-clavate, little constricted hyaline at first them brown, conglobate, 20 — 22.5 x 8.5 — 10 u. Fig. 10.

On **Aloe natalensis**, Botanic Garden, Maritzburg Leg. Pole Evan, 8-4-1911. Type nº 1440, Union of South African, Dep. of. Agric. Mycol. Herb.

Coloniae epihhyllae, rotundatae, 4-7 mm diam., atrae. Mycelium liberis ex hyphis parvis radiatim vel irregulariter ramosis, tortuosis, septatis, 3-5 u cr, non setosis, non hyphopodiatis compositum. Stromata ellipsoide-elongata vel irregulariformia, 165-400 u diam., 95-150 u alt., atra, irregulariter dispositis, simplices vel confluentibus; paries superior indistincte radiatim, brunneis, opacis, 10-21 u cr, longitudinaliter rimosis; paries basali brunnescentes, tenuis efformata. Hypostromata multipla, cum hyphas intracellularibus in sphaeras aggregata et mycelium penetrans usque mesophyllum, composita. Loculi linearibus, 62.5-100 u diam., 50-67.5 u alt., polyascigeri. Asci ellipsoidei vel ovoidei, sessili, 8-spori, 2-tunicati, 34-40 x 20-26.5 u. Paraphysis filiformibus, numerosis, ramosis, septatis, hyalinis, 1-2 u cr. Ascosporae ellipsoideae vel ellipsoide-clavatae, 1-septatae, primo hyalinae dein brunneae, constrictae, conglobatae, 20-22.5 x 8.5-10 u. In **Alloi natalensis** — Botanic Gardens, Maritzburg, Leg. Pole Evans, 8.4.1911. Typus n.º 1440, Union of South Africa, Dep. of Agricult. Mycol. Herb.

Obs. — This fungus has been identified as **Placoasterella rehmii** (P. Henn.) Theiss. & Syd. by E. M. Doidge and cited



Fig. 10

HYSTEROSTOMA MARITZBURGENSIS Batista & Vital n. sp.

a) Border portion of the stromata and free mycelium;
b) ascus and paraphyses;
c) ascospores;
d) Stromata under longitudinal cut.

in her important paper "South African Ascomycetes", Bothalia, nº 1, 1: 12. However, we have verified through the examination of the specimen 1440, that this fungus is quite distinct and we therefore transfer it to the genus **Hysterostoma**, as a new species, because of the presence of abundant paraphyses among the asci.

HYSTEROSTOMA MICROSPORA Doidge

E. M. Doidge — **in** Bothalia I, pág. 231, 1924
E. M. Doidge — **in** Bothalia V: 202, 1950

Ascostromata hypophyllous, roundish, 2.5 mm diam., black, with flat and rough surface, plurilocular, the border being fimbriate, with radiate and undulate brown hyphae, 2 — 2.5 u diam., which runs as in strands for the continuation of a free hyaline mycelium. The superior wall is 12.5 — 22.5 u thick, blackish-brown, opaque. Fig. 11.

The inferior wall is hyaline, thin, 8 — 13 u thick. Hypostroma multiple, as a subcuticular plate attached to the inferior wall of the ascostroma at several points, dark brown, sending brown hyphae to the intercellular spaces of the epidermal and palissade tissues, Fig. 12. Locules numerous, roundish, 168 — 240 u diam., 25 — 80 u in height, having a round or irregular pore 75 — 20 u diam., polyascigerous and irregularly disposed. Asci cylindric-clavate, short-pedicellate, 2-tunicate, 8-spored, 37 — 50 x 10-12.5 u. Paraphyses filiform, branched, hyaline, apparently not septate, 1.5 — 2 u thick. Ascospores clavate, 1-septate, not constricted, at first hyaline, then fuscous-olivaceous, distichous, 12.5 — 15 x 4.5 — 5.5 u.

On leaves of **Cassipourea gerrardi** Woodbush, Zothansberg, Transv. Leg. E. M. Doidge, 16-9-1923. Spec. nº 17781, Union of South África, Dep. Agric. Myc. Herb. associate with **Asterostomula pelladensis** (P. Henn.) Bat. & Vital n. comb.

Also on leaves of **Rubus sp.** Stone Valle. Huntingdon Co., Pa. C. R. Orton., Sept. 22, 1917. Spec. from The Pennsylvania State Univ. sub **Asterina rubina** Ellis & Ev.

Idem, on **Rubus sp.**, J. F. Adams, The Pennsylvania State Univ. sub **Asterina rubicola** E. & Ev.

Rubus hispidus L., East Hebron, New Hampshire, P. Wilson, 7.19.917. The Penn. State Univ. sub **Asterina rubicola** Ell. & Ev.

Rubus hispidus L. Ulsterville, Ulster, P. Wilson, 8.8.920. The Penn. State Univ. sub **Asterina rubicola** Ell. & Ev.

Rubus hispidus L. Bear Meadows, Pa. C. R. Orton, 8.24.919. The Penn. State Univ. sub **Asterina**.

Fig. 11

HYSTEROSTOMA MICROSPORA Doidge.

a) Detail of the border of the ascostroma;
b) Ascostroma under a longitudinal cut;
c) Asci, paraphyses and ascospores.

Orig.

Fig. 12

HYSTEROSTOMA MICROSPORA Doidge.

a) Longitudinal section of the ascostroma;
b) Detail of the marginal mycelium;
c) ascus and ascospores.

HYSTEROSTOMA MIMUSOPSIDIS (Doidge) Bat., Vital & Nasc., n. comb.

Syn.: **ASTERINELLA MIMUSOPSIDIS** Doidge **in** Bothalia, 1: 80, 1920

PRILLIEUXINA MIMUSOPSIDIS (Doidge) Ryan. **in** The Microthyriaceae — The Univ. Illinois Press, Urb. Illinois, p. 81, 1939

Colonies hypophyllous, superficial, roundish, brownish-black, 3 — 5 mm diam. Free mycelium superficial, not setose nor hyphopodiate, brownish; hyphae irregularly radiate and parallel, covering the ascostromata, Fig. 13, undulate, unilateral or irregularly branched, septate, no constricted, having cylindrical cells, 16.5 — 35.5 x 3.5 — 5.5 u; some hyphae penetrate directly the stomatal cavity. Hypostroma subcuticular to epidermal composed of two or more pillars, Fig. 14, which connect the basal membrane of the ascostroma, prosenchymatic, brownish, 34.5 — 45 x 31 — 37 u; haustoria epidermal, coralloid, Fig. 15. Ascostromata superficial, orbiculate, frequently confluent, 250 — 500 u diam., blackish-brown, dehiscence irregular, opaque at the central area where the wall has rectangular or irregular cells, 5.5 — 11 x 4.5 — 7 and fimbriate at the margins, having brownish and cylindrical hyphae, the cells of which are 11 — 20 x 3.5 — 10 u. Membrane basal in one or more layers, olivaceous. Asci clavate-ellipsoid to ovoidal, sessile, 2-tunicate, 8 spored, 56 — 68.5 31.5 — 41.5 u. Paraphyses not branched, septate, hyaline, longer than asci, 1.5 — 2.5 u diam. Ascospores oblong, at first hyaline, then brown, 1-septate, constricted, with unequal cells, polystichous, 26.5 — 33 x 13 — 15.5 u.

On leaves of **Mimusops obovata** Sond. Alexandria, Cape. E. M. Doidge, 18-7-927. Type nº 22369, Mycol. Herb. Dep. Agr. Union of South Africa.

This fungus is transferred to the genus **Hysterostoma** for having the ascostroma connected through a hypostroma at several points.

Fig. 13

HYSTEROSTOMA MIMUSOPSIDIS (Doidge) Batista, Vital & Nasc.

A sector of an ascostromata and the mycelium.



Fig. 14

HYSTEROSTOMA MIMUSOPSIDIS (Doidge) Batista, Vital & Nasc.

Ascostromata connected in two points with a columnar hypostroma.

Orig.



Fig. 15

HYSTEROSTOMA MIMUSOPSIDIS (Doidge) Batista, Vital & Nasc.

a) mycelial hyphae penetrating into stomatal cavity;
b) ascus, paraphyses and ascospores.

Orig.

HYSTEROSTOMA ORBICULATA Syd.

Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 239, 1915
Doidge — **in** Bothalia, vol. I, 13, 1921
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 413, 1926
Doidge & Bottomley — **in** Bot. Survey of South Africa, Memoir 11, p. 69, 1931.
Doidge — **in** Bothalia, vol. V: 202, 1950

Syn.: **DOTHIDASTEROMELLA ORBICULATA** Syd. **in** Ann. Myc. X: 41, 1912.

Ascostromata black, epiphyllous, rarely hypophyllous, circular, flattened, 3 — 4.5 mm diam., carbonaceous, with rough surface where deep irregular fissures maybe seem;



Fig. 16

HYSTEROSTOMA ORBICULATA Syd.

a) Ascostromata on the leaves of **Olea capensis** L.
b) Ropes of hyphae surrounding young ascostromata.

Orig.

Fig. 17

HYSTEROSTOMA ORBICULATA Syd.

Several aspects of the hypostroma.

Orig.

the margins are provided with a radiate fringe of hyphae, Fig. 16, which are 4 — 6 u thick, septate, branched, sinuose, sometimes forming true ropes, specially in the young ascostromata. The superior wall is blackish-brown, 20 — 37.5 u thick, radiate; the inferior wall is very thick, 37.5 — 92.5 u diam., and composed of roundish cells, 3.5 — 5 u diam. Locules numerous, dense but irregularly disposed, roundish, 200 — 300 u diam. Hypostroma multiple, brown, chiefly composed of a horizontal plate situated beneath the cuticle and connected at several points by pillars, with the basal portion of the ascostroma; from this plate the internal



Fig. 18

HYSTEROSTOMA ORBICULATA Syd.

Ascus and paraphyses.

Orig.

brownish mycelium goes into the mesophyllum, Fig. 17. Asci cylindric-clavate, sessile or short-pedicellate, 8-spored, 2-tunicate, 77.5 — 125 x 22.5 — 34 u. Paraphyses filiform,

brownish, simple, septate, longer than the asci, producing a brown epithecium. Ascospores ellipsoid, 1-septate, with unequal cells, constricted, brown, 30 — 34 x 12 — 17 u, polystichous. Fig. 18.

On leaves of **Olea capensis** L. Table Mt., Cape Town. Spec. nº 15038, Union of South África, Dep. Agric. Myc. Herb. associate with **Parodiopsis oleae** Bat. & Vital n. sp. Leg. M. Michell, 4-1-922.

HYSTEROSTOMA RAPANEAE Syd.

On leaves of **Rapanea ambigua,** Colônia Tovar, Venezuela.

Stromata sparse, epiphyllous, rounded, 1 — 3.5 mm diam., black, with many locules densely disposed; hyphae



Fig. 19

HYSTEROSTOMA RAPANEAE Syd.

Ascostromata and the peripheric loose hyphae.

Orig.

indistinctly radiate Fig. 19, and very reticulate — anastomosing, septate, dark-brown, 4 — 6 u diam., at the peripheral

area; hypostromata multiple, Fig. 20, hyaline, epidermical; locules rounded, eliptic, **X** ou **Y** — shaped, 150 — 300 u diam., or 350 u long by 200 — 300 u wide; cleft longitudinal or irregularly stellate; asci ellipsoid or ovate, elongate at maturity, sessile or sub-stipitate, 40 — 65 x 24 — 35 u 4-8-spored; ascos spores conglobate or irregularly tristichous,



Fig. 20

HYSTEROSTOMA RAPANEAE Syd.

a) ascostromata under longitudinal cut connected with the epidermal tissue at several points.
b) ascus and paraphyses.

Orig.

oblong, hyaline then brown, 27 — 27 x 10 — 12,5 u, paraphysoids numerous forming epithecium.

Sydow — **in** Ann. Mycol. XXVIII: 128, 1930
C. G. Hansf. — **in** The foliicolous Ascosmycetes their parasites and associated fungi, p. 178, 1946.

Obs.: The type species, n° 353 of the "Fungi Venezueiani" Collection on **Rapanea ambigua** collected by H. Sydow.

Colonia Tovar, Aragua, 1928 come to us by courtesy of the University of Michigan". From this examination we verified its authenticity.

RESUMO

O presente estudo é uma contribuição para a revisão analítica das espécies do gênero **HYSTEROSTOMA** Theiss., da família Polystomellaceae. São aqui reconhecidos como integrantes do gênero em foco, os seguintes fungos: **Hysterostoma acokantherae** (P. Henn) Theiss. & Syd. sôbre **Acockanthera sp., H. colae** Hansf. emend. Bat. & Vital sôbre **Cola natalensis, H. floridana** (T. & E.) Bat. & Vital n. comb. sôbre **Ardisia pickeringii, H. maritzburgensis** Bat. & Vital n. sp., sôbre **Aloe natalensis, H. microspora** Doidge sôbre **Cassipourea gerrardi, H. mimusopsidis** (Doidge) Bat, Vital & Nasc. n. comb. sôbre **Mimusops obovata, H. orbiculata** Syd. sôbre **Olea capensis** e **H. rapaneae** Syd. sôbre **Rapanea ambigua.**

RÉSUMÉ

Cet étude est une contribution pour la revision analytique des espèces du genre **HYSTEROSTOMA** Theiss., de la famille Polystomellaceae. Ici sont reconnus comme appartenants au genre mentionné, les suivants champignons: **Hysterostoma aconkantherae** (P. Henn.) Theiss. & Syd. sur **Acokanthera sp., H. colae** Hansf emend. Bat. & Vital sur **Cola natalensis, H. floridana** (T. & E.) Bat. & Vital n. comb. sur **Ardisia pickeringii, H. maritzburgensis** Bat. & Vital n. sp. sur **Aloe natalensis, H. microspora** Doidge sur **Cassipourea gerrardi, H. mimusopsidis** (Doidge) Bat., Vital & Nasc. n. comb, sur **Mimusops obovata, H. orbiculata** Syd. sur **Olea capensis** et **H. rapaneae** Syd. sur **Rapanea ambigua.**

Atas do IMUR
Ano I, págs. 159-165, 1960

CONSIDERATIONS ABOUT SOME SPECIES OF PARMULARIA Lév. (*)

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

Two species of **Parmularia** Lév. are studied in this paper.

The type species of this genus **P. hankei** (Nees.) Rehm is fully analysed and indicated its synonyms.

The other species investigated is **P. hymenolepidis** P. Henn. reval.

PARMULARIA Lév.

Type: **P. hankei** (Nees) Rehm.

Rehm — **in** Ann. Myc. V: 80, 1907
F. E. Clements & C. L. Shear — **in** The Genera of Fungi, p. 300, 1954
C. G. Hansford — **in** The foliicolous Ascomycetes their parasites and associated fungi; p. 167, 1946.
A. Chaves Batista — **in** Bol. S.A.I.C. vol. XVIII: 29,1951
G. Arnaud — **in** Les Asterinées, p. 116, 1918
Theiss & Syd — **in** Ann. Myc. XIII: 199, 1915
A. P. Viegas — **in** Bragantia, vol. 3, pág. 57, 1943.
Léville — **in** Ch. Herb. Museum Paris, p. 256, 1846
Léville — **in** Ann. Sc. Nat. Ser. III, v.V, pág. 236, 1846
Sacc. — **in** Syll. Fung. II: 661, 1883
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 404, 1926
Theiss & Syd — **in** Ann. Myc. XV: 407, 1917
C. G. Ainsworth & G. R. Bisby — **in** A Dictionary of the Fungi, pág. 254, 1954

(*) Publicação nº 117

Syn.: **Schneepia** Speg.

F. E. Clements & C. L. Shear — **in** (1. cit.) págs.: 96 and 300
C. G. Hansford — (1. cit.)
A. Chaves Batista — (1. cit.)
G. Arnaud (1. cit.)
Speg. — **in** F. Guarani I, pág. 133, 1883
Theiss — **in** Ann. Myc. XVI: 154, 1918
Theiss & Syd — **in** Ann. Mycol. XIII: 199, 1915 A. P. Viegas — (1. cit.)
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 404, 1926
Theiss & Syd — **in** Ann. Myc. vol. XV: 407, -917
C. G. Ainsworth & G. R. Bisby — **in** A. Dictionary of the Fungi, pág. 317, 1954

Syn.: **Schweinitziella** Speg

C. G. Ainsworth & G. R. Bisby — **in** a Dictionary of The Fungi, pág. 318, 1954
G. Arnaud — (1. cit.)
Speg. — **in** F. Guarani II: pág. 43, 1888
Sacc. — **in** Syll. Fung. IX: 1005, 1891
Helm — **in** Hedw. 39, pág. 23, 1900
Sacc. — **in** Syll. Fungorum XXIV: 534, 1926

Syn.: **Clypeum** Massee

G. Arnaud — (1. cit.)
Massee — **in** New or crit. f. pág. 145, pl. 357, 1896.

Stromata superficial, rounded, scutellar radiate context, locules linear, radiate.

Hypostromata epidermical, brown, reaching the leaf surface, at several points through the stromata.

Asci 8-spored, paraphysate.

Spore 2 — celled, dark.

PARMULARIA HANKEI (Nees) Rehm

G. Arnaud — **in** Les Asterinées, p. 116, 1918
Rehm — **in** Ann. Myc. V: 80, 1907

Syn.: **Parmularia arechavaletae** Speg.

G. Arnaud — (1. cit).

Schneepia arechavaletae Speg.

Speg. — **in** Fungi Puigg, n. 378, 1889
Sacc. — **in** Syll. Fung. IX: 1098, 1891
Viegas — **in** Bragantia, vol. 3, p. 57, 1943
Viegas — **in** Bragantia, vol. 4, p. 60,1944
G. Arnaud — (1. cit.)

Parmularia guaranitica (Speg.) Hennings

P. Henn — **in** Pilz. Sudamerika II, p. 230, 1897
P. Henn — **in** Hedwigia, p. 300, 1898
Sacc. — **in** Syll. Fung. XIV: 709, 1899
P. Henn — **in** Hedwigia, p. 230, 1897
G. Arnaud — (1. cit.)



Fig. 1

PARMULARIA HANKEI (Nees) Rehm.

On leaves of **Styrax ferrugineus.**

Orig.

Schneepia guaranitica Speg.

Petrak — **in** Ann. Myc. XXXII: 322, 1934
Speg. — **in** Fungi Guar. nº 304
Sacc. — **in** Syll. Fung. IX: 1097, 1891
F. Petrak — **in** Sydowia V: 185, 1951
Theiss & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 199,1915

G. Arnaud — (1. cit.)

Parmularia styracis Lév.

Rick — **in** Ann. Myc. V: 31, 1907

Liveille — **in** Ch. Herb. Muséum Paris, p. 256, 1846

Sacc. — **in** Syll. Fung. II: 662, 1883

Sacc. — **in** Syll. Fung. XI: 37, 1895

Sacc. — **in** Syll. Fung. XIV: 708, 1899

G. Arnaud — (1. cit.)

P. Henn — **in** Fung. Goyaz — p. 111

Parmularia styracis Lév. var. **minor** P. Henn

G. Arnaud (1. cit.)

Sacc. — **in** Syll. Fung. XI: 387, 1895

P. Henn. — **in** Fung. Goyaz.

Actidium hankei Nees

Ness — **in** Relig. Hank p. 2, pl I, fig. 1, 1825

v. Hönel — **in** Ann. Myc. XVI: 168, 1918

G. Arnaud — (1. cit.)

Clypeum hankei Massee

Massee — **in** New or crit. f., p. 145, pl. 357, 1896

G. Arnaud — **in** 1. cit.

Fig. 2

PARMULARIA HANKEI (Nees) Rehm.

Detail of the hypostroma.

Orig.

On leaves of **Styracis sp.** São Paulo, Brasil, 1901; **Styrax tomentosa,** México; **Styracis ferrugineus,** Minas Gerais, Bra-

sil; **Styrax parvifolia**, Brasil; **Styracis nervosum**, Minas Gerais, Brasil, 1943.

Free mycelium absent.

Stromata rounded, Fig. 1, flat to convex-flattened, plurilocular scattered. epiphyllous, 1.5 — 2 mm diam., 78 — 106 u in height, radiate-depressed; upper wall dark-brown, 32.5 — 45 u thick, prosenchymatic to paraplectenchymatic, margin crenate with some radiate hyphae, 3,5 — 5,5 u diam. and as long as 600 u in extension; lower wall light-brown, 7,5 — 12,5 u thick with the same structure as the upper wall. Locule linear, radiate, numerous, multiascigerous, 45 — 65 u in height with longitudinal, cleft, 10 — 17,5 wide; hypostroma multiple, brown, penetrating the host tissues

Fig. 3

PARMULARIA HANKEI (Nees) Rehm.

a) Ascostromata plurilocular;
b) Ascus and paraphyses.

through the stromata and enlarging in the epiderm from which **it runs** into the palisade tissue, Fig. 2. Asci cylindric-clavate, sessile to short stipitate, 2-tunicate, 8-spored, 57,5 — 95 x 15 — 17 u. Paraphyses filiform, to spatulate, septate, simple. Ascospores ellipsoid, 1-septate, brown, irregularly, 15 — 17,5 x 7 — 8 u. Pycnidia not found. Fig. 3.

Obs.: About this species we have examined the material nº 1687 of "Rehm: Ascomycetes" collection, on **Styracis sp**, São

Paulo, Brasil, determined as **Parmularia Styracis** Lév, which was lent to us by the University of Michigan.

Our opinion about the valid name for this species is exposed in "Discussion on the Genera "Parmularia" and "Schnneepia" and election of new genus Viegasia" (Bol. S.A.I.C., vol. XVIII, p. 29, 1951) of the former author.

OTHER SPECIMENS STUDIED

Spec. nº 3980, Balansa collect. "Plantes du Paraguay", 1878-84, on leaves of **Styrax sp.** 1883, The New York Botanical Garden — Ellis Collection, determined as **Schneepia guaranitica = Parmularia.**

Obs.: Only few spores are mature.

Spec. nº 3763, B. Balansa collect. "Pl. du Paraguay" — 1878-1884, on leaves of **Styrax sp.**, Vale de Y-acan, between Paraguari and Valenzuela, 5.3.883, determined as **Parmularia guaranitica** (Speg.) P. Henn., The New York Botanical Garden.

Obs.: Rare ascospores.

Spec. nº 3588, C. Roumeguere collect. Fungi Gallici exsiccati, on leaves of **Styrax sp.**, between Guarapi and Valenzuela, 5.3.883, J. Balansa (3764), determined as **Schneepia guaranitica,** Speg. The New York Botanical Garden (Ellis Collection).

Obs.: Rare mature ascospores.

Spec. nº 3981 — Balansa, on leaves of **Styrax sp.**, Paraguai, determined as **Schneepia guaranitica** and acquired by "The New York Botanical Garden" from "The Herbarium of George Masee, 1909".

Obs.: Stromata sterile.

Specimen S/N, ex Herbario Prof. Pe. Camille Torrend S. J. (Herbário do Colégio Campolide) on leaves of **Styrax sp.**, Brasil, leg. J. Rick; determined as **Parmularia Styracis** Lév.

Ascospores not fully mature. Also studied the spécimen nº 8815, IMUR.

PARMULARIA HYMENOLEPIDIS P. Henn. rev. Bat. & Vital

P. Henn. — **in** Hedn. XLVII: 261, 1908
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXII: 554, 1913

Sin.: **Schneepia hymenolepidis** (P. Henn.) Th. 2 Syd.
Th. & Syd **in** Ann. Myc. XIII: 204, 1915

Orig.

Stromatibus hypophyllis sparsis, crustaceo-membranaceis, atris, dimidiato-scutellatis, 5 — mm diam., loculis radiatoplicatis, ramosis, longitudinaliter, rimoso-dehiscentibus;

Ascis clavatis, obtusis, 8-sporis, 28 — 35 x 6 — 7 u, paraphysibus copiosis, superantibus, apice conglutinatis, clavatis, flavo-brunneis; Fig. 4.

Sporis subdistichis oblonge ovoideis, 2-guttulatis, medio 1-septatis, flavo-fuscidulis, 10 x 3 — 3,5 u.

Spec. type nº 1080, in Herbarium of the Bureau of Government Laboratories (Flora of the Philippines) on **Hymenolepsis spicata**, Net. Apo, Mindanao, 6.000 feet high, col. by E. B. Copeland, April, 21, 1904 and determ. by P. Henn.

Obs.: The specimen examined had only two ascostromata, one of which being used by us, was poor in asci and ascospores; the other one we left intact. So, the diagnosis has been taken from the original of P. Henn. (loc. cit.).

We have equally studied the specimen 19898, from New York Botanical Garden, (Flore of the Philippines) on **Polypodium varians**, coll. at. Net. Polis, Ifugao, Luzon, by R. C. Nogregor Febr. 1913, and det. by H. Sydow.

This material possesses immature ascostromata with young asci and ascospores.



Fig. 4

PARMULARIA HYMENOLEPIDIS P. Henn. reval. Bat. & Vital.

Stromata on a piece of leaf of **Polypodium varians.**

Orig.

RESUMO

O gênero **PARMULARIA** Lév. é analisado em sua espécie tipo: **P. HANKEI** (Nees) Rehm., cujos sinônimos são apresentados.

Também é estudada **P. HYMENOLEPIDIS** P. Henn. em um material-tipo muito pobre.

RÉSUMÉ

Le genre **Parmularia** Lév. est analysé dans son espèce type: — **P. hankei** (Nees) Rehm., dont les synonimes sont présentés. **P. hymenolepidis,** P. Henn. est aussi étudié dans un matériel type très pauvre.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 167-178, 1960

A TAXONOMIC REVISION OF SOME SPECIES OF **COCCONIA** Sacc. (*)

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

Some species of the genus **Cocconia** Sacc. are revised in this paper, being all of them accompanied with large documentation for the elucidation of certain characters peculiar to the family Polystomellaceae.

The species now studied are: **Cocconia capensis** Doidge, **C. coccolobae** (Ryan) Petrak, **C. concentrica** (Syd.) Syd., **C. miconiae** Bat. & Vital n. sp. and **C. porrigo** (Cke.) Sacc.

We are indebted to the Mycol. Herb. Union of South África, Prof. R. Ciferri, from Pavia, Italy, and Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda, for the cession of the specimens above.

COCCONIA CAPENSIS Doidge
in Bothalia, 1, nº 1: 8

Free mycelium null. Stromata epiphyllous, scattered or gregarious, roundish, black, 900 — 1500 u diam., 115 — 150 u in height, coriaceo-gelatinous, flattened to the periphery. The superior wall is carbonaceous, subparenchymatic, 12 — 20 u in thickness opaque, brownish at the edge, radiate and composed of rectangular and irregular cells, 5.5 — 17 x 2.5 — 8 u, annular, cracked at the maturity. The inferior wall is brownish to subhyaline, membrano-gelatinous, 14 — 20 u thick and made up of polygonal cells, 3 — 5.5 x 2.5 — 3.5 u. Hypostroma well developed, central, blackishbrown, Fig. 1, arising from the subepiderm up to the covered membrane of the stromata; it is composed of polygonal, cylindrical or irregula cells, 5.5 — 13.5 x 3.5 — 7 u; mycelium intramatrical, intercellularly disposed. Locules unique, annular, 190

(*) Publicação nº 118

Fig. 1

COCCONIA CAPENSIS Doidge.

Locules annular, sterile center and hypostroma seen under longitudinal cut.

Orig.

— 250 u wide, 55 — 110 u in height; center sterile. Asci clavate, 8-spored, 2-tunicate, short pedicellate, 61 — 70 x 18 — 25 u. Paraphyses filiform, numerous, septate, simple, 1 — 2 u diam. Ascospores oblong, hyaline at first, then brown, 1-septate, constricted, smooth, distichous 21 — 23.5 x 8 — 10 u. Fig. 2.

On leaves of **Ochna arborea** — van Stadens Pass Cape. Leg. E. M. Doidge, 19-5-1923. Spec. n° 17248, Union of South África, Dep. of Agric. Myc. Herb.

We also studied another specimen, on **Coccoloba laurifolia**, equally. Navarrete, Canada Bonita, Dominicana, 2-1-930. Det. F. Petrak. Ex Mycoflora Domingensis, n° 3875.

Fig. 2

COCCONIA CAPENSIS Doidge.

a) Detail of the margin of the superior wall;
b) ascus and paraphyses;
c) ascospores.

Orig.

COCCONIA COCCOLOBAE (Ryan) Petr.

Petr. — in Ann. Myc. XXXII: 324, 1934
Sin.: **Seynesia coccolobae** Ryan
Ryan — in Mycologia XVI: 178, 1924
Ann. Myc. XXV: 337, 1927

Free mycelium null.

Ascostromata hypophyllous, but producing brown spots in the epiphyllous face, scattered or confluent, Fig. 3, black, carbonaceous, plane-convex, 0,5 — 1 mm diam., 50 — 82 u in height. The superior wall is 12.5 — 47.5 u in thickness; blackish-brown, opaque, radiate, composed of brown hyphae,



Fig. 3

A leaf of **Coccoloba laurifolia** showing ascostroma of **Cocconia coccolobae** (Ryan) Petr.

3.5 — 7.5 u thick; the inferior wall is not distinct. The hypostroma is multiple, Fig. 4, a, having pillars of 7.5 — 11 u in height, 15 — 24 u wide, composed of brown of 2.5 — 6 u diam.; from these pillars masses of hyphae go into the epidermical and parenchymatic tissues, Fig. 4-b, between the cells or even through the cells found in their way. The locules are anular, around a central sterile portion of the ascostroma. Asci elliptic clavate, 2-tunicate, 8 spored, sessile to short pedicellate, 50 — 70 x 17 — 20 u. Paraphyses filiform, septate, simple, 1 — 2 u thick, hyaline. Ascospores oblong-ellipsoid or slightly clavate, 1-septate, not constricted hyaline at first, then brown, 20 — 22.5 x 5 — 7.5 u. Fig. 5.

On leaves of **Coccoloba laurifolia** — La Caleta, Dominica. Leg. Ekman, 18-12-929 — Det. F. Pertak. Ex Mycoflora Domingensis, R. Ciferri, nº 3012.



Fig. 4

COCCONIA COCCOLOBAE (Ryan) Petrak.

a) Hypostroma multiple;
b) Detail of the hypostroma mass of hyphae.



Fig. 5

COCCONIA COCCOLOBAE (Ryan) Petrak.

a) detail of the border of the ascostromata superior wall;
b) paraphysate asci;
c) ascospores. Orig.

COCCONIA CONCENTRICA (Syd.) Syd.

Theiss & Syd. — in Ann. Myc. XIII: 215, 1915
Doidge — in Bothalia I: 7, 1921
C. G. Hansford — in Proc. of The Linnean Society of London, 1941, p. 45.
..... — in The Foliicolous Ascomycetes their parasites and associated Fungi, p. 170, 1946.

Syn.: **Hysterostomella concentrica** Syd.
Syd. — in Ann. Myc. VII: 544, 1909
Sacc. — in Syll. Fung. XXII: 556, 1913

Syn.: **Hysterostomella circularis** Har. & Pat.
Har. & Pat. — in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 368, 1911.

Free mycellium null.

Ascostromata epiphyllous, scattered or confluent, Fig. 6, collective, composed of small individual fructifications which grow centrifugally in concentric rings, Fig. 7-a, continuously or with interruption, Fig. 7-b. When fully ripe the ascostromata is seen as a circle, up to 3.5 mm diam., 230 — 300 u in



Fig. 6

COCCONIA CONCENTRICA (Syd.) Syd.

Ascostroma on **Trichilia** leaf.

height, black, carbonaceous, with crustaceous surface. The superior wall is blackish-brown, opaque, 17.5 — hyphae. 5 — 7.5 u diam.; the inferior wall is prosenchymatic, 10 — 32.5 u diam. The locules are annular, concentric, 75 — 112 u wide, 62 — 70 u in height, showing longitudinal crack, 20 — 38 u wide, Fig. 8. The hypostroma is a compact mass of brownish-black hyphae developed in the epiderm of the host, sometimes reaching the mesophyll, 120 — 142 u diam., connected with the inferior wall of the ascostromata through



Fig. 7
COCCONIA CONCENTRICA (Syd.) Syd.
a) Ascostroma in concentric rings;
b) Ascostroma not in circle, interrupted.



Fig. 8
COCCONIA CONCENTRICA (Syd.) Syd.
Ascostromatat under a longitudinal cut showing the hypostroma.

many hyphal filaments, brown and 1.5 — 2 u diam. Fig. 9.

Asci cylindric-clavate, short-pedicellate, 2-tunicate, 8-spored, 45 — 55 x 14 — 18 u. Paraphyses simple, septate, longer than the asci, 2 — 2.5 u thick, and forming brown epithecium. Ascospores ellipsoid, 1-septate, hyaline at first, then brown, constricted, polystichous, 15 — 17.5 x 4 — 6 u. Fig. 10. On **Trichilia roka** — Pietermaritzburg, Natal. Jan. 1955. Det. by P.H.B.I. and now revised by us, through the courtesy of the Union of South África, Dept. Agric. Myc. Herb. Spec. nº 41040.

Obs.: In this specimen the central sterile area in the loculles is not constant for all fructifications.

Fig. 9

COCCONIA CONCENTRICA (Syd.) Syd.

a) Ascostromata under a longitudinal cut, showing the hypostroma;
b) asci, paraphyses and ascospores.

Orig.

We have also studied the specimen on **Trichilia sp.** associated with **Parasterina trichiliae** (Doidge) Bat., identified by C. G. Hansford, march 1934, which possesses the ascostromata irregularly or stellate diposed, in accordance with our fig. nº 7, Material from Herb. Mycologist, Dep. Agric. Uganda.

We have equally examined the specimen nº 2390 of the Herb. Mycologist. Dep. Agric. Uganda, on **Trichilia sp.,**

Entebbe Road Forests, 2. 1938, Coll. by C. G. Hansford, in which we also found **Parasterina trichiliae** (Doidge) Bat. & Vital.



Fig. 10

COCCONIA CONCENTRICA (Syd.) Syd.

a) Detail of the ascostromata mangin;
b) ascus and paraphyses;
c) ascospores.

COCCONIA MICONIAE Bat. & Vital n. sp.

Free mycelium null.

Stromata epiphyllous, roundish, black, 800 u to 2 mm diam., scattered. Fig. 11-a. Locule in concentric circle, 1 to 3 disposed, 180-225 u wide, 93 — 112 u in heighth, showing a longitudinal fissure of 19 — 40 u wide, Fig. 11-b. The superior wall is brownish-black; opaque, 26 — 40 u thick, becoming less colored toward the margin, where there can be seen the radiate structure and the occurrence of some prolonged tortuous hyphae, 3 — 5 u wide. The inferior wall is brownish, 3 — 12.5 u in thickness, bein its structure bad defined. The hypostroma is multiple and composed of several epidermal pillars. Fig. 11-c, brownish black, 12.5 — 31 u in heighth, 12.5 — 17 u wide; from these pillars hyaline and septate hyphae, 2 — 3.5 u diam. go into the epidermal and palisade tissues, freely or not. The asci are cylindric-clavate, 55 — 76 x 16.5 — 20 u sessile, 2-tunicate, 8-spored. The

paraphysis are filiform, simple or branched, septate, hyaline and longer than the asci, 1.5 — 2 u diam.

The ascospores are oblong, 1-septate, constricted, brown, irregularly distichous, the superior cell more volumous than the inferior cell, 12.5 — 15 x 7 — 8 u. Fig. 12.



Fig. 11

COCCONIA MICONIAE Bat. & Vital n. sp.

a) Stromata in concentric circle;
b) Stromata under a longitudinal section.
c) Detail of the hypostroma.

1000 x

On dead leaves of **Miconia sp.** — Carmelita — Puerto Rico. Leg. L. S. Earle, summer of 1903. Type, on the Herbarium of the New York Botanical Garden.

Obs.: This specimen was labeled as **Hysterostomina miconiae** with a pencil manuscript inscription, under a question mark.

Micelio libero nullo.

Stromata epiphylla, rotundata, nigra, 800 u vel 2 mm diam., sparsa. Loculis 1 — 3 concentricis, 180 — 225 u diam., 93 —112 u alt. longitudinaliter rimosis, 19 — 40 u diam.; paries superior atro-brunneus, opacus, 26 — 40 u cr. marginibus radiatis ex hyphis 3 — 5 u diam.; paries basalis brunnescens, 3 — 12.5 u cr. compositus. Hypostromata multipla, in columnata epidermalia, atro-brunnea, 12.5 — 31 u alt. 12.5 — 17 u diam., ex hyphis intramatricalibus hyalinis, septatis, 2 — 3.5 u diam. Asci cylindro-clavati, 55 — 76 x



Fig. 12

COCCONIA MICONIAE Bat. & Vital n. sp.

Margin of the stromata; paraphysate asci and ascospores.

16.5 — 20 u, sessil, 2-tunicati, 8-spori. Paraphysibus filiformibus, septatis, simplicibus vel ramosis, 1.5 — 2 u diam. Ascosporae oblongae, 1-septatae, constrictae, brunneae, irregulariter distichae, 12.5 — 15 x 7 — 8 u.

In foliis mortuis **Miconiae** sp. Carmelita — Puerto Rico — Leg. L. S. Earle, 1903. Typus, in Herbarium The New York Botanical Garden — U.S.A.

COCCONIA PORRIGO (Cke.) Sacc.

Theiss & Syd.	— **in** Ann. Myc. XII: 214, 1915
Sacc.	— **in** Syll. Fung. VIII: 738, 1889
Theiss & Syd.	— **in** Ann. Myc. XV: 408, 1917
Doidge	— **in** Bothalia I, pág. 7, 1921
Dippenaar	— **in** 'n Bydrae tot ons Kennis van die Suid-Afrikaanse Geslagte en Soorte van die Familie Polystomellaceae. Ann. van die Univer. van Stellenbosch, Jaargang VIII, Reeks A, Afl. 2. p. 12, 1930.
Nel, G. C.	— **in** Ann. Univ. Stellenbosch, Jaargang XX, Reeks A, nº 2, p. 22, 1942.

Syn.: **Rhytisma porrigo** Cooke

Cooke	— **in** Exotic fungi. Grevillea X, p. 129, 1882.
v. Höhnel	— **in** Frag. zur Mykologie, nº 496, 1910.

RESUMO

O gênero **Cocconia** Sacc. é estudado, neste trabalho, sob algumas de suas espécies, que indicamos a seguir: **C. capensis** Doidge, sôbre **Ochna arborea, C. coccolobae** (Ryan) Petrak, sôbre **Coccoloba laurifolia, C. concentrica** (Syd.) Syd. sôbre **Trichilia sp, C. miconiae** Bat. & Vital n. sp. sôbre **Miconia sp.** e **C. porrigo** (Cke.) Sacc. sôbre hospedeiro desconhecido.

RÉSUMÉ

Le genre **Cocconia** Sacc. est étudié dans ce travail sur quelques de ses espèces telles que: **C. capensis** Doidge, sur **Ochna arborea, C. coccolobae** (Ryan) Petrak sur **Coccoloba laurifolia, C. concentrica** (Syd) Syd. sur **Trichilia sp., C. miconiae** Bat. & Vital n. sp. sur **Miconia sp.** et **C. porrigo** (Cke) Sacc. sur hôte inconnu.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 179-188, 1960

A Systematic study of species of the genera CYCLOSCHIZON (P. Henn.) Doidge and CYCLOSTOMELLA (Pat.) Syd. (*)

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

A revision of some species of the genera **Cycloschizon** (P. Henn.) Doidge and **Cyclostomella** (Pat.) Syd. is the objective of this paper.

The few species here analyzed offer however, a good idea about the characteristics of the genera discussed.

Cycloschizon elaeicolum (Maubl.) Arn,

C. brachylaenae (Rehm) P. Henn.

C. fimbriatum Doidge,

Cyclostomella disciformis Pat. and

C. oncophora Syd. are redescribed and illustrated.

CYCLOSCHIZON (P. Henn.) Doidge

in Engl. Bot. Jahrb. XXXIII: 39, 1902
Bothalia, 1, 1: 6, 19

Syn.: **Dielsiella** P. Henn.
in Hedwigia, p. 84, 1903

Type: **C. brachylaenae** (Rehm) P. Henn.

Ascostromata superficial, orbicular, radiate; hypostromata central, single; locules ringform, continuous or interrupted. Asci paraphysate. Ascospores phaeodidymous.

(*) Publicação nº 119

CYCLOSCHIZON BRACHYLAENAE (Rehm) P. Henn.

in Engl. Bot. Jahrb. XXXIII: 39, 1902
Syll. Fung. XVII: 896, 1905
Ann. Myc. XIII: 207, 1915
Bothalia, 1, 1: 6, 19
Bothalia, vol. V: 196, 1950

Syn.: **Schneepia brachylaenae** Rehm
in Hedwigia, p. (173), 1901

Free mycelium null, Fig. 1. Ascostromata epiphyllous, roundish, blackish-brown, the central portion a little raised, sterile, surrounded by an irregular and salient ring which corresponds to the sporigenous zone of the fruiting body, 240 — 362 u diam., numerous, gregarious in roundish colonies that reach up to 9 mm diam. and produces a spot on



Fig. 1

a) A leaf of **BRACHYLAENA DENTATA** showing ascostromata of **Cycloschizon brachylaenae** (Rehm) P. Henn.
b) Ascostromata.

Orig.



Fig. 2

CYCLOSCHYZON BRACHYLAENAE (Rehm) P. Henn.

a) Ascostromata under longitudinal cut;
b) Border portion of the ascostromata superior wall;
c) Ascus and paraphyses;
d) Ascosporos.

Orig.

the leaf tissue. The superior wall is radiate, opaque in the central part, 7.5 — 15 u thick, the border being entire and composed of brown hyphae, 3 — 5.5 u wide; the inferior wall is brownish, 2.5 — 7.5 u thick. Hypostromata single epidermal, dark brown, pseudoparenchymatic in structure and 65 — 110 u wide. Locules ringform, 75 — 95 u wide and 50 — 75 u in height. Asci clavate, sessile, 8-spored, 2-tunicate, 37.5 — 50 x 15 — 21 u. Paraphyses filiform, spathulate, septate, the apex being brownish. Ascospores clavate, 1-septate, little constricted, at first hyaline, then brown, with unequal cells, polystichous 13.5 — 17.5 x 5 — 7.5 u. Fig. 2.

On leaves of **Brachylaena discolor** Lemana. Zoutpansberg, Natal. Leg. E. M. Doidge, 14-8-911. Spec. nº 1789, Union Depart. Agric. South Africa.

We studied also the following specimens: nº 11445, Union of South Africa, Dep. of Agric. Mycol. Herb. on **Brachylaena dentata**, van Stadens Pass, Port Elizabeth, Cape Prov. Leg. I. B. Pole Evans, 17-5-918, det. by E. M. Doidge, nº 0562. from the same host and locality, coll. by A. M. Bottomley, 9-3-1916 and det. by E. M. Doidge.

CYCLOSCHIZON ELAEICOLUM (Maubl.) Arn.
Syn. **Hysterostomella elaeicola** Maubl.

Sacc. — **in** Syll. Fung. XXII: 556 (1913)
Maubl. — **in** Soc. Mycol. France XXIII: 143
Theiss and Sydow — **in** Ann. Myc. XIII — 227 (1915)
G. Arnaud — **in** Les Astérinées, p. 112 (1918)

On leaves of **Elaeis guineensis** — Dahomey — Africa.

Stromata attached by the margins, lobate, then hypostroma multiple, black, carbonaceous, up to 1 cm. diam.; locules flexuous, dehiscent through a longitudinal cleft; asci ovate, 8-spored, 50 — 55 x 15 — 20 u; spores hyaline then palebrown, 1-septate, elliptic, pale brown, 16 — 17 x 6 u.

CYCLOSCHIZON FIMBRIATUM Doidge
in Bothalia, 1, (1): 6, 1921

Free mycelium as a fringe of brown, flexuous, Fig. 3-a branched and septate hyphae at the periphery of the ascostromata, amphigenous. Ascostromata roundish, 1,5 — 2 mm diam., Fig. 3-b scattered, crustaceous, black, having a salient and irregular ring which indicate the position of the locule.



Fig. 3
CYCLOSCHIZON FIMBRIATUM Doidge.
a) Free mycelium;
b) Roundish ascostromata;
c) A leaf of **Catha edulis** with **C. fimbriatum.**

The superior wall is brown, radiate, and composed of cells 3.5 — 4 u thick which are in continuation with the peripherical mycelial hyphae; the inferior wall is brown also and 17.5 — 37.5 u in thicknes, attached to a simple hypos-

Fig. 4

CYCLOSCHIZON FIMBRIATUM Doidge.

a) Ascostroma under longitudinal cut;
b) Ascus and paraphyses;
c) Ascospores.

troma as a central, Fig. 4, foot; from the base of the hypostroma develops a mass of hyaline hyphae that goes into the palissade and mesophyllum tissues through the intercellular spaces of these tissues. Locule linear in a complete or

not complete ring, 180 — 270 u wide and 100 — 115 u in height. Asci ellipsoid, 55 — 60 x 30 — 33 u, sessile, 8-spored, 2-tunicate. Paraphyses filiform, simple, septate, hyaline, apex spatulate and brownish, 2 — 2.5 u thick. Ascospores ellipsoid, at first hyaline, then brown, 1-septate, constritecd 28 — 30 x 12 — 13.5 u.

On leaves of **Catha edulis** — Fig. 3-c. Louis Tuchards, Union of South Africa. Leg. V. A. Puterill, 8-4-919.

CYCLOSTOMELLA (Pat.) Sydow.

H. Sydow — **in** Ann. Myc. XXV: 26, 1927
Theiss & Syd. **in** Ann. Myc. XIII: 206, 1915
Pat. — **in** Bull. Herb. Boiss, p. 655, 1896
Sacc. — **in** Syll. Fung., XIV: 707, 1899
Theiss. & Syd. — **in** Ann. Myc., XV: 407, 1917
C. G. Hansford — **in** The foliicolous Ascomycetes their parasites and associated fungi, p. 167, 1946
F. E. Clements & C. L. Shear — **in** The Genera of Fungi, pp. 96 and 298, 1954.

Stromata spread, superficial, context prosenchymatic, somewhat sub-globose or papilliform, carbonous; upper wall radiate, many-layered; locules conidia-bearing scanty. Central locule sterile, surrounded by ring-like locules and by linear ones irregularly or radially disposed; hypostroma simple, central, sub-epidermal; ostiole hysteroid; asci 2-tunicate, clavate, at first 8-spored later 10 — 16-spored by sporic fragmentation; spores oblong-clavate, 1-septate, black-gray; paraphysoides slimy forming spithecium.

Note: This genus has been emended by Sydow, (1. cit. 1927)

CYCLOSTOMELLA DISCIFORMIS Pat.

On leaves of **Nectandra** sanguinea, La Caja, pr. San José, Costa Rica, 1925; (on unknown host, Costa Rica, C. Tonduz).

Stromata amphigenous, principally hypophyllous, Fig. 5 with scanty conidia-bearing locules, rounded, 0.7 — 3 mm diam., attached at the center, carbonous, radiate; central locule sterile, surrounded by ring-like locules and by linear ones irregularly or radially disposed; hypostroma central, Fig. 6, sub-epidermal; ostiolo hysterioid; asci parallel, clavate or sub-cylindric, sessile, at first 8-spored later 10 — 16-

spored by sporic fragmentation, 45 — 60 x 12 — 16 u; spores distichous or incompletely tristichous, oblong-clavate, 1-septate, then separating in locules ellipsoid or ovoid, blackgray, locules 7 — 10 x 5 — 7 u or 7 — 8 u diam. Fig. 7.



Fig. 5

CICLOSTOMELLA DISCIFORMIS Pat. on leaf of **Nectandra sanguinea.**

Orig.



Fig. 6

CYCLOSTOMELLA DISCIFORMIS Pat.

Central and simple hypostroma.

Orig.

Obs.: We studied the specimen n° 925, "Sydow, Fungi exotici exsiccati" kindly lent to us by the Curator of the Herbarium of The University of Michigan, collected and determined by H. Sydow.

In this specimen we have not found the imperfect stage of **Pycnostemma disciforme** Syd. mentioned in the label. However it is necessary to point out that Sydow himself has called attention to the fact that this conidial stage was not abundant.



Fig. 7

CYCLOSTOMELLA DISCIFORMIS Pat.

Partial view of one ascostroma showing a locule with didymospore and fragmented ascospores.

CYCLOSTOMELLA ONCOPHORA Syd.

On **Ocotea veraguensis** Mez, San Pedro de San Ramon, 1925.

Stromata hypophyllous, Fig. 8, rarely epiphyllous, rounded, scattered or then aggregated, 1 — 3 mm. diam., central part sterile, warted, 500 — 800 u diam., surrounded by conidial annulate locules; locules ascigerous also annulate turning round the conidial ones, 350 — 600 u broad, cleft ringed; hypostromata 200 — 300 u broad; asci numerous, parallel, cylindric-clavate, sub-sessile, 2-tunicate, 8-spored, becoming 16-spored by separation of the sporic cells, 95 — 130 x 12,5 — 17,5 u. Ascospores oblong, monostichous or irregularly distichous, divided at the septa in two locules, ellipsoid, oval or globose, at first hyaline, later, brown, 17 — 20 x 7 — 10 u diam.; paraphysoid gelatinous.

H. Sydow — **in** Ann. Mycol., XXV: 30, 1927.
Syd. & Pet. — **in** Myc., XXVII: 46, 1929.

Obs.: The specimen analyzed, number "926, Sydow Fungi exotici exsiccati" lent to us through courtesy of The University of Michigan, U.S.A. was poor in ascospores.



Fig. 8

CYCLOSTOMELLA ONCOPHORA Syd.

On a leaf of **Ocotea veraguensis** Mez.

RESUMO

Esta publicação apresenta os resultados da revisão taxonômica que os A. A. levaram a efeito a propósito das seguintes espécies de **CYCLOSCHIZON** e **CYCLOSTOMELLA**, da família Polystomellaceae:

C. ELAEICOLUM (Maubl.) Arn. sôbre **Elaeis guineensis,**
C. BRACHYLAENAE (Rehm) P. Henn, sôbre **Brachylaena discolor,**
C. FIMBRIATUM Doidge sôbre **Catha edulis,**
CYCLOSTOMELLA DISCIFORMIS Pat. sôbre **Nectandra sanguínea** e
C. ONCOPHORA Syd. sôbre **Ocotea veraguensis.**

RÉSUMÉ

Cette publication présente les résultats de la revision taxonomique que les auteurs entreprirent dans les espèces de **Cycloschizon** et **Cyclostomella** de la famille Polystomellaceae.

C. elaeicolum (Maubl.) Arn. sur **Elaeis guineensis,**
C. brachylaenae (Rehm.) P. Henn., sur **Brachylaena discolor,**
C. fimbriatum Doidge sur **Catha edulis,**
Cyclostomella disciformis Pat. sur **Nectandra sanguinea** et
C. oncophora Syd. sur **Ocotea veraguensis.**

Atas do IMUR
Ano I, págs., 189-198, 1960

A REVISION OF THE SPECIES OF THE GENUS ELLISIODOTHIS Theiss. (*)

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

In this contribution to the revision of the fungi of the family Polystomellaceae the A. A. had the opportunity to study the following species of the genus **Ellisiodothis** Theiss:

E. grammatophylii (Sacc.) Syd.,
E. inquinans (E. & Ev.) Theiss.,
E. pandani H. & P. Sydow,
E. **pittieri** Syd.

ELLISIODOTHIS GRAMMATOPHYLLI (Sacc.) Syd.
H. und P. Sydow — **in** Ann. Myc. XVIII: 184, 1920

Syn.: **Microthyrium grammatophylli** Sacc.
Sacc. **in** Notae Mycol. XXIV, p. 11 (Bull. Orto. bot. Napoli, 1918)
------- **in** Syll. Fung. XXIV: 425

Free mycelium null. Ascostromata epiphyllous, Fig. 1, roundish, black, carbonaceous isolate or confluent, 220 — 450 u diam. The superior walls are in several layers, 15 — 25 u in thickness, blackish-brown, opaque, in the central area composed of roundish or polygonal cells, 6.5 — 20 x 4.5-9 u while on the margins the cells are rectangular and radially disposed, 3 — 12 x 3 — 5.5 u; ostiole roundish, 10 — 25 u diam. The inferior walls are subhyaline or brownish, 2.5 — 6.5 u thick. Locule ascigerous elliptical, 38 — 50 u in height, 125 — 165 u wide. Hypostroma Fig. 2 having pillars of 15 — 18 x 10 — 12.5 u, almost opaque and widened at the

(*) Publicação nº 120



Fig. 1

ELLISIODOTHIS GRAMMATOPHYLLI (Sacc.) Syd.

a) ascostromata;
b) asci and paraphyses;
c) ascospores.

base where the dimensions reach 47 — 52.5 u; this basal portion of the hypostroma is seated in the palissade tissue and brownish, with polyhedric cells. Asci cylindric-clavate, short pedicellate, 2-tunicate, 8 spored, 49 — 60 x 18 — 19.5 u. Paraphyses hyaline, branched, shorter than the asci, 1—1.5 u diam., abundant. Ascospores elliptic to ovoid, hyaline, continuous, distichous to polystichous, 15 — 18 x 5.5 — 7 u.

Fig. 2

ELLISIODOTHIS GRAMMATOPHYLLI (Sacc.) Syd.

Longitudinal cut showing a hypostroma.

Orig.

On leaves of **Grammatophyllum speciosum.** Island of Singapore, Straits Settlements, Aug. 1897.

The specimen we have studied is the type which Saccardo, previously named **Microthyrium grammatophylli** Sacc. (loc. cit.); it has the n° 467, Fungí Malayana C. F. Baker.

Sydow (loc. cit.) transferred this fungus to **Ellisiodothis** and now we entirely agree with this transference, since its characteristics are typically those of Polystomellaceae.

ELLISIODOTHIS INQUINANS (E. & Ev.) Theiss.

Theiss. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 247, 1915.
Theiss. — **in** Ann. Myc. XII: 73, 1914.
E. S. Lutrell — **in** American Journal of Botany, vol. 35, n° 1, 1948 (The morphology of **Ellisiodothis inquinans).**
Amy G. Weedon — **in** Mycologia, vol. XVIII, 298, 1926.

F. Petrak — in Sydowia, VII: 104 and 398, 1953.
C. G. Hansford — in The foliicolous Ascomycetes their parasites and associated fungi, p. 168, 1946.



Fig. 3

ELLISIODOTHIS INQUINANS (E. & Ev.) Theiss.

a) Ascostroma under longitudinal cut;
b) sector of the superior wall;
c) ascus and paraphyses.

Syn.: **Asterina inquinans** E. & Ev.

E. & Ev. — in Journ. of Myc., p. 41, 1887.
Sacc. — in Syll. Fung., IX: 388, 1891.

Asterula inquinans (E. & Ev.) Theiss.

Theiss. — in Ann. Myc. X: 193, 1912.

On **Sabal palmetto**, Louisiana, U.S.A., **S. serrulata, S. adansonia, Lespedeza bicolor**, Georgia, U.S.A., **Phaseolus lunatus**, Georgia, U.S.A., **Desmodium sp,,** Georgia, U.S.A., **Tecoma radicans**, Georgia, U.S.A., Palm, Soledad, Santa Clara Province, Cuba, 1935, **Sabal palmetto**, St. Petersburg, Florida, U.S.A.

Ascostromata rounded to elliptical, black, isolated to confluent, 177 — 517 u in diam. uniloculate, ostiole rounded or stellate; hypostromata multiple; asci ovoid or oblong, sessile or short-stipitate, 35 — 87 x 15,5 — 35 u, paraphysate, 8-spored; ascospores hyaline, not septate, 11 — 22,5 x 6,5 — 12,5 u, ovoid, elliptical or oblong. Fig. 3.

MATERIAL EXAMINED:

705, **Ellisiodothis inquinans** (Ell. & Ev.) Theiss. on palm, Soledad, Santa Clara Province, Cuba, September 17, 1935, collected by A. G. Kevorkian and determined by R. A. Toro, of the "Reliquial Farlowiannae" collection, that came to hand through the courtesy of Dr. B. Kanouse of the University of Michigan.

This material is in accordance with the original description.

ELLISIODOTHIS PANDANI H. & P. Sydow

On leaves of **Pandanus lusonensis**, Bulacan, Philippine on dead leaves **Dianella revoluta**, Meningie, South Australia.

Theiss and Syd. — **in** Ann. Myc. XV — 221 (1917).
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 407 (1926) .
Theiss and Syd. — **in** Ann. Myc. XIII — 247 (1915).
v. H. and Syd. — **in** Ann. Myc. XII — 565 (1914).

Stromata superficial, attached at several points, by hypostroma, gregarious, rounded, 0,3 — 1 mm., black, opaque, subcarbonous, radiate context with hyphae from 3 — 5 u wide; hypostroma epidermical; ostiole rounded; asci ellipsoid — oblong to clavate, 50 — 70 x 20 — 26 u, 8-spore, paraphyses numerous; spores monostichous or distichous, ellipsoid or oblong-ellipsoid, continuous, hyaline, 17 — 20 x 8 — 10,5 u.

(*) Leg. L. D. Williams.
2/1956
Waite Agric. Res. Inst. nº 6648.

Obs.: We have studied another specimen that appears to be this same fungus, with the following characteristics:

Free mycelium none.

Stromata shield-shaped, rounded, 270 — 518 u diam.



Fig. 4

ELLISIODOTHIS PANDANI H. & P. Syd.

Natural aspect of the stroma.

Orig.



Fig. 5

ELLISIODOTHIS PANDANI H. & P. Syd.

Ascostromatic locule.

Orig.

and 62 — 120 u high when isolated or forming irregular crusts Fig. 4, by the confluence of the single stromata, reaching 12 x 5 mm black, carbonaceous, rough surface, 1 — 3 loculated, Fig. 5; **upper wall** with the central portion opaque black-brown and the peripherical one brown in color

disclosing its radiate nature, composed of hyphae from 3,5 — 5 u diam., black-brown, with well defined margins, ostiole round with split borders, 11 — 16 u diam.; **lower wall** clearer than the superior, brown, 3,5 — 7,5 u thick; locules elliptic, 44 — 90 u high, 134 — 242 u wide, producing many asci; hypostromata multiple, formed by brown pillar 14 —

Fig. 6

ELLISIODOTHIS PANDANI H. & P. Syd.

a) Detail of a part of the hypostromata;
b) A radiate section of the upper wall of the stroma.

Orig.

17,5 u high and 8 — 10 u wide or constituted by single brown hyphae, 2,5 — 6 u diam. that cross the cuticle and reaching intercellular and intracellulary the cells of the epiderm and adjacent tissues. Fig. 6.

Asci cylindric-clavate, 45 — 65 x 22,5 — 25 u, cylin-

dric conic pedicel up to 30 u long, 8-spored 2-tunicate, numerous, persistent, filiform, branched and septate paraphyses. Fig. 7.



Fig. 7

ELLISIODOTHIS PANDANI H. & P. Sydow.

a) Sector of the ascostroma;
b) Paraphysate asci;
c) Ascospores.

Orig.

Ascospores ellipsoid to oval, 15 — 20 x 8 — 11 u, continuous, hyaline, disorderly disposed in the asci, smooth.

Note: Associated with other ascomycetes fungi.

Unknown host — Jaboatão. Leg. S. J. Silva, 19-7-1956. Spec. nº 5693, IMUR.

ELLISIODOTHIS PITTIERI Syd.

On leaves of **Palmae**, Puerto La Cruz, Venezuela.

Stromata black, superficial, isolated or sometimes confluent, rounded or irregular in shape, 120 — 250 u diam., 35 — 50 u high; **upper wall** radiate, dark-brown, open at



Fig. 8

ELLISIODOTHIS PITTIERI Syd.

a) A longitudinal cut of ascostroma showing multiple hypostroma;
b) Sector of the superior wall;
c) Ascus and paraphyses.

Orig.

the maturity by clefts; **lower layer** hyaline, membranous; **hypostromata** multiple, sub-epidermal; **asci** clavate, oblong ellipsoid or ovoidal, 2-tunicate, 4-8-spored, 30 — 55 x 17 — 28 u; **ascospores** distichous or irregularly tristichous, oblong-

ellipsoid or oblong-ovoidal, one-celled, hyaline, 10 — 20 x 4,5 — 8 u; paraphysoids scant, fibrous. Fig. 8.

H. Sydow — **in** Ann. Myc., XXVIII: 132, 1930.

Obs.: We have examined the material type, nº 174 d XII, 1927 of the "Fungi Venezuelani" collection which was lent to us by Dr. B. Kanouse of the University of Michigan, U.S.A. Its. characters correspond entirely with Sydow's description, **in** Fungi Venezuelani (op. cit.).

RESUMO

Êste trabalho é uma contribuição à revisão dos fungos Polystomellaceae, versando sôbre o reexame das seguintes espécies do gênero **ELLISIODOTHIS** Theiss.:

E. GRAMMATOPHYLLI (Sacc.) Syd. sôbre **Grammatophyllum speciosum,**
E. INQUINANS (E. & Ev.) Theiss. sôbre diversos hospedeiros,
E. PANDANI H. & P. Sydow também sôbre diversos hospedeiros,
E. PITTIERI Syd. sôbre **Palmae.**

RÉSUMÉ

Dans cette contribution pour la revision des champignons de la famille POLYSTOMELLACEAE, les auteurs ont eu l'opportunité d'étudier des espèces du genre **ELLISIODOTHIS** Theiss., telles que

ELLISIODOTHIS GRAMMATOPHYLLI (Sacc.) Syd,
E. INQUINANS (E. & Ev.) Theiss.,
E. PANDANI H. & P. Sydow,
E. PITTIERI Syd.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 199-203, 1960

(121)

A REEXAMINATION OF SOME SPECIES OF THE GENUS ACTINODOTHIS Syd. (*)

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

Some few species of Polystomellaceae are revised in this paper, all of them belonging to the genus **Actinodothis** Syd.

This genus **Actinodothis** appears here with the species **A. perrottetiae** Stev., **A. piperis** Syd. and **A. suttoniae** Stev.

ACTINODOTHIS Syd.
Type: **A. piperis**

F. L. Stevens — **in** Ann. Myc. XXV: 411, 1927
F. E. Clements & C. Shear — **in** The Genera of Fungi, pp. 98 e 298
C. G. Hansf. — **in** The foliicolous Ascomycetes their parasites and associated fungi, p. 24, 1946
Syd. — **in** Philipp. Journ. Sc. (C. Botany) vol. IX nº 2 (1914) p. 174
Theiss & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 254
Mildred E. Ragle — **in** Mycologia, vol. XXII: 312 and 313, 1930
L. Roger — **in** Phythopathologie des Pays Chauds, tome II, p. 1643
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 406 and 417 (1926)
Theiss & Syd. — **in** Ann. Myc. XV: 413 (1917)
Petrak — **in** Sydowia V: 434 (1951)
G. Arnaud — **in** Les Asterinées p. 97. Ann. École Nat. Agr. Montp. XVI, 1918

Stromata superficial, rounded, with a radiate context,

(*) Publicação nº 121

many-layered, 1-X loculated, hypostromata epidermic, multiple, hypothecium slender, fibrous, margins composed of radiate, branched and loose hyphae. Asci aparaphysate, 2-spored. Spores brown, 4-5-celled.

ACTINODOTHIS PERROTTETIAE Stev.

On **Perrottetia sandwicensis,** Hawaii — 1921

Walter Leroy Blain — **in** Mycologia, vol. XIX: 6 and 9, 1927
Mildred E. Ragle — **in** Mycologia, vol. XXII: 313 and 314, 1930
C. G. Hansford — **in** The foliicolous Ascomycetes their parasites and associated fungi.
F. L. Stevens — **in** Ann. Myc. XXV: 412, 1927
— **in** Bish. Museum Bull. 19: 51, 1925

Obs.: The type species of this fungus, n° 1055, of the Hawaiian Fungi Collection, collected by F. L. Stevens on **Perrottetiae sandwicensis,** at Waemea, 1921, which we had the opportunity of Michigan, is represented only by a slide where a stromatic fragment and a 4-celled ascospore are mounted.

ACTINODOTHIS PIPERIS Syd.

On leaves of **Piper sp.,** Philippines; on **Piper retrofractrum,** prov. Rizal (1915), Angat, prov. of Bulacan (1913), Philippines.



Fig. 1

ACTINODOTHIS PIPERIS Syd.

On a leaf of **Piper retrofactum**.

Orig.

Stromata epiphyllous, Fig. 1, sometimes hypophyllous, scattered, superficial, rounded, 1.5 — 3 mm diam., 120 — 140 u high, flat edges, carbonous, opaque, radiate context; locules connex, 1 — 15 in each stroma, 200 — 250 u diam., not confluent, not ostiolate, but finally open, minute; hypostromata in or sub-epidermic, little developed, filiform; hypothecium pale. Asci oval or oblong-oval, 2-spored, apa-



Fig. 2

ACTINODOTHIS PIPERIS Syd.

Ascostromata under a longitudinal cut.

Orig.

raphysate, 42 — 50 x 20 — 26 u; ascospores parallel, ellipsoid-oblong, 3-4-septate, slightly constricted, dark-brown, 33 — 40 x 12 — 15 u. Fig. 2.

G. Arnaud	— **in**	Les Asterinées, p. 239, 1918
Sacc.	— **in**	Syll. Fung. XXIV: 418, 1926
C. G. Hansford	— **in**	The foliicolous Ascomycetes their parasites and associated fungi, p. 32, 1946
Theiss & Syd.	— **in**	Ann. Myc. XIII: 255, 1915
Syd	— **in**	Philip. Journ. Sc. (C. Botany vol. IX n° 2 (1914) p. 174
Theiss & Syd.	— **in**	Ann. Myc. XV: 223, 1917
Syd. & Petrak	— **in**	Ann. Myc. XXIX: 218, 1930

EXAMINED MATERIAL:

Specimen without number, on **Piper retrofractum,** Angat, Province of Bulacan, Luzon, collected by M. Ramos, September, 1913, of the "Herbarium of The University of Califórnia" (Fungi of the Philippines) (type ?) , which was lent to us by the "University of Michigan".

Obs.: G. Arnaud (l. cit.) based on the description and figures of Winter, Gaillard, Sydow, etc. judges that **A. piperis** is equal with **Meliola asterinoides** Winter, both being then synonym of **Amazonia asterinoides** (Winter) Theiss. We do not know these original descriptions of Winter and Sydow but analysing their transcriptions contained in the Sylloge Fungorum and Ann. Mycol. we understand **M. asterinoides** and **A. piperis** as unrelated fungi, chiefly for the presence of hyphopodiate mycelium in **M. asterinoides** which lacks in **A. piperis.**

This character well defined in the illustration of P. Hennings (Hedw. 43: 361, 1904) for **M. asterinoides** var. **psychotriae** P. Henn. is confirmed by us through the examination of many samples of this fungus in focus.

Otherwise we have seen the ascostroma of **A. piperis** as containing 1 loculum to several locules and as fused perithecia as said in the hypothesis of Arnaud (l. cit.) .

ACTINODOTHIS SUTTONIAE Stev.

On **Suttonia lessertiana,** Hawaii. **S. kanaiensis,** Hawaii.

Free mycelium none.

Ascostromata rounded, black, hypophyllous, 1 — 2 mm in diam.; **upper wall** black-brown, carbonous, composed of radiate hyphae, hyphal cells 7,5 — 17 x 8,5 — 12,5 margins more or less denticulate; **hypostromata** poorly developed, multiple, epidermical; ostiole, locules and asci not observed; **ascospores** cylindrical-elliptic, 4-septated, brown, constrited at the septa, 55 — 60 x 22.5 — 24 u. Fig. 3.

Obs.: The material examined n° 1088 of the "Hawaiian Fungi Collection" collected by F. L. Stevens is scanty and immature but on the slide which comes with it presents a few well developed ascospores.

F. L. Stevens — **in** Bish Mus. Bull. 19: 51, 1925

C. G. Hansford — **in** The foliicolous Ascomycetes their parasites. and Associated fungi, 1946
F. L. Stevens — **in** Ann. Myc. XXV: 412, 1927

Fig. 3

ACTINODOTHIS SUTTONIAE Stev.

a) a longitudinal cut of the ascostroma;
b) margin of the superior wall of the ascostroma;
c) ascospores.

Orig.

RESUMO

São estudados neste trabalho os seguintes fungos Polystomellaceae, do gênero **ACTINODOTHIS:**

A. perrottetiae Stev., sôbre **Perrottetia sandwicensis,**

A. piperis Stev., sôbre **Piper spp., A. suttoniae** Stev., sôbre **Suttonia lessertiana** e **S. kranaiensis.**

RÉSUMÉ

Dans ce travail sont étudiés les champignons suivants: appartenant à la famille Polystomellaceae et au genre **Actinodothis:**

A. perrottetiae Stev. sur **Perrottetia sandwicensis,**
A. piperis Stev. sur **Piper sp., A. suttoniae** Stev. sur **Suttonia lessertiana** et **S. kranaiensis.**

Atas do IMUR
Ano I, págs. 205-219, 1960

A REDESCRIPTION OF A FEW SPECIES OF **DOTHIDASTEROMELLA** Höhnel, **HYSTEROSTOMELLA** Speg., **INOCYCLUS** Theiss. & Syd. and **LEPTODOTHIS** Theiss. & Syd.

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

This paper continues the series of **Polystomellaceae** revisions made at Instituto de Micologia, Universidade do Recife.

A new species of **Dothidasteromella — D. hansfordii** Bat. n. sp. is recognized over **Hakea ulucina.**

In the genus **Hysterostomella** Speg. are studied: **H. circinata** Speg., **H. guaranitica** Speg., **H. leptospila** (B. & C.) Höhnel, **H. oxyanthae** (Doidge) Doidge, **H. tetracerae** (Rud.) Höhnel under their imperfect stage, and **H. tetracerae** (Rud.) Höhnel var. **microspora** Bat. & Vital n. var.

The only species **I. psychotriae** (Syd.) Theiss. & Syd., is revised in the genus **Inocyclus** Theiss. & Syd. as well as **L. atramentaria** (B. & C.) Theiss. & Syd. in the genus **Leptodothis** Theiss. & Syd.

DOTHIDASTEROMELLA HANSFORDII Batista n. sp.

Sin.: **Thallochaete baileyi** (B. & Br.) Hansf.

> **in:** Proc. Linn. Soc. New South Wales, LXXXIX, parts 3-4: 104, 1954.

Plagulae black, amphigenous, circular, 1,5 — 3 mm. diam., sparsa vel confluent. Mycelium superficial, brown, not hyphopodiate, the hyphae being flexuose, irregularly branched, septate, constricted, with cells of 6 — 11 x 7 — 19 u. Mycelial setae numerous, brown, septate, slightly cons-

---

(*) Publicação nº 122



Fig. 1

DOTHIDASTEROMELLA HANSFORDII Bat. n. sp.

Ascostromata under a longitudinal section, showing hipostromata; mycelial setae are sur also over the ascostromata.

Orig.



Fig. 2

DOTHIDASTEROMELLA HANSFORDII Bat. n. sp.

a) ascostromata, mycelial sector and hyphae;

b) paraphysate ascus and ascospores.

Orig.

tricted, straight, erect, simple, 27 — 121 x 5 — 11 u. Internal mycelium subcuticular and epidermal the hyphae being composed of cylindrical and subglobose cells, 3,5 — 10 x 2,5 — 5,5 u, hyaline to brownish. Hypostroma central. Fig. 1, simple, cylindrical, columnar, beginning on the low wall of the ascostroma, brownish-black, 10 — 15 mm. diam., with cells of 5,5 — 8 x 5 — 6,5 u; sometimes the mycelial hyphae are developed in the cuticle of host. Ascostromata brownish-black, orbicular, superficial, Fig. 2, sparsa or confluent, astomous, 170 — 357 u diam., 48,5 — 70 u in height. The superior wall is subparenchymatic, 16 — 32,5 u thick, composed of rectangular cells, 4 — 7 x 3 — 6 u, radially disposed; the margins are right, having irregular cells, 22 x 11 u; the inferior wall is hyaline to subhyaline, sometimes gelatinous, and connected with the hypostroma.

Locule roundish, not numerous, 70 — 120 u diam. Asci basal, clavate, 2-tunicate, short pedicellate, 8-spored, 49 — 57,5 x 18,5 x 18.5 — 30 u. Paraphyses numerous, branched or not, septate, hyaline, 2 u diam. Ascospores oblong-clavate, brown, 1-septate, conglobate, constricted, 20 — 24 x 10 — 12 u, with a hyaline band or not.

On leaves of **Hakea ulucina, Meningie**, South Australia, Leg. D. Williams, 9-1956. Type, IMUR.

Obs.: This specimen has been offered to us through the courtesy of Dr. C. G. Hansford. It has been published under **Thallochaete baileyi** (B. & Br.) Hansf. (loc. cit.) as an evidente mistake.

Plagulae nigrae, amphigenae, circulares, 1,5-3 mm., sparsae vel confluentes. Mycelium superficiale, brunneum, setosum, haud hyphopodiatum, hyphas flexuosas, irregulariter ramosas, septatas, constrictas habentes, cum cellulis 6-11 x 7-19 u. Mycelii setae numerosae, brunneae, septatae, parum constrictae, rectae, erectae, simplices, 27-121 x 5-11 u. Mycelium internum sub-cuticulare atque epidermale hyphas habet ex cellulis cylindricis et sub-globosis, 3,5-10 x 2,5-5,5, hyalinis vel brunneis compositas. Hypostroma centrale, simplex, cylindricum, columnare, in ascostromatis pariete basali incipiens, brunneo-nigrum, 10-15 mm. diam., cum cellulis 5,5-8 x 5-6,5 u; aliquando, mycelii hyphae in hospitis cutícula increscunt. Ascostroma brunneo-nigrum, orbiculare, superficiale, sparsum vel confluens, astomum, 170-137 u diam., 48,5-70 u alt. Paries superior sub-parenchymaticus, 16-32,5 u cr., ex cellulis rectangularibus 4-7 x 3-6 u, radialiter dispositis, efformatus. Margines rectae sunt, cellulas irregulares habentes, 22 x 11 u; paries inferior hyalinus vel sub-hyalinus, aliquando gelatinosus et cum hypostromate connexus. Loculi rotundi non plures, 70-120 u diam. — Asci basales, clavati, 2-tunicati, curto-pedicellati, 8-spori, 49-57,5 x 18,5-30 u. Paraphyses abundantes, ramosae vel contra, septatae, hyalinae, 2 u diam. — Ascosporae oblongo-clavatae, brunneae, 1-septatae, conglobatae, cons-

trictae, 20-40 x 10-12 u, cum hyalina infula aut contra. In foliis **Hakeae ulucinae,** Meningie, Australiae meridionalis, Leg. L. D. Williams, 9/1956. Typus, I. M. U. R.

OBS: — Specimen hoc nobis a Doctore C. G. Hansford oblatum est. Errore evidenti tanquam **Tallochaete bayleyi** (B. & Br.) Hansf. editum fuit.

HYSTEROSTOMELLA Speg.
Type: **H. guaranitica** Speg.

Theiss. & Sydow — **in** Ann. Myc., XIII — 222 (1915).
Sacc. — **in** Syll. Fung., IX: 1098 (1891).
Speg. — **in** Fungi guaranitici, Pug. I — 133 (1883).
C. G. Hansford — **in** The Foliicolous ascomycetes, their parasites and associated fungi, p. 167 (1946).
C. Arnaud — **in** Les Astérinées, p. 97, 107 and 138 (1918).
L. Roger — **in** Phytopathologie des Pays Chauds, tome II, pp. 1272, 1271 and 1277 (1953).
Sacc. — **in** Syll. Fung., XXIV: 405. 1926.
Theiss. & Syd. — **in** Ann. Myc. XV: 409 (1917).
F. Moreau — **in** Les Champions, p. 1421 and 1435 (1953).
F. E. Clements & C. L. Shear — **in** The Genera of Fungi pp. 97 and 298, 1931.

Stromata slenderly crustaceous, radiate-contexed, hypostroma epidermical, multiple; locules linear, curved, disordered; asci aparaphysate, 8-spored; hypothecium brown; spores 1-septate, brown, free mycelium none.

HYSTEROSTOMELLA CIRCINATA Speg.

Sacc. — **in** Syll. Fung., IX: 1099 (1891)
Speg. — **in** Fungi Puig. I, n. 376, 1883.
Theiss and Sydow. — Ann. Myc., XIII — 226 (1915)

On leaves of undetermined plant, Apiahy, Brasil, 1881.

Stromata irregularly rounded, radiate, 3 — 6 mm. diam., crustaceous, black; hypostroma epidermal, multiple; ostiole somewhat circinate, rimose, 300 — 600 x 120 — 180 u; locules flexuous-linear, 500 — 1.000 x 150 — 250 u; asci pear-shaped, 60 — 70 x 40 — 50 u, aparaphysate; spores obovate, 1-septate, fuliginous, 34 — 40 x 16 — 20 u.

HYSTEROSTOMELLA GUARANITICA Speg.

Sacc. — **in** Syll. Fung. IX: 1098 (1891)
Speg. — **in** Fungi, Guar. Pug. I: 133 (1883)
Theiss. & Sydow — **in** Ann. Myc. XIII: 223 (1915)
v. Höhnel — **in** Frag. IX, n. 448, 1909.
v. Höhnel — **in** Frag. XII, n. 634, 1910

On live leaves of **Euphorbiaceae**, Mbatobi — Brasil

Free mycelium none. Stromata epiphyllous, superficial, irregularly rounded, 1,5 — 2 mm diam., black, smooth, dimidiate-scutate, membranous-leathery, indistinct and opaque context. Locules elliptic, sometimes confluent; ostiole hysterioid. Hypostroma epidermical, multiple. Asci ovate, 2-tunicate, 45 — 55 x 25 — 35 u, aparaphysate, 8-spored. Spores conglobate, ovate, 24 — 28 x 10 — 15 u, 1-septate, hyaline, then dark.

HYSTEROSTOMELLA LEPTOSPILA (B. & C.) v. Höhnel

Syn. **Rhytisma leptospilum** B. & C.
Marchalia leptospila (B. & C.) Sacc.

Theiss. and Sydow — **in** Ann. Myc. XIII — 223 (1915)
v. Höhnel — **in** Fragm. X nº 497, 1910.
B. and C. — Journ. Linn. Soc. p. 372, 1868.
Sacc. — **in** Syll. Fung. VIII: 737 (1889).

On leaves of **Lauraceae**, Cuba.

Stromata 1 — 2 mm diam. rounded, context-radiate hyphae 4 — 6 u wide, black, rimose; hypostromata brown multiple, epidermal; locules curved, conidia brown, 8 — 12 x 2 u; asci 85 x 10 u clavate or cylindraceous, aparaphysate; spores ellipsoid, 1-septate, 12 — 14 x 5 — 7 u, brown. Locules pycnidial disposed at the base, 100 — 250 u diam.

HYSTEROSTOMELLA OXYANTHAE (Doidge) Doidge

Doidge — **in** Bothalia IV: 870, 1948
Doidge — **in** Bothalia V: 198, 1950

Syn.: **Morenoella oxyanthae** Doidge

Doidge — **in**. Trans. Roy. Soc. S. África 8: 286, 1927

Hysterostomina oxyanthae Doidge

Doidge — **in** Bothalia II: 232, 1927

Free mycelium null.

Ascostromata amphigenous, isolate or confluent, roundish, flattened, up to 6 mm diam., black, membranous,



Fig. 3

HYSTEROSTOMELLA OXYANTHAE (Doidge) Doidge.

a) Ascostromata under a longitudinal cut;
b) detail of the margin;
c) ascospores.

Orig.

with rough surface, multiloculate; the superior wall is 7.5 — 15 u thick dark-brown, radiate, composed of hyphae 3 — 5 u diam.; the margins are entire; the inferior wall is

brownish, 5 — 9 u thick, with bad defined structure. The hypostroma is multiple and formed by masses of hyaline hyphae which goes into the mesophyllum as inter and intracellular mycelium. Locules lengthened, 375 — 600 u long, 37.5 — 50 u wide, irregularly disposed. Asci ellipsoid, or clavate, 8-spored, sessile, 2-tunicate, 25 — 32.5 x 12.5-15 u, aparaphysate. Ascospores ellipsoid to ovoidal, 1-septate, constricted with unequal cells, at first hyaline, then brown, polystichous, 12 — 16 x 3.5 — 5 u. Fig. 3.

On leaves of **Oxyanthus gerardi** — Mariepskop, Pilgrims Rest District, Twl. Leg. E. T. Scott, 26-5-943. Spec. nº 34040, Union of South Africa, Dep. Agr. Myc. Herb. associated with several Dematiaceae.

HYSTEROSTOMELLA TETRACERAE (Rud.) v. Höhnel

P. Henn	— **in**	Hedwigia, p. 390, 1904.
Hughes	— **in**	Fungi from The Gold Coast I, p. 41, 1952.
v. Höhnel	— **in**	Frag. XIII, nº 710, 1911.
----------	— **in**	Ann. Myc. IX: 170, 1911.
----------	— **in**	Frag. z. Mykol. IX, nº 465
C. G. Hansf.	— **in**	The foliicolous Ascomycetes their parasites and associated fungi, p. 170, 1946.
----------	— **in**	Fungus flora of Uganda, p. 45, 1940
Theiss. & Syd.	— **in**	Ann. Myc. XIII: 224, 1915
G. Arnaud	— **in**	Les Asterinées, p. 107, 1918.
H. & P. Syd.	— **in**	Ann. Myc. XV: 220, 1917.
F. Petrak	— **in**	Ann. Myc. XII: 224, 1915.
v. Höhnel	— **in**	Fragment zur Mykologie, nº 631, 1910.

Syn.: **Phacidium tetracerae** Rud.

Rud	— **in**	Linnaea, p. 118, 1829, p. 551, 1830.

Coccomyces tetracerae (Rud) Sacc.

Sacc.	— **in**	Syll. Fung. VIII: 748, 1889.

Harknessia tetracerae Ell. & Ev.

Ell. & Ev.	— **in**	Journ. of Mycol. X: 167, 1904.

The diagnosis is in accordance with
Theiss & Syd., loc. cit., 1915.

HYSTEROSTOMELLA TETRACERAE (Rud.) v. Höhnel, var. **MICROSPORA** Bat. & Vital n. var.

Free mycelium null.

Stromata amphigena, sparse, superficial, orbicular, free or confluent, 0,5 — 1,3 mm diam.,57 — 120 u in height, black, carbonaceous, opaque, with radiate margin where dark-brown hyphae, 2,5 — 3,5 u diam can be seen. The stromata are plurilocular, containing both pycnidial and ascigerous locule, the first one being ostiolate. The superior wall is compact and irregularly cracked; the inferior wall is dark-brown, 12 — 60 u thick, prosenchymatic, opaque, and connected at several points with an epidermal hypostroma, through narrow pillars of brown hyphae, 3,5 — 5 u diam.; the internal mycelium reaches the palissade parenchym. The ascigerous and pycnidial locules are 200 — 700 u diam., 45 — 75 u in height, being developed in a hyphal a mass; the ascigerous locules are infrequent while the pycnidial are common, some of them appearing as very small, 35 — 90 u in diam. Asci cylindric-clavate, 8-spored, 2-tunicate, sessile, 39 — 50 x 7,5 — 10 u, not paraphysate.

Ascospores slightly clavate, 1-septate, constricted, rough, brownish, 12,5 — 16 x 3,5 — 4,5 u. Pycnidiospores ovoid, continuous, dark-brown, sometimes with a hyaline band, numerous, 10 — 12,5 x 7 — 8 u; conidiophores obsolet. Fig. 4.

We have examined the spec. nº 3152, Herb. Mycologist. Dep. Agric. Uganda, on **Tetracera potatoria**, Entebbe Road, 3-1943, coll. by C. G. Hansford, which had only pycnostroma.

Many other specimens studied by us seemed to be sterile or to have exclusively the pycnidial stage.

In the smallest pycnidia the pycnidiospores are ellipsoid, brown, 6 — 7,5 x 2,5 — 3 u and the conidiophores grows up to 9 u long.

On leaves of **Davilla rugosa.** Jaboatão — Pern. A. Chaves Batista, 19-7-956. Type, 5686, Fig. 5, IMUR.

A typo recedit per ascos minores, 39-50 x 7,5-10 u et etiam per ascosporos minores, 12,5-16 x 3,5-4,5 u. Pycnidiis dualibus: **Poropeltis davillis** et **minoribus** cum pycnidiosporis 6-7,5 x 2,5-3 u.

Obs.: This variety is different from the type species only by few characteristics as minor asci and ascospores. It possesses pycnidia and pycnidiospores smallest than those attributed to the last fungus.

Fig. 4

HYSTEROSTOMELLA TETRACERAE (Rud.) v. Höhn. var. **microspora** Bat. & Vital n. var.

a) hystological cut of astroma with perithecial and pycnidial locules;
b) pycnidiospores;
c) asci;
d) ascospores.

Orig.



Fig. 5

HYSTEROSTOMELLA TETRACERAE (Rud.) v. Höhn. var. **microspora** Bat. & Vital n. var.

On a leaf of **Davilla rugosa** Poir.

INOCYCLUS Theiss. & Syd.

Theiss. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 211 (1915).
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV; 404 and 416 (1926).
Theiss. & Syd. — **in** Ann. Mycol., XV: 408, 1917.
F. E. Clements & C. L. Shear — **in** The Genera of Fungi, pp. 96 and 298, 1931.

Stromata superficial, with radiate context; hypostroma central; locule ring-like, from which arise radial and peripherical hyphae.

Asci aparaphysate, 8-spored. Spores brown, 2-celled.

INOCYCLUS PSYCHOTRIAE (Syd.) Theiss. & Syd.

Theiss. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 211, 1915.
..... — **in** Ann. Myc. XV: 220, 1917.
Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 416, 1926.

Syn.: **Hysterostomella psychotriae** Syd.

Syd. — Enum. Philipp. Fgi., I, (Philipp. Journ. of Sci. VIII: 275, 1913).

Dielsiella luzoniensis (Syd.) Hansf.

C. G. Hansf. — **in** The foliicolous Ascomycetes their parasites and associated fungi, p. 170, 1946.

On **Psychotria luzoniensis**, Luzon, Prov. Rizal, Antipolo (M. Ramos) fruiting unripe; prov. Laguna, Philippine.

Stromata hypophyllous, rounded, 0,5 — 1,25 mm diam., black, opaque, superficial, plane, membranous, fragmentary, generaly with a central little wart, the hymenium radiate extended, margins radiate composed of hyphae of 2 — 3 u wide; locules irregularly dehiscent; hypostromata central, 95 — 116 x 43 — 58 u, dark in correspondence to the cuticle and epiderm and hyaline in the mesophyll; asci clavate, subsessile, aparaphysate, 32 — 40 x 8 — 10 u, 8-spored; ascospores distichous, 1-septate, oblong, 9 — 12 x 3 — 4 u, turning blue, but young. Fig. 6.

Note: This species was considered as **Dielsiella** by Hansford (1946), loc. cit.) — **D. psychotriae** (Syd.) Hansf. because in



Fig. 6

INOCYCLUS PSYCHOTRIAE (Syd.) Theiss. & Syd.

a) histological cut of the ascostromata;
b) sector of the superior wall of the ascostromata;
c) ascus.

Orig.

the specimens examined, the radial cleft was not typical enough.

However, we are now finding this character well evident, through the examination of specimens on **Psichotria luzoniensis**, collected at Province of Bulacan, Luzon, Philipp. by M. Ramos, Sept. 1913, and loaned to us by The University of Michigan. In this material the characters of **Inocyclus** appears to be good, the ascostromata having numerous radial cleft, with radiate extensions of the hymenium, and asci aparaphysate.

So, we propose the acceptance of this species as **I. psychotriae** (Syd.) Theiss. & Syd.

LEPTODOTHIS ATRAMENTARIA (B. & C.) Theiss. & Syd.

Sacc. — **in** Syll. Fung. XXIV: 409, 1926
Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XII: 268, 1914
Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 248, 1915
Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XV: 412, 1917
G. Arnaud — **in** Les Asterinées, p. 143, d 208, 1918

Syn.: **Rhytisma atramentarium** B. & C.

B. & C. — **in** Cuba F. 716
Sacc. — **in** Syll. Fung. VIII: 756, 1889

Free mycelium null.

Stromata epiphyllous, crustaceous, irregular to roundish, 1.5 — 2 u diam. or lengthened, reaching 8 mm long. and 2 mm wide, black with flat surface. The superior wall is dark brown, 15 — 37.5 u in thickness and composed of polygonal cells, 2.5 — 5 u diam. around the ostiole and by radiate hyphae, 2.5 — 3.5 u wide the larger part of this wall; ostiole rounded, 3.5 — 7.5 u diam. The inferior wall was not seen in our material. Hypostroma multiple and formed by a mass of hyaline hyphae which goes into the epidermal and palisade tissues. Locules not well differentiated. Fig. 7.

Asci ellipsoid, 42 — 52 x 10 — 12 u, aparaphysate. Ascospores oblong, 1-septate, hyaline, 12 — 15 x 4 u.

On leaves of unknown host — Cuba, Leg. Wright. Mus. Bot. Stochkl. ex Herb. Syd.

Obs.: This specimen, apparently the type used by Theiss. & Sydow is too poor; therefore we made the mensurations of asci and ascospores which agree with those from the original description (loc. cit.).



Fig. 7

LEPTODOTHIS ATRAMENTARIA (B. & C.) Theiss & Syd.

a) Detail of the margin of the superior wall;
b) Stromata under longitudinal cut (unripe).

RESUMO

Nesta publicação são analisadas as seguintes espécies de **Polystomellaceae: HYSTEROSTOMELLA CIRCINATA** Speg. sôbre hospedeiro desconhecido, **H. GUARANITICA** Speg. sôbre **Euphorbiaceae, H. LEPTOSPILA** (B. & C.) Höhnel sôbre **Lauraceae,**

HYSTEROSTOMELLA OXYANTHAE (Doidge) Doidge, sôbre **Oxyanthus gerardum**

HYSTEROSTOMELLA TETRACERAE (Rud.) Hohnel — estudada sòmente no estado imperfeito de **Poropeltis,** sôbre **Davilla rugosa.**

HYSTEROSTOMELLA TETRACERAE var. **microspora** n. var., assinalada também sôbre **Davilla rugosa.**

INOCYCLUS PSYCHOTRIAE (Syd.) Theiss. & Syd. — sôbre **Psychotria luzonensis,** a qual revalidamos, em discrepância à conceituação de C. G. Hansford (loc. cit.),

LEPTODOTHIS ATRAMENTARIA (B. & C.) Theiss & Syd. — sôbre folhas de hospedeiro desconhecido e

DOTHIDASTEROMELLA HANSFORDII Bat. n. sp. sôbre **Hakea ulucina.**

RÉSUMÉ

Ces feuilles continuent une série de revisions dans la famille POLYSTOMELLACEAE faite à l'Instituto de Micologia, Universidade do Recife.

Une nouvelle espèce de **Dothidasteromella** — **D. hansfordii** Bat. n. sp. est reconnue sur **Hake ulucina.**

Dans le genre **Hysterostomella** Speg. sont étudiées: **H. circinata** Speg., **H. guaranitica** Speg., **H. leptospila** (B. & C.) **Hohnel H. oxyanthae** (Doidge) Doidge, **H. tetracerae** (Rud.) Höhnel à l'état imparfait, **H. tetracerae** (Rud.) Höhnel var. **microspora** Bat. & Vital n. var.

Dans le genre **Inocyclus** Theiss., une seule espèce **I. psychotriae** (Syd.) Theiss & Syd. a été revisée; pareillement dans le genre **Leptodothis** Theiss. & Syd., revisée seulement **Leptodothis atramentaria** (B. & C.) Theiss. & Syd.

HERB.

A. CHAVES BATISTA, H. SILVA-MAIA e MARIE L. FARR

(12)

NOVOS GÊNEROS E NOVAS ESPÉCIES DE FUNGOS ASTERINACEAE

SEPARATA DA
REVISTA DE BIOLOGIA
1 (3-4): 287-298
1958

REVISTA DE BIOLOGIA

REVISTA BRASILEIRA E PORTUGUESA DE BIOLOGIA EM GERAL

VOL. 1 — 1958 — N.º 3-4

ÍNDICE

1. R. W. G. Dennis — Some *Xylosphaeras* of tropical Africa 175
2. Mário de Carvalho — Experimentação algodoeira Resultados de alguns ensaios . . 209
3. Johanna Döbereiner e Alaides Puppim Ruschel — Uma nova espécie de *Beijerinckia* . 261
4. M. M. Ventura e R. Vieira da Cunha — Acessório para a densitometria direta de eletroforogramas sôbre papel 273
5. A. Chaves-Batista e A. F. Vital — Dois novos gêneros de fungos *Polystomellaceae* . . 280
6. A. Chaves-Batista, H. Silva-Maia e Marie L. Farr — Novos gêneros e novas espécies de fungos *Asterinaceae* 287
7. A. Chaves-Batista — Alguns *Dothideaceae* e *Phyllachoraceae* estudados em Pernambuco 299
8. K. Arens, M. G. Ferri e L. M. Coutinho — Papel do factor nutricional na economia d'água de plantas do *Cerrado* 313
9. A. Chaves-Batista e H. da Silva-Maia — Estudo iconográfico de alguns fungos *Valsaceae* e *Xylariaceae* 325
10. *Noticiário* 333

Os trabalhos deste Número foram escritos ou aceites, para publicar, por: J. Pinto-Lopes (1.), A. Quintanilha (2), H. C. Monteiro (3), M. Ventura (4), A. Chaves-Batista (5, 6, 7, 9), M. G. Ferri (8).

EDITORES

C. CHAGAS
INSTITUTO DE BIO-FISICA
AVENIDA PASTEUR, Nº 458
RIO DE JANEIRO

A. MACHADO
MUSEU DO DUNDO
LUNDA
ANGOLA

J. PINTO-LOPES
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA
DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

F. RESENDE
INSTITUTO BOTANICO
FACULDADE DE CIENCIAS
LISBOA

LISBOA·LOURENÇO MARQUES·LUNDA·RIO DE JANEIRO

NOVOS GÊNEROS E NOVAS ESPÉCIES DE FUNGOS ASTERINACEAE

por

A. CHAVES-BATISTA, H. SILVA-MAIA

e

MARIE L. FARR

Instituto de Micologia da Universidade do Recife — Brasil

Publicação N.º 123

(Recebido em Julho 16, 1958)

Reunem-se neste trabalho novas espécies de *Asterinema* (veja-se An. IV Congr. Nac. Bot. Brasil, 160, 1953) designadas como *A. glabratae*, *A. jahnii*, *A. philipinensis*.

Dois novos géneros *Asterinopeltis*, de hifopódios intercalares, nodais, com ascosporos contínuos, hialinos, e *Asterinotheca*, de ascostromas pluriloculares, com himênio múltiplo e ascosporos marron, 1-septados, também são descritos e tipificados, respectivamente sôbre *Asterinopeltis pulcherrima* Bat. & Maia e *Asterinotheca popowiae* Bat. & Maia.

ASTERINEMA GLABRATAE Batista et Maia, n. sp.

Plágulas epífilas, irregulares, marron-negras, até 10 mms de diam. *Micélio* não setoso, formado por hifas marron-negras, ramificadas alternadamente, em ângulos de 45.°, telemórficas; células hifais de $10 - 27{,}5 \times 5 - 6{,}2\,u$. *Hifopódios* sòmente unicelulares, capitados, unilaterais ou de disposição alterna, $8 - 12 \times 5 - 6{,}2\,u$. Fig. 1. *Ascostromas* plano-convexos, irregulares, confluentes, multiostiolados, raro isolados, marron-negros, de estrutura radiada e margens fimbriadas, $375 - 500\,u$ de diam., e $15 - 22{,}5\,u$ de altura; Fig. 2. parede superior de $7{,}5 - 15\,u$ de espessura constituida por células sub-globosas, de $8{,}5 - 12{,}5 \times 3{,}5 - 5\,u$, radialmente ordenadas em fileiras; ostíolo itregular, $37{,}5 - 47\,u$ de diam.; parede inferior indistinta. *Ascos* clavados, 2-tunicados, quadrisporos, curto-pedicelados, $57{,}5 - 75 \times 13{,}5 - 15\,u$, paráfises filiformes, hialinas, simples. *Ascosporos* oblongos, de células desiguais, episório glabro, hialinos, $12{,}5 - 17{,}5 \times 6 - 7\,5\,u$.

Sobre folhas vivas de *Casearia sp.*

Difere de *Asterinema casearíae* por ter sòmente hifopódios unicelulares, e esporos lisos.

Goiana, Leg. Severino J. da Silva, 15/9/55 — Tipo, 2941, Instituto de Micologia, Universidade do Recife.

ASTERINEMA JAHNII (Syd.) Bat., Maia & Farr. n. comb.

Sin.: *Calothyrium Jahnii* Syd.

In Ann. Mycol. XXVIII: 147, 1930

Colônias hipófilas, superficiais, efusas, recobrindo toda a folha.

Micélio recobrindo os ascostromas, marron, não setoso, hifopodiado, de hifas septadas, não constrictas, flexuosas, tendo células de $9{,}5 - 13 \times 1{,}3 - 1{,}6\,u$.

Hifopódios cilindro-clavados, $3{,}5 - 5 \times 2 - 3\,u$, unicelulares ou bicelulares.

Haustórios subcuticulares, não se estendendo à epiderme.

Ascostromas marron, superficiais, sob o micélio, circulares, $110 - 165 \times \times 94 - 135\,u$, semi-circulares ou elípticos, isolados ou confluentes, membranosos, ástomos, abrindo-se em fenda irregular; parede superior meandriforme-radiada, pseudo-parenquimática, constituída por células irregulares, que medem $1{,}7\text{-}3\,u$ de diam., e $6\text{-}11\,u$ de comprimento; membrana basal sub-hialina, de cerca de $3\,u$ de espessura. Fig. 3.

Ascos sub-globosos ou clavados, curtamente pedicelados ou sésseis, 8 esporos, 2-tunicados, $22\text{-}27 \times 12\text{-}15\,u$.

Parafisóides filiformes, hialinos, $1\text{-}1{,}5\,u$ de diam.

Ascosporos cilindráceo-fusóides, 1-septados, constrictos ou não, de células desiguais, polísticos, polos rotundos, $11\text{-}14{,}5 \times 2{,}7\text{-}4\,u$.

Sôbre folhas de *Miconia Ambigua* — El Limon, Veuezuela, Jan. 1928. Leg. H. Sydow. Tipo N.º 1207, F. Petrak, Mycotheca Generalis, cedido pelo Dr. Bohus Gábor, do Magyar Nemzetti Museum-Hungria.

Est *Asterinema* per mycelium hiphopodiatum et ascosporos hyalodydimos.

Obs.: Sydow (loc. cit) havia notado a presença das estruturas hifopodiais, mas não as contiderara como tais, ao afirmar «haud hyphopodiatum, raro tanto hinc inde ramulos usque $5\,u$ longos et $2\,u$ crassos breviter et anguste cylindraceos hyphopodia simulantes emittens».

ASTERINEMA PHILIPPINENSIS Bat. & Farr. n. sp.

Colônias rotundas, 2-5mms de diam., ou efusas, marron-negras.

Micélio formando retículo denso, superficial, tendo hifas marron, septadas, não constrictas, $3{,}5\text{-}4\,u$ de diam. e células de dimansões variáveis, não setoso.

Hifopódios alternos, laterais, contínuos, direitos ou recurvados, inteiros raros 2-lobados, irregularmente cilíndricos, $7{,}5\text{-}10 \times 4\text{-}5\,u$; hastórios epidermais, subglobosos ou oblongos.



Fig. 1 — ASTERINEMA GLABRATAE Batista et Maia n. sp.
a) sector do ascostroma.
b) hifas do micélio e hifopódios.
c) asco.
Orig.

Fig. 2 — ASTERINEMA GLABRATAE Batista et Maia n. sp.
Ascostroma e micélio.
200 x
Orig.

Ascostromas espalhados ou gregários, dimidiado-escutelares, 170-225 *u* de diam., 14-16,5 *u* de altura, a princípio pseudo-ostiolados, Fig. 4 *a*, depois de dehiscência estelar-irregular, Fig. 4 *b*, carbonáceos, membranosos, marron-negros; parede superior 3-4,5 *u* de espessura, estrutura radiada, constituida por células retangulares, 10-16×2-3,5 *u*; margens fimbriadas; parede basal marron-clara, tênue.

Ascos elipsoides, 8 esporos, 2-tunicados, 43-53×8-10 *u*; paráfises filiformes, contínuas; numerosas, 1,5-2 *u* de diam.

Ascosporos elipsoide-alongados, 1-septados, constrictos, gutulados, hialinos, 13,5-20×3,5-5 *u*. Fig. 5.

Sobre hospedeiro indet. Puerto Princesa, PALAWAN, Março, 1911, distribuído por A. D. E. ELMER, sob o n.º 12801, como *Asterina decipiens* Syd. Tipo, Botanischer Garten & Botanisches Museum der Universitat Zurich. Acha-se associado a *Asterina decipiens* Syd., *Asterostomella indecora* Syd. e *Parasterina grewiae* var. *granulosa* (Hansf.) BAT. & MAIA.



Fig. 4 – ASTERINEMA PHILIPPINENSIS BAT. & FARR.
a) Ascostroma ainda pseudoostiolado.
b) Ascostroma de dehiscência irregular, observando-se, ainda, a presença de ascos.

Plagulae rotundatae, 2-5mm diam. vel effusae, atro-brunneae. Mycelium dense reticulatum, ex hyphis septatis, non constrictis, 3,5-6 *u* diam., ex cellulis in dimensionibus variabilibus, brunneis, non setosis, compositum. Hypophodia alternata, lateralia, continua, integra vel 2-lobata, irregulariter cylindrica, 7,5-10×4-5 *u*; haustoria epidermalia, subglobosa vel oblonga. Ascostromata sparsa vel gregaria, dimidiato-scutata, 170-225 *u* diam., 14-16,5 *u* alt., atrobrunnea, primo pseudo ostiolata, dein stellatim vel irregulariter dehiscens; paries superior carbonaceus, 3-4,5 *u* cr., radiata, ex cellulis rectangularibus, 10-16×2-3,2 *u*; marginibus fimbriatis, paries basalis tenuis, brunnescens. Asci ellipsoidei, 8-spori, 2-tunicati, 43-53×8-10 *u*; paraphysibus filiformibus, continuis, numerosis, 1,5-2 *u* cr. Ascosporae, ellipsoide-elongatae, 1-septatae, constrictae, guttulatae, hyalinae, 13,5-20×3,5-5 *u*.



Fig. 3 — ASTERINEMA JAHNII (Syd.) Bat. & Maia & Farr
a) ascostroma e micélio;
b) hifopódios laterais sôbre o micélio;
c) ascos; *d*) ascosporos.
Orig



Fig. 5 – ASTERINEMA PHILIPPINENSIS Bat & Farr

a) Micélio hifopodiado;
b) Sector do ascostroma;
c) Asco parafisado;
d) Ascosporo;
e) Secção longitudinal de ascostroma jovem.

In foliis plantae ignotae. Puerto Princesa, PALAWAN, 5-1911.

A. D. E. ELMER, 1281. Typus, Botanischer Garten & Botanisches Museum der Universitat Zurich. Socii *Asterinae decipiens*, *Asterostomellae indecorae* Syd et *Parasterinae grewiae* var. granulosae (Hansf.) BAT. & MAIA.

ASTERINOPELTIS PULCHERRIMA BATISTA et MAIA n. sp.

Plágulas epífilas, dispersas, arredondadas, marron-negras, tênues, 1-3 mms. de diam., facilmente destacáveis. *Micélio* não setoso, de hifas marron-negras, de ramificações opostas, em ângulos de 45 70°, telemórficas, constituídas por células de 12-21 × 2-6 *u*. *Hifopódios* intercelulares, de distribuição irregular, integros, tìpicamente nodais, 5-7,5 × 5-6 *u*. *Ascostromas* orbiculares, convexo-dimidiados, marron-negros, não setosos, isolados ou confluentes, 130-215 *u* de diam. e 52,5-75 *u* de altura; parede superior radiada, 15-22,5 *u* de espessura, tendo células de 7,5-12,5 × × 2,5-5, arrumadas em fileiras; ostíolo redondo ou irregular, de 10-12,5 *u* de diam., central; margens fimbriadas; parede basal subhialina, indistinta. Ascos elipsoides, 37,5 × 22,5 *u*, octosporos, evanescentes; paráfises filiformes, hialinas, simples. Ascosporos clavado-fusoides ou cilindráceos, unicelulares, uni a plurigutulados, hialinos, 21,5-30 × 3-5,5. Fig. 6.

Sôbre folhas vivas de *Erythroxylum pulchrum*. Paulista, Pernambuco. Leg. SEVERINO JOSÉ DA SILVA, 15/9/55. Tipo 2940, Instituto de Micologia, Universidade do Recife.

Plagulæ epiphyllæ, dispersæ, astro-brunneæ, tenues, 1-3 mm. diam., rotundatæ. Mycelium ex hyphis atro-brunneis, non setosis, oposite-ramosis, (angulis 45°-75°) et cellulis 12-21 × 2-6 *u* compositum. Hyphopodia intecellularia, irregulariter dispersa, integra, nodulosa, 5-7,5 × 5-6 *u*. Ascostromata orbiculata, convexo dimidiata, atro-brunnea, non setosa, 130-215 *u* diam., 52,5-75 *u* alt.; paries superior radiatus, 15-22,5 *u* cr, ex cellulis 7,5-12,5 × 2,5-5 *u*; ostiolo centrali, rotundato, vel irregulari, 10-12 *u* diam.; marginibus fimbriatis; paries basalis subhyalinus, indistinctus. Asci ellipsoidei, 37,5 × 22,5 *u*, evanescentes, octospori; paraphysibus filiformibus, hyalinis, simplicibus. Sporæ clavato-fusoideæ vel cylindraceæ, 0-septatæ, uni vel pluri guttulatæ, hyalinæ, 21,5-30 × 3-5,5.

In foliis vivis *Erythroxylum pulchrum* -- Paulista. Ceg. SEVERINO JOSÉ DA SILVA, 15/9/55. Typus, 2940, Instituto de Micologia, Prov. Pernambuco, Brasiliæ, Amer. Austr.

ASTERINOTHECA BAT. & MAIA n. gen.

Tipo: *A. popowiae* nobis

Micélio superficial, marron-negro, reticulado, com hifopódios, não setoso.

Ascostromas orbiculares, escutelares, radiados, marron-negros, de dehiscência glebosa. Himênio múltiplo, em lojas ascígeras separadas.

Ascos 8-esporos, 2-tunicados, parafisados.

Ascosporos oblongos, 1-septados, marron-negros.

Fig 6 — ASTERINOPELTIS PULCHERRIMA Batista et Maia n. sp.
a) ascostroma.
b) micélio e hifopódios nodais, intercalares.
c) ascosporos. *Orig.*

Typus: *A. popowiae* nobis

Mycelium superficiale, astro-brunneum, recticulatum, hyphopodiatum, non setosum. Ascostromata orbiculata, scutata, atro-brunnea, radiata, dehiscentia glebosa.



Fig. 7 — ASTERINOTHECA POPOWIAE Bat. & Maia
Ascostromas exibindo dehiscência glebosa.

Hymenio multiplo, pluriloculato. Asci 8-spori, 2-tunicati, paraphysati. Ascosporae oblongae, 1-septatae, atrobrunneae.

ASTERINOTHECA POPOWIAE Bat. & Maia n. sp.

Plágulas epífilas, circulares a sub-circulares, carbonáceas, isoladas ou confluentes, de 2-4 mms de diam.

Micélio superficial, marron-negro, de hifas retilíneas, telemórficas, hifopodiadas, com ramificações opostas ou alternas, em ângulos de 45° e células hifais de 43-60 × 3-5 *u* larg. Fig. 8.

Hifopódios laterais, oblongos ou cilindráceos, contínuos, de disposição alterna ou oposta, 9-13,5 × 5,5-8 *u*.

Haustórios coraloides, hialinos, penetrando as células epiteliais, de 4-4,5 × × 4-5 *u*.



Fig. 8 — ASTERINOTHECA PODOWIAE Bat. & Maia n. sp.
a) micélio hifopodiado
b) sector do ascostroma
c) asco e paráfises
d) ascosporo.

Ascostromas orbiculares, plano-escutelares, 97-182 *u* diam, 40-48,5 *u* de alt., marron-negros, carbonáceos, isolados ou confluentes, de dehiscência glebosa, Fig. 7; parede superior de 11-13,5 *u* de espessura, formada por células retangulares, radialmente dispostas, 6,5-12,5 × 5-6,5 *u*; bordos franjados escassamente, com hifas não bifopodiadas, telemórficas, mais claras do que o micélio, e células de 14-25,5 ×



Eig. 9 – ASTERINOTHECA POPOWIAE Bat. & Maia n. sp.
a) Ascostroma sob secção longitudinal;
b) haustório epidermal.

5-6,5 *u*. Himênio múltiplo, plurilocular, cada lóculo separado por paredes verticais, de 3-5 *u* de diam.; membrana basal marron, de 3-8 *u* de diam. Fig. 9.

Aseos ovoides a sub-globosos, 2-tunicados, sésseis, 8-esporos, 2-tunicados, 48,5-54 × 27-30 *u*.

Paráfises filiformes, hialinas septadas, simples, 1,5-2,5 *u*.

Ascosporos oblongos, marron-negros, 1-septados, constrictos, lisos, conglobados, 21,5-24 × 11-14 *u*.

Sôbre folhas de *Popowia mabirensis* — Eutebbe Road-Leg. C. G. Hansford, 6/947. Tipo, 3015, Herb. Mycologist, Dep. Agric, Uganda.

Plagulae epiphyllae, rotundatae, carbonaceae, isolatae vel confluentes, 2-4 mm diam.

Mycelium superficiale, atro-brunneum, ex hyphis rectis, opposite vel alternatim ramosis in angulis 45°, ex cellulis 43-60 × 3-5 *u*, compositum. Hyphopodia lateralia, oblonga vel cylindracea, continua, alternata vel opposita, 9-13,5 × 5,5-8 *u*.

Haustoria epidermalia, caralloidea, 4-4,5 × 4-5 *u*.

Ascostromatibus orbicularibus, plano-scutatis, 97-182 *u* diam, 40-48,5 *u* alt, isolatis vel confluentibus, glebose-dehiscentibus; paries superior 11-13,5 *u* cr. ex cellulis rectangularibus, radiatus, 6,5-12,5 × 5-6,5 *u*; marginibus fimbriatis, ex hyphis haud hyphopodiatis, ex cellulis 14-25,5 × 5-6,5 *u*; hymenium multiplum, pluriloculatum, loculis separatis parietibus verticalibus, 3-5 *u* cr.; paries basalis 3-8 *u* cr., brunneus.

Asci ovoidei vel subglobosi, sessiles, 8-spori, 2-tunicati, 48,5-54 × 27-30 *u*. Paraphysibus filiformibus, simplicibus, septatis, hyalinis, 1,5-2,5 *u* cr. Ascosporae oblongae, 1-septatae, constrictae, leves, atro-brunneae, conglobatae, 21,5-24 × 11-14 *u*.

In foliis *Popowiæ mabirensis*. Eutebbe Road, Leg, C. G. Hansford, 6/947. Typus, 3015, Herb. Mycologist, Dep. Agr.

ABSTRACT

In this report three new species of *Asterinema, A. glabratae, A. jahnii,* and *A. philippinensis*, are added to those described previously (An. IV. Cong. Nac. Soc. Bot., Brasil, 160, 1953).

Two new genera are also described: *Asterinopeltis*, having intercalary and nodal hyphopodia and hyaline, non-septate ascospores; and *Asterinotheca*, possessing plurilocular ascostromata, multiple hymenium, and one-septate, dark brown, constricted, ascospores.

Their type species are *Asterinopeltis pulcherrima* Bat. & Maia and *Asterinotheca popowiae* Bat. & Maia, respectively.

REVISTA DE BIOLOGIA

A *Revista de Biologia* é uma revista internacional que aceita, para publicação, trabalhos, cujo conteúdo represente progresso na resolução de problemas respeitantes a qualquer ramo da biologia. Trabalhos de compilação só poderão ser aceites se apresentarem pontos de vista novos, ou contribuírem pelo seu aspecto crítico (mas nunca polémico), para o estímulo da investigação.

Só excepcionalmente serão aceites trabalhos contendo mais do que 50 páginas, incluíndo figuras. As figuras serão limitadas ao mínimo indispensável. Todos os Autores do Ultramar devem reter cópia do manuscrito. As provas são enviadas por avião não acompanhadas do original, que será remetido junto com as separatas.

O Autor, ou Autores, de cada trabalho recebem 50 exemplares grátis. Emendas feitas nas provas, além dos erros tipográficos, serão onerados aos Autores.

Os originais serão enviados a qualquer dos redactores ou editores que os poderão aceitar sem alterações, ou propor alterações sem as quais o trabalho não poderá ser impresso.

Para a secção *Noticiário* aceitam-se de bom grado críticas de livros e principalmente de grupos de trabalhos, cuja articulação em conjunto contribua para a clareza na compreensão dos problemas em causa, auxiliando assim a sua resolução. Referência sucinta a acontecimentos (viagens, descobertas, falecimentos, etc.), que interessam à biologia serão também insertos nesta secção.

*

* *

This is an international journal publishing work in any branch of the biological sciences. Reviews will only be accepted if they present a new approach or may stimulate further research by their critical (but not controversial) nature.

As a rule, papers should not exceed 50 pages, including plates, and these must be reduced to a minimum.

Overseas contributors should keep a copy of their original manuscript as this will not accompany the air-mailed galley proofs; the manuscripts will be returned with the reprints. Contributors are entitled to 50 reprints free of cost. Authors are asked to reduce corrections in the proof to typographical errors; excessive corrections will be charged to the authors.

Manuscripts submitted to the editors may be subject to alterations before being accepted for publication.

The section of *notices* will gladly accept reviews on books and especially on groups of related papers whose combined results provide a clearer insight of the problem under review. Brief notes on expeditions, discoveries, etc. of biological interest may also be included in this section.

COMPOSTO E IMPRESSO NA TIPOGRAFIA MATEMÁTICA, LDA. — RUA DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 134, 1.º, ESQ. — TELEF. 29449 — LISBOA

FASCÍCULO ENCERRADO
EM 27-12-1958

ESTA REVISTA É MANTIDA PELA RUBRICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS INSTITUTOS BOTÂNICO DE LISBOA E DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE MOÇAMBIQUE

Atas do IMUR
Ano I, págs. 221-227, 1960

DOIS NOVOS GÊNEROS DE FUNGOS MELIOLACEAE (*)

A. CHAVES BATISTA
H. S. MAIA

No presente trabalho, os A. A. estudam dois novos gêneros de fungos **Meliolaceae.**

Artallendea é proposto para conter fungos de micélio hifopodiado, não setoso e cleistotécios subglobosos, glabros, com ascosporos contínuos, fuscos, tendo como tipo **A. cinnamomi.**

Laeviomeliola é sugerido para os fungos também de micélio hifopodiado, não setoso, cleistotécios globosos, glabros, mas de ascos parafisados, com ascosporos feofragmos, sendo o tipo **L. psidii.**

Fam. **MELIOLACEAE**

ARTALLENDEA Bat. & Maia, n. gen.

Tipo — **A. cinnamomi** nobis, n. sp.

Micélio superficial, marron, reticulado, não setoso, hifopodiado.

Cleistotécios hemisféricos a subglobosos, carbonáceos, marron-negros, glabros, verrugosos ou não, ástomos.

Ascos 1-tunicados, parafisados.

Ascosporos elipsoides a cilindráceos, contínuos, fuscos.

Typus — **A. cinnamoni nobis,** s. sp.
Mycelio libero brunneo, reticulato, non setoso sed hyphopodiato. Cleistothecia hemisphaerica vel subglobosa, carbonacea, glabrata, verrucosa vel non, astroma, efformata. Asci 1-tunicati, paraphysati. Ascosporae ellipsoideae vel cylindraceae, continuae, fuscae.

OBS: — O nome genérico é dado em homenagem ao Micólogo Dr. R. C. Artagaveytia-Allende, da Faculdade de Humanidades e

(*) Publicação nº 124

Ciências do Uruguai, infatigável pesquisador dos fungos leveduriformes.

ARTALLENDEA CINNAMOMI Bat. & Maia, n. sp.

Plagulas epífilas, circulares a sub-circulares, marron-negras, carbonáceas, isoladas ou confluentes, de 2 — 5 mm de diam.



Fig. 1

ARTALLENDEA CINNAMOMI Bat. & Maia n. sp.

a) micélio hifopodiado;
b) asco parafisado;
c) ascosporo.

Micélio superficial, não setoso, telemórfico, hifopodiado, reticulado, marron-negro, de hifas retilíneas, ramificadas oposta e alternadamente em ângulos de 45°, tendo células de 11 — 27 x 5 — 8 u.

Hifopódios laterais, 2-celulares, retos ou recurvados, capitados, célula basal cilindrácea e célula apical oblonga a subglobosa, 3-multi-lobada, 16 — 19 x 8 — 12 u. Fig. 1-a.

Haustórios hialinos, coraloides, colonizando o tecido epitelial, 8 — 10 x 5 — 6 u.

Sig. 2

ARTALLENDEA CINNAMONI Bat. & Maia n. sp.

Secção longitudinal do cleistotécio.

Cleistotécios dispersos ou gregários, hemisféricos ou subglobosos 190 — 250 x 180 — 210 u, marron-negros, Fig. 2, uniloculares, pseudo parenquimáticos, tendo paredes de, 27 — 40 u de diam., formadas por 3 camadas de células poligonais, 10 — 13.5 x 8 — 10 u, glabros, porém dotados de verrugas conoides, uni-celulares, de 13.5-19 — 13 — 16 u, ástomos, de dehiscência irregular.

Ascos elipsoides, ovoides ou subglobosos, tunicados, sésseis, 4 esporos, parafisados, evanescentes à maturidade, 48 — 54 x 30 — 45 u. Fig. 1-b.

Paráfises filiformes, septadas, hialinas, simples ou ramificadas, 0.5 — 1.5 u.

Ascosporos a princípio hialinos, depois fuscos, panduriformes, contínuos, lisos, levemente constrictos na porção mediana, 37 — 42 x 10 — 12 u. Fig. 1-c.

Sôbre folhas de **Cinnamomum pedunculatum** Ness. Leg. Kohei Onuma, 20-11-906 Mussasi, Komaba, Tokyo, Japão. Tipo, ex von Herrn Dr. Paravicini, sob o nome de **Asterina sepulta** Berk. & Curt, no Herb. Mus. Bot. Univ. de Zurich.

Plagulae epiphyllae, rotundatae, atro-brunneae, carbonaceae, simplices vel confluentes, 2-5 mm efformatae. Mycelium superficiale, non setosum, reticulatum, ex hyphis atro-brunneis, rectis, opposita et alternatim ramosis in angulis 45.°, ex cellulis 11-27 x 5-8 u, compositum. Hyphopodia lateralia, 2-cellularia, recta vel incurvata, capitata, cellula basalis cylindrica et cellula apicalis oblonga vel subglobosa, 3 vel multi-lobata, 16-19 x 8-12 u. Haustoria epidermalis, coralloidea, 8-10 x 5-6 u. Cleistothecia sparsa vel gregaria, hemisphaerica vel subglobosa, 190-250 x 180-210 u, atro-brunnea, uniloculata; parietibus pseudo-parenchymaticis ,27-40 u cr., 3-stratosis, ex cellulis polygonalibus, 10-13.5 x 8-10 u; superficie glabrata, sed verrucosa, cum cellula conoidea, continua, 13.5-19 x 13-16 u, astroma, efformata. Asci ellipsoidei, ovoidei vel subglobosi, 1-tunicati, sessiles, 4-spori, evanescentes ad maturitatem, 48-54 x 30-45 u. Paraphysibus filiformes, septatis, simplices vel ramosis, 0,5-1,5 u cr. Ascosporae panduriformiae, continuae, non caudatae, constrictae area meSdiana, primo hyalinae dein fuscae, 37-42 x 10-12 uu. In foliis **Cinnamomi pedunculati** Nees. Leg. Kohei Onuma, 20.11.906, Musasi, Komaba, Tokyo, Japão. Typus, ex von Herrn. Dr. Paravicini, sub **Asterinae sepultae** Berk. & Curt. in Herb Mus. Bot. Univ. Zurich.

LAEVIOMELIOLA Bat. n. gen.

Tipo — **L. psidii** Bat. n. sp.

Micélio marron-negro, com hifopódios capitados e mucronados, setoso; Cleistotécios globosos, glabros, marron-negros. Ascos parafisados; Ascosporos marron-negros, X-transverso-septados.

Typus — **L. psidii** Bat. n. sp.

Mycelium atro — brunneum, hyphodiis capitatis et mucronatis, setosis, compositum. Cleistothecia globosa, glabra, atro — brunnea. Asci paraphysati. Ascosporae atrobrunneae, X — transversaliter septatae.

Est **Leptomeliola** v. Höhn. sed cleistotheciis glabratis.

LAEVIOMELIOLA PSIDII Bat. n. sp.

Plágulas hipófilas, marron-negras, membranosas, isoladas ou confluentes, circulares a subcirculares, 2 — 10 mm de diam.

Micélio superficial reticulado, marron-claro, setoso, hifopodiado, telemórfico, de hifas subretilíneas, com ramificações opostas, alternas e laterais, regulares, e células hifais de 16 — 29,5 x 5,5 — 8 u. Hifopódios capitados, oblongos ou claviformes, alternos, raramente opostos, erectos ou antrorso-encurvados, 2-celulares, 13,5 — 24,5 x 8 — 13,5 u; célula basal conóide;

Hifopódios mucronados, alternos, erectos ou encurvados, ampuliformes, de 19 — 21,5 x 6,5 — 8 u. Setas miceliais cilindráceas, alongadas, marron-negras, simples, não constrictas, 3 a 7 septadas, erectas, de ápice agudo 190 — 315 x 6 — 9,5 u.

Cleistotécios globosos, glabros, superficiais, isolados ou confluentes, marron-negros, sésseis, ligeiramente verrugosos, 145 — 195 u de diam.; sub-parenquimáticos, de paredes formadas por células poligonais e subglobosas, 11 — 16 x 5,5 — 11 u. Fig. 3.

Ascos elipsóides a subglobosos, 1-tunicados, sésseis, 2-esporos, 60 — 75,5 x 19 — 30 u, polo basal agudo. Parafises simples ou ramificadas, hialinas, septadas, 1,5 u de diam.

Ascosporos fusoides, 4-septados, constrictos, lisos, marron, 40 — 51,5 x 14 — 19 u.

Sôbre folhas de **Psidium guajavae** Raddi, Caruaru, Pernambuco, Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 9-3-1958. Tipo 12749, IMUR.

Plagulae hypophyllae, atro-brunneae, membranosae, simplices vel confluentes, rotundatae, 2-10 mm. diam. Mycelium superficiale, reticulatum, brunnescens, ex hyphis opposite, alternatim vel lateraliter ramosis, ex cellulis 16-29,5 x 5,5-8 u, compositum. Hyphopodia capitata 2-cellularia, cellula basalis conoidea, cellula apicalis oblonga vel claviformis, alternata, raro opposita, erecta vel antrorso-incurvata, 13,5-24,5 x 8-13,5 u.

Hyphopodia mucronata, alternata, erecta vel incurvata, ampuliformia, 19-21,5 x 6,5-8 u. Setae myceliales cylindricae simplices, acutae, atro-brunneae, 3-7 septatae, haud constrictae, 190-315 x 6-9,5 u. Cleistothecia globosa, glabrata, parve verrucosa, 145-195 u diam., atro-brunnea, sessilia; parietibus membranosis, subparenchymaticis, ex cellulis polygonalibus vel subglobosis, 11-16 x 5,5-11 u, efformata. Asci ellipsoidei vel subglobosi, 1-tunicati, sessiles, 2-spori, 60-75,5 x 19-30 u., paraphysibus filiformibus, simplicibus vel ramosis, hyalinis, septatis, 1,5 u diam. Ascosporae cylindraceae sed polo basali acutae, 4-septatae, constrictae, leviae, brunneae, 40-51,5 x 14-19 u.



Fig. 3

LAEVIOMELIOLA PSIDII Bat. n. sp.

a) Cleistotécio, micélio hifopodiado e seta do micélio;
b) Ascos parafisados;
c) Ascosporos.

Orig.

In foliis **PSIDII GUAJAVAE.** Raddi. Caruaru, Pernambuco. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 9.3.1958. Typus 12749, IMUR.

ABSTRACT

The A. A. are proposing tow new genera on the family Meliolaceae, named **ARTALLENDEA,** with mycelium not setose, subglobose and glabrous, cleistothecia and ascospores continuous and fuscous, and **LAEVIOMELIOLA,** with mycelium equally not setose, cleistothecia globose and glabrous, asci paraphysate and ascospores transversally septate.

For the genus **ARTALLENDEA** the type is **A. CINNAMOMI** while for **LAEVIOMELIOLA** it is **L. PSIDII** the first one collected at Tokyo, Japan, and the second found at Pernambuco, Brazil.

RÉSUMÉ

Les auteurs proposent deux nouveaux genres dans la famille MELIOLOCEAE: **ARTALLENDEA,** avec mycélium continu, cleistothèces subgloboses et glabres avec ascospores continues et brunes ainsi que **LAEVIOMELIOLA** avec mycélium continu, cleistothèces globoses et glabres; asques paraphysées et ascospores cloisonnés transversallement. Quant au genre **ARTALLENDEA,** le type est **A. Cinnamomi,** tandis que pour **LAEVIOMELIOLA** C'est **L. psidii,** le premier collecté en Tokyo, Japon et le second trouvé en Pernambouc, Brésil.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 229-233, 1960

REVALIDATION OF THE GENUS LASIOSTEMMA THEISS. & SYD. OF THE FAMILY PARODIOPSIDACEAE (*)

A. CHAVES BATISTA
M. LEONORE FARR

The genus **Lasiostemma** is listed as a synonym of **Dimeriella** by Ainsworth and Bisby (1954) on the authority of Hansford (1946). According to this investigator, the long, stranded, radiating setae characterizing the ascocarps of **Lasiostemma** are "merely an extreme development of those of other species of **Dimeriella**" and he therefore considers it unnecessary to maintain the former genus. Later, however, **Lasiostemma** was recognized and emended by Petrak (1950), and Toro (1952) placed it in the family Parodiopsidaceae.

Dimeriella was created by Spegazzini (1908) as a segregate of **Dimerosporium** and included eight species with setose, subglobose, astomous ascocarps and hyaline spores. Upon finding that these original species were a mixture representing several other genera, Theissen and Sydow (1917) selected a new type for the genus, which later turned out to have brown ascospores and, therefore, did not fit the generic concept. They also transferred **Dimeriella** from the them accepted Perisporiales to the Pseudosphaeriaceae. Toro rejects the genus **Dimeriella** and replaces it with one of the early species which had become assigned to **Lasiostemma,** and had characteristics corresponding to those described by Theissen and Sydow for **Dimeriella.** In agreement with these authores, Toro classifies this fungus — **L. melioloides** (B. & C.) Th. & Syd. — in the Pseudosphaeriales, but places the genus into a new family, Parodiopsidaceae, which includes mainly Arnaud's (1920, quoted by Toro) tribe Paradiopsideae.

The systematic position of this genus is here revali-

(*) Publicação nº 125

dated on the basis of its structural characteristics, as revealed by the study of several Canadian collections of **L. merrillii** Syd., labelled as **Dimerosporium tsugae** Dearn. or **D. abietis** Dearn.

Dimerosporium, according to Ainsworth and Bisby, is a synonym of **Asterina**, but certain characteristics of **D. tsugae** and **D. abietis**, as given in the descriptions of these species, (Mycologia 16: 153 and 18: 243, respectively) and exhibited by the material studied, bar them from the family Asterinaceae. These characteristics are the exhyphopodiate mycelium and the globose, non-radiate ascocarps; the non-constricted, hyaline ascospores exclude them from **Asterina**.

The setose, superficial pseudoperithecia and hyaline, two-celled ascospores are those of **Lasiostemma**; the mycelium clearly features characteristics of the Parodiopsidaceae, such as stomopodia, conidiophores, and acid-soluble pigment. The authors, therefore, agree with Toro in considering **Lasiostemma** a valid genus of that family.

LASIOSTEMMA MERRILLII Syd.

Mycelium: Superficial, consisting of irregularly branching, telemorphic hyphae, wavy in outline, sometimes of several parallel strands and forming a network 2 — 4 u diam., brown, indistinctly septate, stomopodia rare, 8 — 14 by 4 — 5 u, conidiophores 25 — 30 u long, rare; conidia not seen.

Ascocarps: Globose, 110 — 170 u diam., densely to loosely clustered on lower leaf surface, dark brown, carbonaceous, pseudo-ostiolate, with aseptate or one-septate setae in the upper hemisphere; perithecial wall 17 — 30 u wide, made up of thick-walled, irregularly polygonal cells, 7 — 13 u diam.

Asci: Cylindrical, ellipsoid, or clavate, bitunicate, 8-spored, aparaphysate, 40 — 75 by 15 — 20 u.

Ascospores: Fusiform-ellipsoid, hyaline, 2-celled, not constricted at the septum, 25 — 33 by 5 — 7 u, cells subequal, Figs. 1 and 2.

On leaves of **Abies grandis**, associated with **Parasterina sp.** at Road Island, B. C. Canada. K. W. Robertson & Alexander 23-6-55. Spec. nº 13441, Inst. Mycology Univ. Recife, and at Forest Pathology Laboratory, Science Service, Dept. Agric. Canada, D.A.V.F.P. 9471, as **Dimerosporium abietis** Dearn. We have identified this same fungus on the following

hosts; **Tsuga heterophylla**, coll. at Ladysmtih, V. I., B. C. at Mt. Brenton 42, by W. A. Porter, 5-8-954. DAVFP 9304, ex Science Service, Dept. Agric. Canada.

Tsuga heterophylla, coll. at Youbu, V. I., B. C. Canada, E. G. Harvey, 16-6-55. Spec. n° 13477, IMUR ex Science Service, Dept. Agric. Canada, DAVFP 9560.



Fig. 1

LASIOSTEMMA MERRILLII Syd.

a) Simple hyphae;
b) hyphae with stomopodia;
c) setose perithecia;
d) ascus;
e) ascospores.

Tsuga heterophylla coll. at Terrace, B. C. Canada, W. G. Ziller, 3-7-50, n° 13448, IMUR, ex Science Service, Dept. Agric. Canada, DAVFP 5984.

The specimens which we examined agree in general with



Fig. 2

LASIOSTEMMA MERRILLII Syd.

a) mycelium;
b) setose perithecia;
c) ascus;
d) ascosporos.

the description of **L. merrillii** Syd.; the setae, however, are shorter and norrower than the measurements given in the original description, and the asci slightly longer and narrower. The original description does not mention stomopodia

or conidiophores, both of which are present in the material examined.

BIBLIOGRAPHY

AINSWORTH, G. C., and G. R. Bisby. 1954. A Dictionary if the Fungi. 4 th ed. Commonwealth Mycol. Inst., Kew, Surrey, England.

HANSFORD, C. G. 1946. The Foliicolous Ascomycetes, Their Parasites and Associated Fungi. Imp. Mycol. Inst. Mycol. Pap. No. 15. Uganda.

PETRAK, F. Sydowia 4:379. 1950.

SPEGAZZINI, C. 1908. Fungi Aliquot Paulistani. Rev. Mus. de La Plata 15: (2.a série tomo II, 7-48).

THEISSEN, and H. Sydow, Ann. Myc. 15. 1917.

TORO, R. A. 1952. A Study of the Tropical American Black-Mildews. Jour. Agr., Univ. Puerti Rico 36:24-87.

RESUMO

Os A. A. propõem a revalidação do gênero **LASIOSTEMMA** Theiss. & Syd. como integrante da família Parodiopsidaceae, por ser dotado de estomopódios, além dos demais caracteres próprios dessa família. **L. MERRILII** Syd. é reestudado sôbre diferentes amostras, coletadas no Canadá e que haviam sido identificadas como **DIMEROSPORIUM SPP.**

Ao Dr. WOLF G. ZILLER, do Forest Biology Laboratory, Canadá, são consignados os melhores agradecimentos dos A. A. pela doação de 15 especimens de **D. MERRILII.**

RÉSUMÉ

Les auteurs proposent la revalidation du genre **LASIOSTEMMA** Theiss. & Syd., comme intégrant de la famille Parodiopsidaceae, car il possède d'estomopodes en outre des caractères propres de cette famille. **L. merrilii** Syd. est re-étudié sur différents échantillons collectés au Canadá, lesquelles avaint été identifiés comme **Dimerosporium sp.**

Les AA. envoyent un grand merci au Dr. Wolf Ziller du Forest Biology Laboratory, Canadá, pour la donation de 15 especimens de **D. merrillii.**

1959

INSTITUTO DE MICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO RECIFE
(Publicação n. 126)

A. CHAVES BATISTA & GENEROSA E. P. PERES

Polypedia, um novo gênero de fungos Polystomellopsidaceae

(COM 1 FIGURA NO TEXTO)

FORLI
TIPOGRAFIA VALBONESI
1959

INSTITUTO DE MICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO RECIFE
(Publicação n. 126)

A. CHAVES BATISTA & GENEROSA E. P. PERES

Polypedia, um novo gênero de fungos Polystomellopsidaceae

(COM 1 FIGURA NO TEXTO)

Em prosseguimento aos trabalhos de revisão de antigos grupos de fungos, os A.A. reconhecem a validade de família *Polystomellopsidaceae*, proposta por ARNAUD, em 1918, cujas características serão ampliadas, nas suas linhas gerais, entretanto, oportunamente.

Um novo gênero, *Polypedia*, tendo *P. leopoldinensis* como tipo, é proposto, agora, nessa família, para os fungos de picnostroma superficial, destituidos de micélio livre, escutelar-dimidiados, radiantes, com lóculos férteis ao redor de área central estéril, hipostroma central múltiplo e picnidiosporos sésseis, contínuos, hialinos.

POLYPEDIA Bat. & Peres n. gen.

Tipo: *P. leopoldinensis* nobis

Micélio livre ausente. Picnostromas superficiais, escutelar-dimidiados, marron-negros, radiantes, pseudo-parenquimáticos, ástomos, área central compacta, estéril, e numerosos lóculos circundantes, de himênio todo fertil. Hipostroma central múltiplo, colunar, epidermal a mesofílico. Picnidiosporos sésseis, elipsoides, ovóides, contínuos, hialinos.

Typus: *Polypedia leopoldinensis* Bat. & Peres n. sp.

Pycnostromata superficialia, scutato-dimidiata, atro-brunnea, radiata pseudo-parenchymatica, astoma; area centralis sterilis, compacta, loculis plurimis circumdata, toto fertilis, efformata. Hypostromata centralia multipla, columnata, epidermalia vel mesophyllica, brunnea. Pycnidiosporae sessiles, ellipsoideae, subglobosae vel ovoideae, continuae, hyalinae.

POLYPEDIA LEOPOLDINENSIS Bat. & Peres n. sp.

Micélio livre ausente. Picnostromas anfígenos, superficiais, escutelar-dimidiados, de margens onduladas até crenuladas, 665-1.100 μ de diam., 90-115 μ de alt. marron-negros, ástomos, dispersos; parede superior radiante, 13-35 μ de espessura, pseudo-parenquimática, formada por células retangulares de 6,5-18 × 2-4 μ, nos bordos, e células poligonais na região central, de 4,5-10 × 2,5-6,5 μ; parede basal tênue, sub-hialina. Lóculos de himênio fértil em toda a cavidade, numerosos, elipsoides, 67-165 × 21,5-90 μ, circundando a área central, que é compacta, estéril. Hipostroma central, múltiplo, em 2 ou mais colunas, marron-negras, pseudo-parenquimáticas, 32-50 × 13,5-27 μ, destacando-se células retangulares de 6,5-7,5 × 3-4,5 μ; tais colunas limitam-se à epiderme, raramente chegando ao mesófilo, e delas deriva o micélio interno, subhialino, inter e intracelular, que se difunde no mesófilo.

Picnidiosporos numerosos, sésseis, elipsoides ou ovoides, contínuos, hialinos, 3-10 × 2-4 μ. Sôbre folhas coriáceas de planta desconhecida. São Leopoldo, Rio Grande do Sul, 1908, distribuido sob n. 250, Rick, Fungi austro-americani, como *Scolecopeltis theissenii* Rick. Tipo, no Herb. do Inst. e Orto Bot. dell'Univ. Padova.

Mycelium liberum nullum. Pycnostromata amphigena, superficialia, scutato-dimidiata, marginibus undulatis vel crenatis, 665-1.100 μ diam., 90-115 μ alt., atro-brunnea, astoma, sparsa; pariete superiore radianti 13-21 μ cr., pseudo parenchymatica, ex cellulis rectangularibus in area marginali, 6.5-18 × 2-4 μ, et polygonalibus in area centrali, 4.5-10 × 2.5-6.5 μ efformata; pariete basali tenui, subhyalina. Hypostromata centralia, multipla, in 2 vel plurimis columnis atro-brunneis, pseudo-parenchymaticis, 32-50 × 13.5-27 μ, ex hyphis rectangularibus 6.5-7.5 × 3-4.5 μ, efformata; hae columnae tantum epidermales, raro penetrantes usque mesophyllum. Loculi plurimi, numerosi, ellipsoidei, 67-165 × 21.5-90 μ; area centralis compacta, sterilis. Pycnidiosporae numerosae, sessiles, ellipsoideae vel ovoideae, continuae, hyalinae, 3-10 × 2-4 μ.

In foliis coriaceis, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil, 1908. Typus ex Rick, Fungi austro-americani, sub *Scolecopeltis theissenii* Rick, in Herb. Inst. Orto Bot. Univ. Padova, Itália.

SUMMARY

In the family *Polystomellopsidaceae* a new genus *Polypedia,* is described. It is characterized by pycnostroma superficial without free mycelium scutate-dimidiate, brownish-black, radiant, astomous, with the central area sterile and surrounded by numerous fertile locules; hypostroma central, multiple, columnar; pycnidiospores sessile continuous, hyaline. *P. leopoldinensis* Bat. & Peres, on unknown host, described as *Scolecopeltis theissenii* Rick, is the type.

RÉSUMÉ

Les auteurs décrivent dans la famille *Polystomellopsidaceae,* un nouveau genre *Polypedia,* charactérisé par des pycnostromes superficiels, sans micélium superficiel, en callote sphérique, noirâtre, radiants, sans ouverture, avec l'area centrale stérile et entourée par beaucoup de loculi; hypostrome central multiple et en colonnes; pycnidiospores sessiles non septées, hyalines. *P. leopoldinensis* Bat. & Peres, sur hôte inconnu, sous *Scolecopeltis theissenii* Rick, est le type.

Reprint from **Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia** Serie **5**, Vol. **XVI**.
pag. 118-120, 1959

ESTAMPA I.

Polypedia leopoldinensis Bat. & Peres n. sp. Secção longitudinal do picnostroma.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 235-245, 1960

ALGUNS DISCOMYCETES ALIENIGENAS (*)

A. CHAVES BATISTA

Uma pequena série de Discomicetos, sem qualquer parentesco entre os seus integrantes, compõe êste trabalho.

São fungos que descrevemos ou examinamos ao comparar antigos especimens de Herbário, que nos foram doados ou enviados para uma revisão taxonômica.

Assim, apresentamos **Belonopsis eriophila** Syd. reestudado sôbre antigo material de H. Sydow; **Calicium magellanicum** Speg. var. **brasiliensis** nobis, de apotécios e estipe menores do que a espécie tipo, tendo mais longos ascosporos; **Endocolium australiense** (Syd.) Bat. & Nasc. n. comb., reconhecido sôbre o especimen tipo de **Melanodochium australiense** Syd., que perde, agora, a sua validade; **Endocolium palmeriae** Syd. analisado sôbre cotipo de H. Sydow; e **Gorgoniceps vernoniicola** (P. Henn.) Bat. n. comb., que estudamos sôbre especimen de The New York Botanical Garden, coletado por Ule, no Peru e que tinha a sua identificação como **Parmulariella vernoniae** P. Henn.

BELONOPSIS ERIOPHILA Syd.

in Ann. Myc. vol. XXXV: 44, 1937.

Micélio hialino, indistintamente septado, desenvolvendo-se sôbre pêlos foliares ;hifas de 2 — 5 u de diam.; irregularmente ramificadas. Apotécios hipófilos, superficiais, sôbre indumento foliar, sésseis, globoso-achatados, de secção elíptica, marron-negros, carnoso-ceráceos, isolados, gregários, de 170 — 480 u de diam. e 110 — 144 u de altura; hipotécio subparenquimático de 35 — 44 u de alt., formado de células

(*) Publicação nº 127

marron-claras a subhialinas, poligonais e arredondadas, de 4 — 11 x 3,5 — 6,5 u; epitécio marron-negro de 33 — 44 u de altura, formado de células cilindráceas de 10 — 14 x 2,5



Fig. 1

BELONOPSIS ERIOPHILA Syd.

a) Apotécio em secção longitudinal, sôbre indumento foliar.
b) Ascos parafisados.
c) Ascosporos.

Orig.

— 3,5 u de diâmetro, apresentando nas margens, hifas eretas, à semelhança de setas contínuas, oliváceas a marron-

claras, retas ou encurvadas de ápice rotundo, 24 — 43,5 x 9 — 14,5 u; himênio contendo numerosos ascos e paráfises, 350 — 400 u de diam. e 77 — 93,5 u de alt. Ascos clavados, 2-tunicados, curtamente pedicelados, parafisados, com 8-esporos, 36 — 42 x 10 — 12 u; paráfises hialinas, septadas, ramificadas, com 1,5 u de diam., Fig. 1.

Ascosporos fusoide a fusoide — clavados, hialinos, 3-septados, polísticos, polos obtusos ou rotundos, não constrictos 16 — 23,5 x 2 — 3 u.

Sôbre **Astrotricha ledifolia** D. C. — Pennant Hills — New South Wales. Leg. L. Fraser, XII — 1935. H. Sydow — Rev. por A. Chaves Batista & M. L. Nascimento, em 16-3-958.

CALICIUM MAGELLANICUM Speg. var. **BRASILIENSIS** Batista & Nascimento n. var.

in Fung. Fueg. nº 360
Syll. Fung. VIII, 837, 1889.

Frutificações gregárias, implantadas sôbre lenho esbranquiçado oliváceo, de hospedeiro desconhecido, em associação com alga **Pleurococcus**, pluriestratificada, da qual se obtém, ao microscópio, células globosas, subglobosas ou elipsóides, hialinas, de 5 — 10 x 3.5 — 6 u, Fig. 2.

Apotécios estipitados, globosos, turbinado-hemisféricos, pulverulentos, oliváceos e ferrugíneos, 210 — 235 u de diam., 165 — 190 u de altura, submembranosos, de paredes prosenquimáticas, 26.5 — 32 u de espessura, formadas por uma tessitura de hifas marron-claras, 1.5 — 2.2 u de diam., a porção parietal mais externa revestida por substância pulverulenta. Fig. 3.

Disco oliváceo coberto por mascédio, isto é, abundantes paráfises e ascosporos; himênio 66 — 115 u de alt. Ascos cilindráceos, 1-tunicados, 8-esporos, 44 — 50 x 3 — 3.5 u, pedicelados, 20 — 30 x 1 — 1.5 u, evanescentes. Paráfises numerosas, filiformes, ramificadas, septadas, hialinas ou fuscas, 1 u de diam., revelando tendência para coalescer na extremidade livre. Ascosporos elipsóides ou clavados, a princípio contínuos, subhialinos, depois 1-septados, não constrictos, marron-claros, monósticos, de epispório verrugoso, 6.5 — 9 x 3 — 4.5 u.

Estipe longo, frágil, setiforme ou cilindráceo, erecto, rijo, indiviso, 980 — 1200 u de alt., 82.5 — 100 u de diam., um tanto dilatado na base, 105 — 140 u de diam., e penetrando ao substrato na profundidade de 19 — 30 u.

Reação ao iodo, nula .

Sôbre lenho de planta não ideitficada, Jequiriçá-Bahia, Leg. Prof. Pe. Camille Torrend S. J., VI, 1915.

O especimen em foco, doado pelo Prof. Pe. Torrend, tinha sòmente a indicação da família Caliciaceae e, agora, o identificafmos como uma nova variedade de **C. magellani-**



Fig. 2

CALICIUM MAGELLANICUM Speg. var. **brasiliensis** Bat. & Nasc. n. var.

Aspecto gregário das frutificações.

cum. Tipo, 5929, IMUR. Det. A. Chaves Batista e M. Lourdes Nascimento, 3-12-1956.

A typo differt per apothecios et stipites minores et ascosporos majores.



Fig. 3

CALICIUM MAGELLANICUM Speg. var. **brasiliensis** Bat. & Nasc. n. var.
Apotécio longamente estipitado, visto em córte longitudinal.

a) área de implantação do estipe;
b) alga Pleurococcus;
c) estipe;
d) apotécio c/ ascos e ascosporos;
e) asco e paráfises;
f) ascosporos.

ENDOCOLIUM AUSTRALIENSE (Syd.) Bat. & Nasc., n. comb.

Sin.: **Melanodochium australiense** Syd.
In: Ann. Myc. XXXVI: 1938

Apotécios anfígenos, marron-negros, superficiais, de 500 — 1.200 u de diam., coriáceo-gelatinosos, gregários, isolados ou confluentes, irregulares; hipotécio estromático, penetrando no mesófilo, numa profundidade de 82 — 110 u; subparenquimático, de células poligonais ou irregulares, marron-negros, de 3,5 — 8 x 2,5 — 5 u, terminando por células hialinas, com as mesmas dimensões.

Himênio constituído de hifas septadas, marron-claras a oliváceas, de extremidades hialinas e ramificadas, contendo células de 4,5 — 12 x 2,5 — 4 u; tais hifas, paralelamente dispostas, formam um pseudoparênquima, de 71 — 121 u de altura; ascos localizados irregularmente no himênio, numerosos, ovóides a clavados, 2-tunicados, curtamente pedicelados, 8-esporos, parafisados, 20 — 28 x 19 — 20 u. Paráfises filiformes, constrictas no ápice, 1 — 2 u de diam. Ascosporos cilindráceo-oblongos, hialinos, 1-septados, levemente constrictos, conglobados, de polos rotundos de 9 — 12 x 4 — 5 u, Figs. 4 e 5.

Sôbre **Tecma australis** R. Br. — Mount Dromedary, New South Wales. Leg. L. Fraser, II — 1933. Tipo, nº 98, Dep. Bot. Univ. of Sydney.

Ascoma amphigena, atro-brunnea, superficialia, 500-1.200 u diam., coriaceo-gelatinosa, simplicia, gregaria vel confluentia, efformata. Hypothecium stromaticum in mesophyllum penetrans usque 82-110 u, subparenchymaticum, ex celluis polygonalibus vel irregularibus, atro-brunneis, 3,5-8 x 2,5-5 u, etiam hyalinis, compositum. Hymenium ex hyphis septatis, brunnescentibus vel olivaceis, hyalinis ad extremitatem, ramosis, ex cellulis 4,5-12 x 2,5-4 u parallelis dispositis, pseudoparenchymaticis, 71-121 u alt., compositum. Asci irregulariter dispositi, numerosi, ovoidei vel clavati, 2-tunicati, curto pedicellati, 8-spori, paraphysati, 20-28 x 19-20 u. Paraphysibus filiformibus, hyalinis, apicaliter constrictis, 1-2 u cr. Ascosporae cylindraceo-oblongae, 1-septatae, parve constrictae, conglobatae, hyalinea, 9-12 x 4-5 u.

In foliis **TECOMAE AUSTRALIS**, R. Br. Mount Dromedary, New South Wales. Leg. L. Fraser, II-1933. Typus, 98, Depart. Bot. Univ. of Sydney.

Obs.: Êste fungo fôra considerado tipo do novo gênero **Melanodochium** Syd., na família Tuberculariaceae.

Contudo, examinando, agora, o cotipo de H. Sydow e mais o especímen nº 97 do Dep. de Bot. da Univ. de Sydney, também sôbre o mesmo hospedeiro, **Tecoma australis,** verifi-



Fig. 4

ENDOCOLIUM AUSTRALIENSE (Syd.) Bat. & Nasc. n. comb.

a) apotécio sob secção longitudinal; neste especímen o estroma basal não chega ao mesófilo pròpriamente dito.

camos que, na realidade, se trata de um **Endocolium,** conforme a documentação que apresentamos. Aquilo que Sydow admitiu como conídios, de vez que não vira os ascos dêste fungo, são, evidentemente, pequenas constrições da porção terminal de paráfises ou das hifas do himênio. Assim, não há razão para manter — se o gênero **Melanodochium.**



Fig. 5

ENDOCOLIUM AUSTRALIENSE (Syd.) Bat. & Nasc. n. comb.

Aspecto parcial de um apotécio.

ENDOCOLIUM PALMERIAE Syd.

In Ann. Myc. Vol. **XXXVI**: 306, 1938

Apotécios hipófilos, marron-negros, irregulares, dispersos, solitários, raros 2 — 3 agregados, imerso-irrompentes, penetrando no mesófilo e atingindo a epiderme oposta da folha, 700 — 980 u de diam., coriáceo-gelatinosos, sub-parenquimáticos, de células poligonais com 3 — 10 x 2,5 — 5 u; estroma basal irregular, parenquimático, 76 — 390 u de diam.



Fig. 6

ENDOCOLIUM PALMERIAE Syd.

Secção longitudinal do apotécio.

Orig.

Ascos paralelos, numerosos, clavados, estipitados, 8-esporos, 32 — 50 x 8 — 10 u.

Paráfises-filiformes, simples ou ramificadas 1.5 u de diam.

Ascosporos oblongo-clavados, hialinos, dísticos, 1-septados, levemente constrictos 7 — 9.5 x 3,5 — 4 u. Fig. 6.

Sôbre folhas de **Palmeria scandens** F. Müller. Salisbury, New South Wales. Leg. L. Fraser, VIII, 1935. Det. H. Sydow.

Obs.: O especímen em tela, cotipo de Sydow, foi-nos cedido gentilmente pela Dra. L. Fraser.

GORGONICEPS VERNONIICOLA (P. Henn.) Bat. n. comb.

Erinella vernoniicola P. Henn.

P. Henn. — **In Hedwigia** 43: 272, 1904

Apotécios hipófilos, raros, espalhados, superficiais, a princípio globosos e curto-estipitados, depois abertos, em forma de urna, com 185 — 213 u de diam., ceráceos, desagregando-se, fàcilmente, à ligeira pressão sôbre a lamínula, amarelados externamente e cremes na parte interna; parede de natureza prosenquimática, constituídas por hifas hialinas de 1,5 — 2,5 u de diam., densamente entrelaçadas; himênio plano, creme.

Ascos cilindráceos, sésseis ou curto-pedicelados, 100 — 162 x 5 — 6,5 u, octosporos, uni-tunicados; paráfises filiformes, simples, septadas, de ápice dilatado ou não, Fig. 7.

Ascosporos filiformes, polos apilados, 85 — 139 x 1 — 1,5 u, septados, gutulados, paralelos, hialinos.

Sôbre fôlha de **Vernonia sp.**, associado a outras frutificações imaturas, sob a etiqueta de **Parmulariella vernoniae** P. Henn. Peru, Tarapoto, Leg. E. Vle. Espec. tipo, nº 84, ex Ule. Mycotheca brasiliensis, in New York Botanical Garden.

Est **Gorgoniceps** per ascos paraphysatos et scolecosporos hyalinos, septatos.

NOTA: — Agradecemos a colaboração que nos prestou o Dr. A. Fernandes Vital, no estudo dêste fungo.

ABSTRACT

This paper contains a miscellaneous series of Discomycetes, being a new variety — **Calicium magellanicum** Speg. var. **brasiliensis** Bat. & Nasc. and new combinations, **Endocolium australiense** (Syd.) Bat. & Nasc. and **Gorgoniceps vernoniicola** (P. Henn.) Bat. Other species are described again in the light of the reexamination of cotype material, as **Belonopsis eriophila** Syd. and **Endocolium palmeriae** Syd.



Fig. 7

GORGONICEPS VERNONIICOLA (P. Henn.) Bat. n. comb.

Asco parafisado e ascosporo.

RÉSUMÉ

Ces papiers contiennent un mélange de la série des Discomycètes: une nouvelle variété — **Calicium magellanicum** Speg. var. **brasiliensis** Batista & Nasc. et deux nouvelles combinaisons — **Endocolium australiense** (Syd.) Batista & Nascimento, **Gorgoniceps vernoniicola** (P. Henn.) Batista.

D'autres espèces sont de nouveau décrites à la lumière d'un second examen du matériel cotype, telles que **Belonopsis eriophila** Syd. et **Endocolium palmeriae** Syd.

Atas do IMUR
Ano I, págs 247-274, 1960

MONILIALES — DESCRIÇÃO E REVISÃO DE ALGUMAS ESPÉCIES (*)

A. CHAVES BATISTA
H. SILVA MAIA
J. A. DE LIMA
EURICO A. F. DA MATTA (*)

O presente estudo compreende a descrição ou a revisão de espécies de fungos **Moniliales** com que lidaram os A.A. no curso de suas pesquisas.

Dêsse modo, acham-se aqui reunidos diferentes fungos, quer novos, quer de assinalamento anterior em outras regiões, das famílias Moniliaceae, Dematiaceae e Tuberculariaceae.

São indicados como novas espécies:

Allescheriella incognita Bat. & Maia, que dilata a amplitude do gênero **Allescheriella** P. Henn., **Brachysporiella cordiae** Bat., **Hormisciomyces bellum** Bat. & Carn., **Phialetea** n. gen. **aerospora** Bat. & Nasc. de fialóforos aéreos, estauriformes e fialosporos contínuos, marron, **Podosporium dialiumii** Bat., **Sarcinella longipedunculata** Bat. & Nasc. e **Helminthosporium xylopifolii** Bat.

De espécies prèviamente diagnosticadas, destacam-se os seguintes fungos:

Cladosporium olivaceum (Corda) Bonord., **Didymobotryum pubescens** (C. & Ell.) Sacc., **Hadrosporium fraserianum** Syd. reestudado sôbre cotipo de H. Sydow, **Helminthosporium melioloides** Sacc., **Helminthosporium oryzae** Miyabe & Hori, **Helminthosporium porothesicolum** F. L. Stevens, **Isaria pulcherrima** Berk. & Br., **Nigrospora sphaerica** (Sacc.) Mason, **Septonema hormiscium** Sacc., **Sepedonium lanuginosum** e **Trichoderma glaucum** Abbott.

(*) Publicação nº 128

(*) Do Instituto Biológico da Bahia.

ALLESCHERIELLA INCOGNITA Batista & Maia, n. sp.

Em batata-dextrose-agar BBL, desenvolvem-se colônias efusas, caracterìsticamente cotonosas, brancas, planas, de 5 — 6 cm de diam. aos 14 — 16 dias e à temperatura ambiente de 24 — 26° C, pouco densas, inodoras, de escasso exsudato hialino; reverso plano, branco.

Em agar-malte, nas mesmas condições de cultivo, as colônias conservam-se branco-cotonosas, efusas, porém de área central pulvinada, mais densas e de 4 — 5 cm de diam. de reverso creme, sem outras diferenças.

O micélio aéreo apresenta-se constituido por hifas hialinas, a princípio indivisas depois ramificadas, com anastomoses, indistintamente septadas e de citoplasma bastante granulado, quando envelhecidas, 4.5 — 7.5 u de diam. Conidióforos levantados da trama do micélio, eretos, direitos ou encurvados, simples ou ramosos, delgados, lisos, septados, hialinos, 10 — 265 x 1 — 2.5 u. As ramificações dos conidióforos apresentam-se geralmente como proliferações que logo originam conídios ou se alongam em hifas férteis que vão dar conídio acrógeno. No curso do desenvolvimento de uma hifa fértil observa-se, às vêzes, o início da formação de um conídio que entretanto evolve para a produção de clamido-aleuria de Grigoraki, oblongo, de paredes espessas, 7.5 — 15 x 7.5 — 10 u, hialinas, e do qual continua o crescimento hifal para originar novos clamido-aleurias, intercalares, ou simplesmente um conídio apical. Fig. 1.

Os conídios são acrógenos, isolados e terminais, sésseis, piriformes, hialinos, de epispório espesso, hialinos, com a porção externa alaranjada, 11 — 14 x 7 — 11 u, dotados de pequeninos glóbulos de óleo. A espécie em foco foi isolada do ar atmosférico em Salvador, Bahia, pelo Dr. Armando Domingues, do Instituto de Saúde Pública e enviada aos autores, para determinação, pelo Dr. Eurico A. F. da Matta, do Instituto Biológico da Bahia, em 2-12-54, sob o n° 149.

Tipo 639, IMUR. 18-12-55.

Obs.: O gênero **Allescheriella** P. Henn é conhecido até hoje através sòmente de **A. crocea** (Montagne) Hughes, cujos esporos, muito maiores aliás do que os da nossa espécie, apresentam a parede externa marron-avermelhada, sendo hialina a porção interna.

Coloniae in agaro "potato-dextrose-BBL", effusae, albidae, floccosae, planae, 5-6 cm diam in 14-16 diebus (24-26.° C), pauci densae, inodorae; exsudato hyalino raro; reverso albido, plano. In maltose-agaro albido-floccosae, effusae, sed area centrali pulvinatae, 4-5 cm

diam.; reverso cremeo. Mycelium aereum ex hyphis subrectis dein ramosis, indistincte septatis, cum anastomosibus, 4.5-7.5 u diam., cum cytoplasmate granulato. Conidiophoris erectis, rectis vel incurvatis, simplicibus vel ramosis, levibus, septatis. hyalinis, 10-265 x 1-2.5 u. Chlamido-aleuria (Grigoraki) in hyphis fertilibus, prolife-



FIG. 1

ALLESCHERIELLA INCOGNITA Batista & Maia n. sp.

a — Conidióforo simples;
b — Conidióforo ramoso (Conídios terminais);
c — Clamido-aleurias.

Orig.

rantibus vel non, intercalaribus, oblonga, parietibus crassis hyalinis, 7.5-15 x 7.5-10 u. Conidiae acrogenae, singulae, terminales, sessiles, pyriformes, hyalinae, 11-14 x 7-11 u, glabrae, episporia aurantiaca. In atmospheris isolatus a Dr. Armando Domingues, Salvador — Bahia. Leg. Dr. Eurico A. F. da Matta, Instituto Biológico da Bahia, n.º 149. Typus, 639, IMUR.

Consultar:
Hughes, S. J. — **in** Studies on Micro-fungi VII. Mycol. Pap. 41-Comm. Mycol. Inst. 17 págs. 1951.

Hughes, S. J. Conidiophoris, conidia and classification — **in Sep.** Canadian Journ. Bot. 31: 577-659, 1953.

Ciferri, R. e E. Baldacci — Acremoniella (Allescheriella) tarchianiana n. sp. etc. **Sep.** Atti. Inst. Bot. Univ. Pavia, série IV, 7: 329 — 339, 1936.

BRACHYSPORIELLA CORDIAE Bat. n. sp.

Colônias efusas, fuligíneas. Micélio superficial, marron-claro, de hifas septadas, não constrictas, irregularmente tendo células de 9 — 12,5 x 3 — 5 u; hifopódios e setas ausentes.

Conidióforos cilindráceo-alongados, erectos, direitos ou encurvados, marron-claros, isolados ou em fascículos de 2 a 5, ramos, 6-11-septados, não constrictos, 120 — 200 x 8 — 11 u, apresentando ramificações nodulosas, na região apical. Tais ramificações são cilindráceas, contínuas, 1 gutuladas, simples, catenuladas ou botriosas, de 2 a 3, atingindo de 5 — 8 x 2,5 — 4,5 u.

Conídios obovoides ou piriformes, a princípio contínuos, depois 1 a 3-septados, não constrictos, de paredes espessas, lisos, marron-claros, de 11 — 16,5 x 6,5 — 9,5 u, curtamente pedicelados ou não. Fig. 2.

Sôbre ramos de **Cordia trichostoma** associado a **Helminthosporium Oryzae** Niyabe & Hori e líquenes. Caruaru — Pern. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 6-4-58. Tipo, 13052, IMUR.

Coloniae effusae, fuligineae. Mycelium superficiale, brunnescens, ex hyphis irregulariter ramosis, septatis, ex cellulis 9-12,5 x 3-5 u, non setosis, haud hyphopodiatis compositum.

Conidiophoris cylindrico-elongatis, simplicibus vel 2-5 fasciculatis, erectis, rectis vel incurvatis, 6-11 septatis, non constrictis, 120-200 x 8-11 u, apicaliter ramosis; ramulis ex hyphis nodulosis, simplicibus, catenulatis vel 2-3 botryosis, 5-8 x 2,5-4,5 u, efformatis.

Conidiae obovoideae vel pyriformes, primo continuae dein 1-3-septatae, non constrictae, parietibus crassis, brunnescentes, curto pedicellatae, 11-16,5 x 6,5-9,5 u.

In foliis **Cordiae trichostomae,** socius **Helminthosporii Oryzae** Niyabe & Hori, et lichenis. Caruaru — Pern. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 6/4/58. Typus, 13052, IMUR.

FIG. 2

BRACHYSPORIELLA CORDIAE Bat n. sp.

Conidióforos e conídios.

Orig.

CLADOSPORIUM OLIVACEUM (Corda) Bonorden **in** Handb. p. 72; in Syll. Fung. 1886, vol. IV p. 354

Syn. **Mydonosporium olivaceum** — Corda in Sturm D. C. Fl. t. 48

Hormodendron olivaceum, Handb. p. 77 e Soil Fungi p. 329

Penicilium olivaceum Corda. Ic. fung. III p. 12, fig. 35

Cultivado sôbre Czapek-agar, desenvolve, aos 22 dias e à temperatura ambiente; colônias oliváceas, circulares, irregulares ao centro e planas na periferia, de bordos levemente ondulados, 2 — 2,5 cm de diâmetro, de superfície velutinosa; reverso negro, com leve depressão central; ausência de exudato e de odor.

Micélio densamente disposto, submerso, marron, com hifas entrelaçadas, septadas; o micélio aéreo tem hifas marron claras a oliváceas, também septadas, 2,5 — 6 u de diam., irregularmente ramificadas.

Conidióforos levantando-se lateralmente das hifas submersas, erectos, septados, ramificados lateralmente, em ân-



FIG. 3

CLADOSPORIUM OLIVACEUM (Corda) Bonorden

Frutificações obtidas em Czapek-agar.

gulos maiores do que 45°; nas extremidades dessas ramificações bifurcam-se células hormodendroides, das quais partem geralmente 2 cadeias de conídios; os conidióforos são oliváceos, 300 — 700 x 2,5 — 6 u.

Células hormodendroides marron-claras a oliváceas, aproximadamente ampuliformes, com 8 — 9,5 x 3 — 4 u.

Clamidosporos intercalares e terminais, marron-claros, globosos, 7 — 13,5 u diam.

Conídios globosos a limoniformes, dispostos em cadeias regulares, basípetas, originadas de células hormodendróides, geralmente contínuos, por vêzes unisseptados na região basal das cadeias. São oliváceo-claros, alguns levemente espinescentes, 7 — 11,5 x 3 — 5,5 u. Fig. 3.

O fungo em causa foi isolado no Lab. de Fitopatologia, do Instituto Biológico da Bahia, por E. A. F. da Matta e estudado em colaboração com J. A. de Lima, do IMUR.

DIDYMOBOTRYUM PUBESCENS (C. & Ell) Sacc.

in Syll. Fung. IV: 627, 1886.

Em batatinha-dextrose-agar desenvolvem-se colônias veludosas, marron-oliváceas, alcançando 1,5 — 2 cm de diam., aos 10 — 12 dias e à temperatura ambiente de 26 — 28° C, inodoras, sem exsudato, com reverso marron-negro, plano. O micélio é denso, imerso e superficial, constituido por hifas de 1 — 1,6 u de diam., marron-claras, que se reunem frequentemente, produzindo frouxos sinêmios, de longa extensão. Conidióforos simples, pouco abundantes, ou bifidamente ramificados, contínuos ou septados, marron-claros, 5,5 — 17,5 x 1 — 1,6 u. Conídios elíptico-alongados, de polos rotundos, 1-septados, solitários ou em grupos de até 4 esporos, acrógenos, decíduos, hialinos, depois marron-claros, gutulados ou não, 6 — 12 x 1,6 — 2,5 u. Fig. 4.



FIG. 4

DIDYMOBOTRYUM PUBESCENS (C. & Ell) Sacc.

a — Conodióforo simples e capítulo conidial acrógeno;
b — Conidióforo bífido;
c — Conidióforo simples e conídio solitário;
d — Sinêmio.

Orig.

Êsse fungo foi isolado do ar atmosférico pelo Dr. Eurico A. F. da Matta, no Instituto Biológico da Bahia, que é assim o seu legador, em 13-6-55. Tem o nº 637, no Instituto de Micologia, da Universidade do Recife, havendo sido identificado por A. Chaves Batista e A. F. Vital.

Nota — Parece-nos ser esta a primeira vez que êsse fungo é assinalado no Brasil. A espécie tipo foi obtida de caule de **Smilax**, em New Jersey, Estados Unidos.

HADROSPORIUM FRASEARIANUM Syd.

In Ann. Mycol. XXXVI: 311, 1938

Micélio interno, marron, pouco desenvolvido, de hifas septadas, 2 — 2,5 u de diam., inter e intra-celular.



FIG. 5

HADROSPORIUM FRASERIANUM Syd.

Esporodóquio e conídios.

Orig.

Esporodóquios fibroso-celulósicos, irregularmente dispersos ou gregários, frouxos, porém com extrato basal denso, embora tênue, marron-negros de 11 — 19 u de altura e 7.5 — 100 u de diam., de âmbito irregular ou elipsoide. Conidióforos breves, em cone truncado, ou cilindráceos, marron-oliváceos, 13 — 17 u de altura, 2.5 — 4.5 u de diam. basal e ápice dilatado, 6 — 9 u de diam.; em geral são unicelu-

lares, raramente 1-septados. Conídios acrógenos, solitários, oblongos ou elipsoides, retos ou ligeiramente encurvados, marron-negros, de polos rotundo ou retos, 2 — 3 septados transversalmente, raro — 4-septados, 50 — 85 x 25 — 37 u. Fig. 5.

Sôbre madeira morta — National Park. New South Wales. Leg. L. Fraser, IX, 1935 Det. H. Sydow.

Obs. A descrição acima resulta do estudo do cotipo de Sydow, que nos foi bondosamente cedido pela Dra. L. Fraser, de New South Wales.

HELMINTHOSPORIUM GIGANTEUM Heald & Wolf **in** Mycologia, III (1): 21, 1911

Micélio superficial, marron-negro, septado, não constric-

FIG. 6

HELMINTHOSPORIUM GIGANTEUM Heald & Wolf

Conidióforos e conídios.

Orig.

to, irregularmente ramificado, não hifopodiado; células hifais de 7 — 12,5 x 4 — 5 u; cespítulos esparsos ou efusos.

Conidióforos simples, raramente em fascículos de 2 — 3 hifas férteis, marron-negros, pluri-septados, não constrictos, apresentando escaras no ápice, em número de 1 a 3; área basal levemente intumescida, 175,5 — 400 x 6,5 — 12 u. Fig. 6.

Conídios cilindráceos, acrógenos, 0-4-5 septados, não constrictos, marron-claros, granulosos a gutulosos, 260 — 300 x 15 — 20 u.

Sôbre córtex de **Salix mariana** Wolosz. Recife, Pernambuco, Brasil. Leg. Oswaldo Soares. 17-2-958. Espec. nº 12597, IMUR.

HELMINTHOSPORIUM MACULOSUM Sacc.

Accad. Veneto — Trent. 1917
Syll. Fung. XXV: 824, 1931.

Colônias circulares, sub-circulares, com 3 a 10 mm de



FIG. 7

HELMINTHOSPORIUM MACULOSUM Sacc.

Micélio, conidióforos e conídios

Orig.

diâmetro, velutinas, isoladas ou confluentes, às vêzes tornando-se efusas, hipófilas, de côr marron-negra, distribuidas irrregularmente pelo limbo.

Micélio sub-hialino a marron-claro, constituído por hifas sinuosas, septadas, profusa e irregularmente ramificadas, não constrictas, indistintamente septadas, de 1 — 3 u de diam. sem setas ou hifopódios.

Conidióforos numerosos em tôda a colônia, menos na periferia, isolados ou em fascículos laxos, simples, raramente ramificados, eretos ou curvos, direitos ou sinuosos, septados, não constrictos, marron, 83,5 a 300 x 4,5 — 6 u. Fig. 7.

Conídios fusoides, desiguais, obtusos 1 — 3 septados, não constrictos, marron, esclarecidos no lóculo apical, lisos, 11,5 — 26,2 x 5,25 u.

Sôbre hospedeiro indeterminado, como hiperparasitas de micélio de meliolaceae.

Las Marias — Puerto Rico. F. L. Stevens, 10-7-915. Espec. nº 13171, Inst. de Micol. Univ. do Recife. Também em The National Fungus Collections, U.S.A.

HELMINTHOSPORIUM MELIOLOIDES Sacc.

in Notae Myc. XXIII, pág. 89, Acad. Veneto-trent. 1917

Sistema vegetativo desenvolvido sôbre o micélio de **Meliolaceae**, superficial, irregularmente ramificado, não setoso, não hifopodiado; hifas marron claro, velutinos septadas, não constrictas; células hifais de 12,5 — -9 x 5 — 7,5 u.

Conidióforos marron-claros, alnogados, radiantes ou cespitosos, flexuosos, erectos, encurvados e decumbentes, acrógenos, denteados, septados, não constrictos, de paredes espessas e ápice hialino, 250 — 378 x 6,5 — 11 u. Fig. 8.

Conídios obclavados a cilindráceos, presos no ápice do conidióforo, singulares, raramente 2; às vêzes prendem-se lateralmente no conidióforo; quando jovens, são hialinos e contínuos, depois passam a ter de 1 a 3 septos com gútulas distintas, tornando-se marron-claros, e por fim fuligíneos, 32 — 45 x 9,5 — 11 u.

Sôbre **Meliolaceae**, em caule de planta ignota. Dois Irmãos — Recife — Leg. Oswaldo Soares, 19-2-58. Mat. nº 12598, IMUR.



FIG. 8

HELMINTHOSPORIUM MELIOLOIDES Sacc.

Fascículo de conidióforos e conídios.

Orig.

HELMINTHOSPORIUM ORYZAE Breda de Hann

in Bull. Inst. Bot. Buitenz. VI: 11-13, 1900.
Padwick, G. W. **in** Manual of Rice Diseases, 21-34, 1950.

Cespítulos espalhados ou gregários.

Micélio superficial, marron-claro, septado, não constricto, não setoso, não hifopodiado, de ramificações irregulares, tendo células de 9 — 12,5 x 3 — 5 u.

Conidióforos marron-escuros, cilindráceo-alongados erectos, direitos ou encurvados, isolados ou em fascículos de 2 a 6, porém quasi livres na base, 7 — 15 septados, ápice pouco atenuado e obtuso, pálido a subhialino, 100 — 300 x 8 — 13,5 u. Fig. 9.

Conídios obclavados, às vêzes lunares, acrógenos, de paredes duplas, 6 a 11 septados, levemente constrictos ou

FIG. 9

HELMINTHOSPORIUM ORYZAE Miyabe & Hori

Conidióforos e conídios.

Orig.

não gutulados, fuligíneos, de geminação apical, 67,5 — 140 x 17 — 22 u.

Sôbre caule de **Cordia trichostoma** associado a **Brachysporiella cordiae.** Bat. n. sp. e líquens. Caruaru, Pern. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 6-4-58. Espec. nº 13053, IMUR.

HELMINTHOSPORIUM POROTHESICOLUM F. L. Stevens

in Bot. Gas. 65: 242, 1918
Syll. Fung. XXV: 832, 1931

Micélio superficial abundante, de hifas indistintamente septadas, 1,5 — 2 u de diam.

Conidióforos solitários, marron-claros, septados, erectos, flexuosos, acrógenos; 80 — 120 x 3,5 — 6 u. Fig. 10.

Conídios marron-claros, elipsoides-fusoides, 3-septados, 17 — 21 x 3,5 — 6 u.

FIG. 10

HELMINTHOSPORIUM POROTHESICOLUM F. L. Stevens

Conidióforos e conídios.

Orig.

Sôbre **Vitex** sp., parasitando **Irenopsis vitexfolii** Bat. & Carneiro. Maricao, Puerto Rico. F. L. Stevens 20-9-913. Espec. nº 13395, IMUR.

HELMINTHOSPORIM XYLOPIFOLII Bat. n. sp.

Micélio epífilo, marron-claro, irregularmente, ramificado, não setoso, não hifopodiado, de hifas septadas não constrictas e células cilindráceas, 9 — 12.5 x 2.5 — 4.5 u.

Conidióforos marron-escuros, erectos ou encurvados, raramente decumbentes, isolados ou em feixes, não constrictos, 3 a 10 septados, de 85 — 305 x 5.5 — 8 u., não ramificados, direitos ou levemente geniculados. Fig. 11.

Conídio único, terminal, marron-escuro, cilindráceo ou obclavado, não constricto, 3 a 6 septado, de 38 — 62 x 8 — 13.5 u.

FIG. 11

HELMINTHOSPORIUM XYLOPIFOLI Bat. n. sp.

Conidióforos e conídios.

Orig.

Hiperparasita de **Asterina**, sôbre folhas de **Xylopia sericea** — Dois Irmãos — Recife, A. Chaves Batista, 12-2-58. Tipo, 12592, IMUR.

Mycelium brunnescens, irregulariter ramosum, ex hyphis septatis, non constrictis, ex cellulis cylindraceis, 9-12.5 x 2.5-4.5 u, non setosis, haud hyphopodiatis, compositum. Conidiophora erecta vel incurvata, atrobrunnea, singula vel fasciculata, simplicia, recta vel geniculata, 3-10-septata, non constricta, 85-305 x 5.5-8 u. Conidiae singulae, terminales, atro-brunneae, cylindraceae vel obclavatae, 3-6-septatae, non constrictae, 38-62 x 8-13.5 u. In plagulis **Asterinae sp.** Dois Irmãos. Recife. Leg. A. Chaves Batista, 12.2.58. Typus 12592. IMUR.

HORMISCIOMYCES BELLUM Bat. & Carneiro n. sp.

Micélio superficial ,marron, constituido de hifas longas, paralelas ou ramificadas em ângulos retos, pubescentes, septadas, constrictas, tendo células de 17 — 20 x 12 — 16 u, sem hifopódios ou setas.

Conidióforos levantando-se de hifas repentes, erectos, simples ou ramificados, pubescentes, marron, 7,5 — 260 x 6 — 16 u, septados, cilíndricos. Fig. 12.

FIG. 12

HORMISCIOMYCES BELLUM Bat. & Carneiro n. sp.

Conidióforos e conídios.

Orig.

Conídios acrógenos, em coroa apical, oblongos, sésseis, contínuos, marron, destacáveis com dificuldade, 3,5 — 8 x 3 — 7 u.

Sôbre fôlhas de **Vitex sp.**, associado a **Stellopeltis philodendricola** (Bat.) Bat. & Vital e Micropeltaceae imatura. Puerto Rico, W. E. Hess, 3-4-913. Tipo, 13318, IMUR., e isotipo em The Fungus National Collections, U.S.A.

Mycelium superficiale, brunneum, ex hyphis longis, parallelis vel ramosis in angulis rectis, pubescentibus, septatis, constrictis, ex cellulis 17-20 x 12-16 u, non hyphopodiatis, haud setosis, compositum. Conidiophoris erectis, simplicibus vel ramosis, pubescentibus, brunneis, cylindraceis, septatis, 7,5-260 x 6-16 u, efformatis. Conidiae in corona acrogena, oblongae, sessiles, continuae, brunneae, 3,5-8 x 3-7 u.

In foliis **Vitecis sp.** soc. **Stellopeltis philodendricolae** (Bat.) Bat. & Vital. et Microspeltaceae. Puerto Rico — W. E. Hess, 3-4-913. Typus, 133318, IMUR; isotypus in The Fungus National Colections, U.S.A.

ISARIA PULCHERRIMA Berk. et Br.

Syll. Fung. IV: 595, 1886

Micélio superficial, hialino, irregularmente ramificado, não setoso, não hifopodiado, septado, não constricto, de células alongadas e finas, de 12.5 — 19 x 2 — 2.5 u.

Sinêmios cilindráceos, alongados, superficiais, 850 — 1600 x 60 — 185 u hialinos, isolados, raramente confluentes, formados por abundantes hifas, bastante unidas, divergentes no ápice, septados, com células de 15 — 63,5 x 2.5 — 5 u.

Conídios terminais globosos, hialinos, contínuos e lisos, de 3 — 5 x 2.5 — 4 u.

Sôbre pecíolos de **Livistona australis**, Mart. National Park, New South Wales, Leg. L. Fraser, XI-1935. Det. por H. Sydow e revisto, agora, por nimia gentileza da University of Sydney para com o IMUR.

NIGROSPORA SPHAERICA (Sacc.) Mason

in Syll. Fung. XXV: 775, 1931.

Sôbre sabouraud-agar as colônais, aos 3 dias, medem de 6 — 6.5 cm de diam.; são planas, filamentosas, de bordos brancos, pouco nítidos, e porção mediana cinza-olivácea, apresentando sectoramento ou não e a área central umbonada, formada por hifas hialinas. Hifas repentes férteis ou estéreis, inicialmente hialinas, depois marron-claras; hifas estéreis isodiamétricas, com 2.7 — 8 u diam. Conidióforos simples ou ramificados, 11 — 16.5 x 8.5 u. A célula apical

do conidióforo é em forma de jarro. Conídios unicelulares, negros, lisos, elipsoides, 13.5 — 16.5 x 8 — 12.5 u. Fig. 13.

Obtido como contaminante de cultura, no laboratório.



FIG. 13

NIGROSPORA SPHAERICA (Saccardo) Mason.
Orig.

O fungo em aprêço tem o nº 733, na Micoteca do IMUR.

Dets. — H. da Silva Maia, Benedito Furtado e A. Chaves Batista, 30-1-1957.

PHIALETEA n. gen. Bat. & Nasc.

Tipo: **P. aerospora** nobis, n. sp.

Micélio estéril, superficial, delicado, marron-claro, escasso.

Hifas aéreas arqueadas, espinosas, septadas, marron, presas ao micélio por filamentos de base bulbosa.

Fialóforos aéreos, irregularmente estauriformes, com 3-8 fiálides, marron, conectados com as hifas aéreas por uma célula-pé alongada.

Fialosporos contínuos marron.

Typus: **P. aerospora** Bat. & Nasc. n. sp.

Mycelium sterile, superficiale, ex hyphis tenuissimis, brunnescentibus, raris, compositum. Hypha aerea elevata, arcuatim, in filamentis bulbosis, fixa, spinosa, septata, brunnea, composita. Phialophora aerea, irregulariter stauriformia, continens plures phialides, brunneos, cum cellula-pede elongata. Phialosporae continuae, brunneae.

PHIALETEA AEROSPORA Bat. & Nasc. n. sp.

Micélio estéril, superficial, de hifas delicadas, marron-

claras, remotamente septadas, 1 — 2 u de diam., desenvolvendo-se sôbre pêlos foliares. Dêsse micélio erguem-se filamentos contínuos, lisos, de 17 — 22 x 2 — 2,5 u, de base bulbosa, 4 — 5 u de diam., que sustentam hifa aérea sinuosa



FIG. 14

PHIALETEA AEROSPORA Bat. & Nasc. n. sp.

a) micélio estéril;
b) hifa suporte;
c) hifa aérea;
d) fialóforos;
e) fialóforo implantado na hifa aérea e fialosporos.

ou arqueada, marron, septada, constricta, diminutamente espinosa, tendo células de 5 — 8 x 4,5 — 5,5 u, a qual origina fialóforos no topo das curvaturas ou arcos. Fig. 14.

Fialóforos irregularmente estauriformes, aéreos, apresentando 3 — 8 fiálides, marron, como prolongamento de braços 0 — 4 septados e constrictos, de 26 — 75 x 4,5 — 6 u, tendo o ápice de 2 — 2,5 u de diam. Fig. 15.

Fialosporos globosos, contínuos, lisos, oliváceos a marron-claros, 5 — 7 u de diam.

Sôbre fôlhas de **Amomis caryophyllata** Jacq. & Urban, associado a **Meliola amomicola** Stev. e **Stomiopeltella machadoi** Bat. & H. Lima — Porto Rico, Monte Alegrillo, F. L. Stevens, 14-11-913.

Tipo, 14099, IMUR e isotipo em The National Fungus collections, U.S.A.



FIG. 15

PHIALETEA AEROSPORA Bat. & Nasc. n. sp.

Fialóforos e fialosporos.

Orig.

Mycelium sterile, superficiale ex hyphis tenuissimis, brunnescentibus, remote septatis, 1-2u cr. in pilis foliaribus compositum. Hypha aerea elevata, arcuata vel sinuosa, brunnea, spinosa, septata, conscricta, ex cellulis 5-8 x 4,5-5,5u, fixa in filamentis continuis, laevibus, 17-22 x 2-2,5, ex basi bulbosa, 4-5u diam. Phialophora aerea, irregulariter stauriformia, continens 3-8 phialides, brunneos, 0-4 septatos et constrictos, 26-75 x 4,5-u, diam. et cellula pede-elongata sed a phialidibus indistincta. Phialosporae globosae, continuae, leves, olivaceae vel brunnescentes, 5-7u diam.

In foliis **Amomis caryophyllatae** (Jacq.) Krug & Urban socii **Meliolae amomicolae** Stev. et **Stomiopeltellae machadoi** Bat. & H. Lima. Porto Rico, Monte Alegrillo, F. L. Stevens, 14-11-913. Typus, 14099, IMUR., et isotypus in The National Fungus Collections, U.S.A.

FODOSPORIUM DIALIUMII Bat. n. sp.

Colônias maculiformes, marron-negras, anfígenas, confluentes, 2 mm a 2 cms de diam., ou mesmo efusas.

Micélio marron-claro, superficial, de hifas irregularmente ramificadas, onduladas, septadas, tendo células de 16,5 — 27 x 1,5 — 3 u, levemente constrictas, não setoso, não hifopodiado.

Sinêmios marron-negros, numerosos, superficiais, erec-

tos, direitos ou encurvados, filiformes, simples ou bifurcados, Fig. 16, 1.000 — 1.500 x 30 — 35 u; ápice fasciculado, de 40 — 67,5 u de diam., base bulbosa 127 — 167 u de diam.,

FIG. 16

PODOSPORIUM DIALIUMII Bat. n. sp.

Sinêmio bifurcado.

Orig.

fibrosos, constituidos por hifas justapostas, formadas por células retangulares de 19 — 38 x 3 — 7 u.

Conídios acropleurógenos, Fig. 17, a, oblongo-fusoides, marron, 3-septados, não constrictos, 35 — 62 x 8 — 11 u, longamente pedicelados. Fig. 17, b-c.

Sôbre folhas de **Dialium divaricatum** Vahl. Caruaru — Pern. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 6-4-58. Tipo nº 13048, IMUR.

Coloniae atro brunneae, amphigenae, maculiformes, confluentes, 2 mm — 2 cm diam. vel effusae efformatae.

Mycelium brunnescens, superficiale, ex hyphis irregulariter ramosis, flexuosis, septatis, ex cellulis 16,5-27 x 1,5-3 u, parvis constrictis, non setosis, haud hyphopodiatis compositum.

Synnemata atro-brunnea, numerosa, superficialia, filiformia, erec-

ta, recta vel incurvata, simplicia vel bifurcata, 1.000-1.500 x 30-35 u, apicaliter fasciculata, 40-75 u diam. et basi bulbosa, 127-165 u diam., fibrosa, ex hyphis parallelibus, juxtapositis, ex cellulis rectangularibus, 19-38 x 3-7 u, efformata.

In foliis **Dialis divaricatis** Vahl. Caruaru — Pern. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 6/4/58. Typus, 13048, IMUR.

FIG. 17

PODOSPORIUM DIALIUMII Bat. n. sp.

a) sinêmio;
b) conídios;
c) detalhe da implantação dos conídios no simênio.

Orig.

SARCINELLA LONGIPEDUNCULATA Bat. & Nasc. n. sp.

Colônias marron-claras, hipófilas, efusas, não maculícolas.

Micélio reticulado-ramificado, constituido de hifas, reti-

líneas ou sinuosas, oliváceo-marron, septadas, não constrictas, tendo células de 7 — 15 x 2,5 — 6 u.

Hifopódios alternos ou unilaterais, subglobosos, 5 — 11 u de diâmetro, cilindráceos — 7 — 11 x 5 — 7 u ou ramificados, 11 — 27 x 5 — 6 u, 1 — 3 celulares.

FIG. 18

SARCINELLA LONGIPEDUNCULATA Bat & Nasc. n. sp.
Micélio hifopodiado e conídios pedunculados.

Orig.

Conídios marron-negros, oblongos ou piriformes, 23 — 28 x 19 — 22 u deitados em relação ao plano da matriz, curto a longo pedunculados, pedúnculo de 5 — 80 x 2,5 — 5 u, marron-claro a subhialino, pluricelulares, constituídos de 7 — 11 células sub-globosas, 5 — 8 u de diam. Fig. 18.

Sôbre folhas de **Durante repens** — Santiago de las Vegas, Cuba, 18-10-921 Charles & Ballon. Tipo, 14029, IMUR. E em The National Fungus Collections, U.S.A.

Coloniae brunnescentes, effusae, hypophyllae, sine maculis. Mycelium reticulatum, ramosum, ex hyphis rectis vel sinuosis, olivaceo-brunneis, septatis, haud constrictis, ex cellulis 7-15 x 2,5-6 u, compositum. Hyphopodia alternata vel unilateralia, subglobosa, 5-11 u diam, vel cylindracea, 7-11 x 5-7 u vel ramosa, 11-27 x 5-6, continua vel 3 cellularia. Conidiae atro-brunneae, oblongae vel pyriformes, 23-28 x 19-22 u non erectae, curto vel longo pedunculatae, 5-80 x 2,5-5 u, brunnescentes vel subhylinae, longitudinaliter et transversaliter septatae, 7-11 cellulae globosae 5-8 diam. In foliis **Durantae repentis** — Santiago de las Vegas, Cuba. C. & Ballon, 18-10-921. Typus, 14029, IMUR., et isotypus in The National Fungus Collections, U. S. A.

SEPEDONIUM LANUGINOSUM (Tsiklinsky, Miche) Griffon et Maubl.
in Bull. Soc. Myc. de France: 70, 1911.

Colônias em Sabouraud-agar, incubadas à temperatura de 37°C, se apresentam feltrosas, azul-cinza, de centro depresso, avermelhado, clareando para os bordos, que são brancos, com sectoramento róseo. Medem de 6,3 — 6,4 cm diam. Bordos 2 — 3 mm larg.

Reverso — verde-cinza, por vêzes com "shade" laranja, liso, plano, de bordos brancos.

Conídios globosos a sub-globosos, marron-oliváceos, lisos, de início, depois espinescentes, em cadeia basipeta, com 5,5 — 8 u diam. Fig. 19.

Phialides hialinas, pleurógenes ou no tôpo de curtos conidióforos, de disposição oposta (crucial) ou alterna, 7,5 — 11 x 2,5 — 3 u.

Conidióforos hialinos, simples, 8 — 13,5 x 1,5 — 2,5 u.

Colônias, 10 — 12 dias, em batata-dextrose-agar, se apresentam planas, cinza-esverdeada, de bordos fimbriados e centro de hifas repentes, cinza-claro. Medem de 7 — 7,5 cm diam. Bordos brancos de 3 — 4 mm larg.



FIG. 19

SEPEDONIUM LANUGINOSUM (Tsiklinsky, Miche) Griffon et Maubl.

a) Hifa raquetiforme;
b) Conidióforos e conídios catenulados;
c) Conídios s/conidióforos cruciformes.

Orig.

Reverso — cinza escuro, com shade verde oliva na porção mediana. Bordos brancos.

Conídios globosos a sub-globosos, marron-oliváceos, de

início lisos, depois espinescentes, catenulados, basipetos, com 5,5 — 8 u diam.

Phialides hialinas, pleurógenas ou sôbre curtos conidióforos, oposta ou alternadamente dispostas, 8 — 11 x 2,5 — 3 u.

Conidióforos curtos, simples, hialinos, cilindráceos, septados, 8 — 13,5 x 1,5 — 2,5 u.

O presente organismo apresenta a peculiar propriedade de só se desenvolver, favoràvelmente, em meios artificiais de cultivo standardizados nos laboratórios, quando submetidos à temperatura entre 37 e 40° graus centígrados, nunca à temperatura ambiente.

Isolado de **madeira.** Leg. Dr. José Otamar, do I.A.U.R. Det. A. C. Batista & H. S. Maia, cepa nº 1019. I.M.U.R.

SEPTONEMA HORMISCIUM Sacc.
in Michelia II: 559

Cespítulos efusos, negro-fuligíneos.

Micélio superficial, marron-claro, de ramificações irre-

FIG. 20

SEPTONEMA HORMISCIUM Sacc.

Cespítulos de conidióforos e conídios.

Orig.

gulares; hifas septadas não constrictas, não hifopodiadas, não setosas; células hifais de 6,5 — 9 x 2,5 — 4 u.

Conidióforos erectos, direitos ou encurvados, 5 — 10 septados, não constrictos, de paredes duplas, em fascículos simples, de 45,5 — 75,5 x 6,5 — 8 u.

Conídios obclavados ou fusoides, acrógenos, 3 a 8 septados, não constrictos, marron-escuros, lisos, de 20 — 50 x 8 — 11 u., em longas cadeias que atingem a 150 u de extensão. Fig. 20.

Sôbre cortex de **Genipe americana** L. Dois Irmãos — Recife. Leg. Oswaldo Soares, 22-2-58. Espec. nº 12722, IMUR.

TRICHODERMA GLAUCUM Abbott
Syn.: **T. flavum** Abbott

in A Manual of Soil Fungi — Iowa State Coll. Press, p. 183, 1945.

A semeadura em Czapek-agar, origina colônias espalhadas, porém sem uniformidade, inicialmente tênues, estéreis, de micélio aéreo, branco, depois de aspecto crustáceo, ocupando tôda a área das placas de Petri, sêcas, planas, matizadas de branco, verde-oliva, verde limão e amarelo-verde, a partir do 5º-6º dia; aos 10 dias, sôbre a tonalidade verde, destacam-se sombras amarelas, que correspondem às áreas



FIG. 21

TRICHODERMA GLAUCUM Abbott.

Orig.

de frutificação, intercaladas com porções de micélio aéreo; exsudato e odor ausentes. Reverso plano, liso, verde-alaranjado, tendendo para ferrugem, depois do 15º dia.

Micélio estéril, hialino, constituido por hifas ramifica-

das irregularmente, bastante septadas, às vêzes um pouco intumescidas, com células em barrilete, 3.5 — 7 u de diam.

Conidióforos levantados do micélio à maneira de ramos ascendentes, não verticilados, levemente espinescentes, 50 — 100 u de altura, 1.5 — 2.5 u de diam., apresentando por seu turno ramificações opostas, alternas ou até irregulares, geralmente em número de 2 — 3, recurvadas; tais ramificações originam fiálides, em regra 2 — 3; as fiálides são lajeniformes, de ápice acuminado, 8.5 — 11.5 x 2 — 2.5 u, sôbre o qual se formam capítulos de conídios.

Os capítulos (conidial head) são globosos, de 9 — 13.5 u de diam., desfazendo-se com alguma dificuldade. Conídios elipsoides ou ovoides, hialinos, amarelados ou esverdeados, unicelulares, lisos, 3.8 — 4.5 x 2.5 — 3 u. Fig. 21.

Isolado de raizes apodrecidas de **Carica papaya** L. por Dr. Arnaldo Gomes de Medeiros — Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola — Rio de Janeiro. Cult. nº 717, IMUR. Det. A. Chaves Batista, H. Silva Maia e A. Gomes de Medeiros.

ABSTRACT

The A. A. are presenting in this paper the results of their research in some Moniliales fungi. The following fungi are described as new species, with a new genus: **Allescheriella incognita** Bat. & Maia (saprophyte), **Brachysporiella cordiae** Bat. on **Cordia trichosttoma, Hormisciomyces bellum** Bat. & Carn. on **Vitex sp., Phialetea** n. gen., **aerospora** Bat. & Nasc. on **Amómis caryophyllata, Podosporium dialiumii** Bat. on **Dialium divaricatum** Vahl., **Sarcinella longi-pedunculata** Bat. on **Duranta repens** and **Helminthosporium xylopifolii** Bat. on **Asterina,** over **Xylopia sericea.**

Other olds species are equally analysed, as: **Cladosporium olivaceum** (Corda) Bonard., **Didymobotryum pubescens** (E. & Ell.) Sacc., **Hadrosporium fraserianum** Syd., **Helminthosporium giganteum** Heald & Wolf, **H. maculosum** Sacc., **H. melioloides** Sacc., **H. oryzae** Miyabe & Hori, **H. porothesicolum** F. L. Stevens, **Isaria pulcherrima** Berk & Br. **Nigrospora sphaerica** (Sacc.) Mason, **Septonema hormiscium** Sacc. **Septonema lanuginosum** Tsiklinsky and **Trichoderma glaucum** Abbottt.

Obs.: The A.A. are indebted to Dr. J. A. Stevens, The Fungus National Collections, USA. for the botanical material sent to IMUR, for taxonomic study.

RÉSUMÉ

Les auteurs décrivent les résultats de la recherche dans les champignons Moniliales en présentant de nouvelles espèces et un genre nouveaux: **Allescheriella incognita** Bat. & Maia (saprophytique), **Brachysporiella cordiae** Bat. sur **Cordia trichostoma, Hormisciomyces bellum** Bat. & Carneiro sur **Vitex sp., Phialetea** n. gen. **aerospora** Bat. & Nasc. sur **Amomis caryophyllata, Podosporium dialiumii** Bat. sur **Dialium divaricatum** Vahl., **Sarcinella longi-pedun-**

culata Bat. sur **Duranta repens**, et **Helminthosporium xylopifolii** Bat. sur **Asterina** sur **Xylopia sericea.**

D'autres vieilles espèces sont également analysées comme: **Cladosporium olivaceum** (Corda) Bonard., **Didymobotrym pubescens** (E. & Ell.) Sacc., **Hadrosporium fraserianum** Syd., **Helminthosporium giganteum** Heald & Wolf, **H. maculosum** Sacc. **H. melioloides** Sacc., **H. oryzae** Miyabe & Hori, **H. porothesicolum** F. L. Stevens, **Isaria pulcherrima** Berk & Br., **Nigrospora sphaerica** (Sacc.) Mason, **Septonema hormiscium** Sacc. **S. lanuginosum** Tsiklinski et **Trichoderma glaucum** Abbott.

N.B. — Les auteurs sont en dette de gratitude au Dr. J. A. Stevenson, The Fungus National Collections, USA, pour le matériel botanique envoyé à l'IMUR, pour étude taxonomique.

ERA.

A. CHAVES BATISTA

(129)

ALGUNS DOTHIDEACEAE E PHYLLACHORACEAE ESTUDADOS EM PERNAMBUCO

SEPARATA DA
REVISTA DE BIOLOGIA
1 (3-4): 299-312
1958

REVISTA DE BIOLOGIA

REVISTA BRASILEIRA E PORTUGUESA DE BIOLOGIA EM GERAL

VOL. 1 — 1958 — N.º 3-4

ÍNDICE

1. R. W. G. Dennis — Some *Xylosphaeras* of tropical Africa 175
2. Mário de Carvalho — Experimentação algodoeira Resultados de alguns ensaios . . 209
3. Johanna Döbereiner e Alaides Puppim Ruschel — Uma nova espécie de *Beijerinckia* . 261
4. M. M. Ventura e R. Vieira da Cunha — Acessório para a densitometria direta de eletroforogramas sôbre papel 273
5. A. Chaves-Batista e A. F. Vital — Dois novos gêneros de fungos *Polystomellaceae* . . 280
6. A. Chaves-Batista, H. Silva-Maia e Marie L. Farr — Novos gêneros e novas espécies de fungos *Asterinaceae* 287
7. A. Chaves-Batista — Alguns *Dothideaceae* e *Phyllachoraceae* estudados em Pernambuco 299
8. K. Arens, M. G. Ferri e L. M. Coutinho — Papel do factor nutricional na economia d'água de plantas do *Cerrado* 313
9. A. Chaves-Batista e H. da Silva-Maia — Estudo iconográfico de alguns fungos *Valsaceae* e *Xylariaceae* 325
10. *Noticiário* 333

Os trabalhos deste Número foram escritos ou aceites, para publicar, por: J. Pinto-Lopes (1.), A. Quintanilha (2), H. C. Monteiro (3), M. Ventura (4), A. Chaves-Batista (5, 6, 7, 9), M. G. Ferri (8).

EDITORES

C. CHAGAS
INSTITUTO DE BIO-FISICA
AVENIDA PASTEUR, Nº 458
RIO DE JANEIRO

A. MACHADO
MUSEU DO DUNDO
LUNDA
ANGOLA

J. PINTO-LOPES
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA
DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

F. RESENDE
INSTITUTO BOTANICO
FACULDADE DE CIENCIAS
LISBOA

LISBOA·LOURENÇO MARQUES·LUNDA·RIO DE JANEIRO

ALGUNS DOTHIDEACEAE E PHYLLACHORACEAE ESTUDADOS EM PERNAMBUCO

por

A. CHAVES BATISTA

Instituto de Micologia da Universidade do Recife — Brasil
Publicação N.º 129

(*Recebido em Julho 16, 1958*)

Esta publicação versa sôbre a análise das seguintes espécies de fungos Dothideaceae e Phyllachoraceae: *Sphaerodothis calospora* Syd. sôbre *Danthonia geniculata, Microcyclephaeria* n. gen. Bat. de ascostromas dothideoides, desprovidos de micélio livre, com hipostroma intramatical, ascos parafisados e ascosporos hialodídimos. tendo *M. palmicola* (Syd.) Bat. & Maia como tipo, sôbre *Livistona australis, Munkiodothis melastomata* (Hoehnel) Theiss. & Syd. sôbre *Melastoma malabatricha* L., *Phyllachora alpiniae* Sacc. & Berl. sôbre *Alpinia caerulea, P. bella* Syd. sôbre *Eugenia australis, P. hakeae* P. Henn. sôbre *Hakea pugioniformis, P. melaspilea* Syd. sôbre *Scolopia brownii, P. oplismeni* Syd. var. *maior* Bat. n. var. sôbre *Oplismenus compositus, P. parvicapsa* (Cke.) Theiss. & Syd. sôbre *Acacia falcata.*

SPHAERODOTHIS CALOSPORA Syd.

in Ann. Myc. vol. XXII: 302, 1924

Micélio livre ausente.

Estromas anfígenos, isolados ou 2-3 seriados, 0,25-0,50 mms, de diam., marron — negros, clipeados.

Ascostromas imersos, ocupando todo o mesófilo até à cutícula oposta, coriáceo — carnosos, subglobosos ou elipsóides, 1-loculares, de 148-185 *u* de altura e 145-400 *u* de diam.; clípeo epidermal marron-negro, opaco, de 17-20 *u* de altura; paredes laterais prosopletenquimáticas de 10-14 *u* de espessura, formadas de hifas de 1,5-3 *u* de diâmetro.

Ascos cilindráceos, sésseis ou curtamente estipitados, 8-esporos, 2-tunicados, parafisados, 70-98 × 12-20 *u*; paráfises hialinas, septadas, simples, numerosas de 1,5-2 *u* de diam. Ascosporos elipsóides, ovóides ou subglobosos, contínuos, 11-15 × 9-11 *u*, hialinos a princípio, depois fuscos, de epispório marron-escuro, rugoso e espesso de 1,5-2 *u* de espessura. Fig. 1.

Sôbre fôlhas de *DANTHONIA GENICULATA* — Meningie, South Australia, Leg. L. D. Williams, Jan. 1957. Esp. WARI 7728, cedido gentilmente pelo Dr. C. G. Hansford.



Fig. 1 – SPHAERODOTHIS CALOSPORA Syd.
a) ascostromas sob secção longitudinal
b) asco parafisado
c) ascosporos.
Orig.

MICROCYCLEPHAERIA Bat. n. gen.

Tipo, *M. palmicola* (Syd.) Bat. & Maia n. comb.

Micélio livre ausente.

Ascostromas superficiais, dotideóides, marron-negros, de base séssil, coriáceo-carbonáceos, originários de hipostroma intramatrical. Lóculos imersos. Ascos parafisados, octosporos. Ascosporos hialodídimos, alongados.

Typus *M. PALMICOLA* (Syd.) Bat. & Maia

Mycelio libero nullo.

Ascostromata superficialia, dothideoidea, atrobrunnea, basi-sessilia, coriaceo--carbonacea, ex hypostromate intramatricali efformata. Loculi immersi.

Asci paraphysati, 8-spori. Ascosporae hyalodidymae, elongatae.

MICROCYCLEPHAERIA PALMICOLA (Syd.) Bat. & Maia n. comb.

Sin. DIATRYPELLA PALMICOLA Syd.

in Ann. Myc. vol. XXXV: 32, 1937

Micélio livre ausente.

Estromas superficiais, dotideóides, coriáceo-carbonáceos, gregários, isolados ou confluentes, marron-negros, elipsóides ou irregulares, plano-convexos, 1-2 mms. de diam., 75-105 *u* de altura; paredes subparenquimáticas, de 26-40 *u* de altura, formadas por células poligonais, paralelamente dispostas, de 4-11 × × 3,5-5 *u*. Lóculos imersos, elipsóides, de 38-71 *u* de altura, 165-236 *u* de diam. Fig. 2. Hipostroma intramatrical marron-negro, pseudoparenquimático, densamente ramificado, de estrutura semelhante à do estroma; micélio interno abundante, marron, intracelular, formado de células de 10-22 × × 2-3,5 *u*. Ascos cilindráceo--clavados, 2-tunicados, curtamente pedicelados, 8-esporos, de 120-126 × 8-10 *u*, parafisados. Ascosporos hialinos, fusóide-alongados, 1-septados, conglobados, rectos ou levemente encurvados, polos acuminados, 40-54 × 3,5-4,5 *u*. Fig. 3.



Fig. 2 — MICROCYCLEPHAERIA PALMICOLA Syd. Bat & Maia n. comb. Secção longitudinal de ascostroma.

Fig. 3 — MICROCYCLEPHAERIA PALMICOLA (Syd.) Bat. & Maia n. comb. Asco parafisado e ascosporo. *Orig.*

Sôbre pecíolo de *LIVISTONA AUSTRALIS* Mart. New South Wales. Leg. L. Fraser, X-1934. Tipo, 13010, Instituto de Micologia, Universidade do Recife; isotipo 62, Dep. Bot. University of Sydney.

Obs.: O fungo em tela, cotipo de H. Sydow, fôra determinado como *DIATRYPELLA PALMICOLA* Syd., num engano evidente.

Transpômo-lo, agora, para o novo género *MICROCYCLEPHAERIA* Bat. que situamos próximo ao *MICROCYCLELLA* Theiss, do qual difere, essencialmente por possuir ascos parafisados.

MUNKIODOTHIS MELASTOMATA (Hoehn.) Theiss & Syd.

in Theiss — Syd. Die Dotideales, Ann. Mycol. XIII: 360, 1950.

Estromas epífilos, subcuticulares a epidermais, irregulares, com 0,3-4,5 mms. de extensão, marron-negros, de superfície irregularmente elevada, 180-290 *u* de altura, coriáceo-membranosos, ostiolados; paredes superiores subparenquimáticas, com um clípeo único, de 36-49 *u* de altura; parede inferior de 12-15 *u* de diam., com células parietais indistintas, irregulares, 5-15 × 3-6,5 *u*; lóculos de 1-3, subglobosos, 133-440 × 275-390 *u*, separados por paredes de 51-147 *u* de largura. Fig. 4.

Ascos cilindráceos, sésseis, aparafisados, 1-tunicados, 8-esporos, 44-62 × × 12-17 *u*. Ascosporos hialinos, oblongos, contínuos, dísticos, gutulados, de 13-16 × × 6-8 *u*; no polo inferior, há uma papila de 1,5-2 × 2-2,5 *u*.

Obs.: No interior dos lóculos notam-se hifas subhialinas a marron-claras, septadas, constrictas, com células de 6,5-10 × 3,5-4,5 *u*, forrando tôda a cavidade ascígera. Não observamos paráfises.

Sôbre *MELASTOMA MALABATHRICA* L. — Iweed Heads, New South Wales Leg. L. Fraser, I-936. Det. por H. Sydow. Espec. n.º 184, Dep, Bot. Univ. of Sydney.

PHYLLACHORA ALPINIAE Sacc. et Berl.

In Misc. Myc. II, pag. 5 Syll. Fung. IX: 1022, 1891

Sin: PHYLACHORA ALPINIAE Cook & Massee Grevilleae XVII: 56, 1888

Máculas creme — fusco-negras, isoladas ou confluentes, ligeiramente elevadas na face ventral da folha e escavadas na face dorsal, lineares ou lanceoladas, 5-20 × 2,5-5 mms.

Fig. 4 — MUNKIODOTHIS MELASTOMATA (Hohn) Theiss & Syd.
Ascostroma, ascos e ascosporos.
Orig.

Estromas lineares, epífilos, negros, (á lupa) brilhantes, de superfície irregularmente elevada, rugosa, coriáceos, imersos, alcançando o mesófilo; paredes subparenquimáticas, de células irregulares, marron-negras, 3,5-14 × 2,5-10 *u*. Clípeo único, 44-71,5 *u* de altura.

Lóculos sub-globosos ou piriformes, isolados, de 82-159 *u* de altura e 137-566 *u* de diam; separados por paredes de 38-225 *u* de largura; parede inferior com 12-20 *u* de espessura; ostíolo de 12-20 *u* de diam.

Ascos cilindráceo-clavados, 1-tunicados, curtamente pedicelados, 8 esporos, 85-93 × 14-17 *u*;

Paráfises hialinas, septadas, simples ou ramificadas de 1-1,5 *u* de diam.

Ascosporos elipsóides, hialinos, contínuos, de protoplasma granuloso, monósticos a dísticos, 16-20 × 6-6,5 *u*. Fig. 5.

Sôbre folhas de *Alpinia caerulea* Benth. Mt. Warning, New South Wales. Leg. L. Fraser, I-1936. Det. H. Sydow. Espec. n.° 197, University of Sydney.

Obs. A descrição supra elaboramo-la através do especímen da Univ. of Sydney, que nos foi cedido.

PHYLLACHORA BELLA Syd.

in Ann. Myc. XXXV: 30, 1937

Micélio ausente.

Ascostromas hipófilos, marron-negros, plano-convexos, circulares a lineares, 0,5-1,5 mm de comp. carbonáceos, isolados ou seriados, sub-parenquimáticos, formados por células poligonais arredondadas 8-21,5 × 5,5-13,5 *u*. Altura: 218-279 *u*. Clípeo bastante espesso.

Lóculos globoso-deprimidos, isolados, tendo de 9-25 ascos, 121,5-280 × 85-206,5 *u*; ostíolo cónico, 10-15 *u* de diam. Fig. 6.

Ascos cilindráceos, alongados, 8 esporos, 2 tunicados, curtamente pedicelados, 83,5-108 × 8-11 *u*.

Paráfises simples ou ramificadas, septadas, hialinas, 1-1,5 *u* de diam.

Ascosporos elipsóides, contínuos, lisos, monósticos e dísticos, hialinos, 8-13,5 × 5,5-6,5 *u*.

Sôbre folha de *Eugenia australis* Wendl. National Park, New South Wales. Leg. L. Fraser, X-1933.

Nota: O especímen em tela, n.° 81, cotipo de H. Sydow, University of Sydney, tem ascos e ascosporos mais volumosos do que o indicado na diagnose original.



Fig. 5 – PHYLLACHORA ALPINIAE Sacc. e Berl.
a) Secção longitudinal de ascostromas
b) Asco parafisado
c) Detalhe da estrutura do clípeo
Orig.

PHYLLACHORA HAKEÆ P. Henn

in Engl. Jahrb. XXV: 508, 1898
Syll. Fung. XVI: 618, 1902

Estromas anfígenos, marron-negros, brilhantes, imerso-irrumpentes, aplanados elipsóides ou irregulares, coriáceos, isolados, 660 — 1450 *u* de diam; 300 — 350 *u* de altura. Parede superior formando um clípeo único, fibroso, marron-negro, opaco, de células indistintas, 60 — 100 *u* de altura. Ostíolo de 22 — 27 *u* de diam. Parede inferior constituída por células hialinas de 4,5 — 8 × 2,5 — 6 *u*. Lóculos 2 ou mais, 150 — 200 *u* de alt. e 350 — 600 *u* de diam. Ascos numerosos, cilindráceos, 1-tunicados, octosporos, curtamente pedicelados, 90 — 110 × 8 — 10,5 *u*. Fig. 7.



Fig. 6 — PHYLLACHORA BELLA Syd.
Secção longitudinal de estromas

Paráfises hialinas, simples, contínuas, de 1 — 2 *u*, de diam. Ascosporos hialinos, elipsóides a ovóides, monósticos, em posição inclinada, contínuos, de polos rotundos ou obtusos, 13 — 18 × 5 — 6 *u*.

Sôbre folhas de *Hakea pugioniformis* Cav. National Park, New South Wales. Leg. L. Fraser, Det. H. Sydow, XI — 1935.

PHYLLACHORA MELASPILEA Syd.

in Ann. Mycol. XXXVI: 352, 1937

Estromas solitários ou irregularmente dispersos, não maculícolas, ocupando todo o mesófilo e estendendo-se até à epiderme superior e inferior da folha, marron-negros, coriáceos, de paredes sub-parenquimáticas, com células cilindráceas ou ovóides de 5,5 — 13 × 3 — 6 *u*. Peritéceos monósticos, sub-globosos, hipófilos, depressos, com ostíolo ligeiramente papilado 14,5 *u* de diam. Clípeo epidermal, marron-negro, anfígeno, 12 — 40 *u* de espessura. Lóculos separados por paredes de 33 — 110 *u*, depresso — globosos, 78 — 110 × 231 — 319 *u*. Fig. 8.



Fig. 7 – PHYLLACHORA HAKEAE P. Henn.
a) Estroma contendo 2 lóculos asciferos; secção longitudinal.
b) Asco parafisado e ascosporos.
Orig.



Fig. 8 — PHYLLACHORA MELASPILEA Syd.
a) Lóculos ascígeros observados em secção longitudinal.
b) Asco parafisado e ascosporos.
Orig.

Ascos numerosos, cilindráceo-clavados, curtamente pedicelados, 1-tunicados 8 esporos, 61 — 85 × 12 — 15 *u*.

Paráfises — hialinas, simples, septadas, 1 *u* diam. Ascosporos, oblongo-elipsóides, hialinos, dísticos 12 — 20 × 5 — 7,5 *u*:

Sôbre folhas de *Scolopia brownii* F. v. M. Port. Macquarie, New South Wales. Leg. L. Fraser, 1-1935. Det. H. Sydow.

Obs: Esse especímen, cotipo de Sydow, foi-nos cedido pela Dr.ª Fraser, de New South Wales.

PHYLLACHORA OPLISMENI Syd. var. MAJOR Bat n. var.
in Ann. Mycol. XIII: 450, 1915

Ascostromas anfígenos, imersos, marron-negros, circulares a elipsóides 0,5 mm de diam.

Lóculos epidermais de 2 — 4, sub-globosos, 85 — 145,5 × 60,5 — 85 *u*; clípeo de 16 — 20 *u* de espessura.

Ascos cilindráceos, 1-tunicados, curtamente pedicelados, 8 esporos, 75,5 — — 94,5 × 14 — 19 *u*.

Paráfises simples e ramificadas, hialinas, septadas, 1,5 — 2,5 *u* de diam.

Ascosporos elipsóides a ovóides, contínuos, lisos, monóstícos a dísticos 14 — 19 × 6,5 — 8 *u*.

Sôbre folhas de *Oplismenus compositus* Beauv. National Park, New South Wales. Leg. L. Fraser, XI-934.

A typo differt per loculos minores, ascos et ascosporos majores.

Obs: H. Sydow identificara êsse especímen como *P. oplismeni*; contudo é muito grande a diferença do tamanho dos ascos e dos ascosporos, o que justifica a eleição de uma variedade distinta, como ora fazemos.

PHYLLACHORA PARVICAPSA (Cke.) Theiss. & Syd.
in Ann. Myc. vol. XIII: 488, 1915

Micélio livre ausente.

Ascostromas imersos, anfígenos, gregários, membranosos, isolados, subglobosos, piriformes, de 166 — 360 *u* de altura e 190 — 300 *u* de diam., paredes delgadas, hialinas de células indistintas, de 10 — 13 *u* de diam.; pseudo-ostíolo papilado,



Fig. 9 — PHYLLACHORA PARVICAPSA (Cke) Theiss & Syd.
a) Ascostroma
b) Asco parafisado e ascosporos.
Orig.

com clípeo marron-negro de 22 *u* de altura, formado de células poligonais e arredondadas de 3,5 — 5,5 × 2,5 — 3,5 *u*. Ascos elipsóides, 1-tunicados, curtamente pedicelados, com 8 esporos, de 70 — 80 × 14 — 18 *u*; paráfises filiformes, delgadíssimas, hialinas, contínuas, ramificadas de 0,5 *u* de diam.

Ascosporos elipsóides ou ovóides, hialinos, dísticos ou polísticos, contínuos, rectos ou levemente curvos de 20 — 28 × 7 — 8 *u*. Fig. 9.

Sôbre *ACACIA ALCATA* Willd — Albion Park, New South Wales — L. Fraser, I-935. Det. H. Sydow.

O especímen em tela, foi-nos cedido pela Dr.ª L. Fraser, 16/3/58.

ABSTRACT

The following fungi are studied in this paper : *Sphaerodothis calospora* Syd. on *Danthonia geniculata; Microcyclephaeria*, n. gen. Bat. without free mycelium, and with ascostromata dothideoid, superficial, brownish-black, with intramatrical hypostroma, asci paraphysate and hyalodidymous spores, having *M. palmicola* (Syd.) Bat. & Maia as the type, on *Livistona australis; Munkiodothis melastomata* (Hoehnel) Theiss. & Syd. on *Melastoma melabatricha*, *Phyllachora alpiniae* Sacc. & Berl. on *Alpinia caerulea*, *P. bella* Syd. on *Eugenia australis*, *P. hakeae* P. Henn. on *Hakea pugioniformis*, *P. melaspilea* Syd. on *Scolopia brownii*, *P. oplismeni* Syd. var. *major* Bat. n. var. on *Oplismenus compositus* and *P. parvicapsa* (Cke.) Theiss. & Syd. on *Acacia falcata*.

REVISTA DE BIOLOGIA

A *Revista de Biologia* é uma revista internacional que aceita, para publicação, trabalhos, cujo conteùdo represente progresso na resolução de problemas respeitantes a qualquer ramo da biologia. Trabalhos de compilação só poderão ser aceites se apresentarem pontos de vista novos, ou contribuírem pelo seu aspecto crítico (mas nunca polémico), para o estímulo da investigação.

Só excepcionalmente serão aceites trabalhos contendo mais do que 50 páginas, incluíndo figuras. As figuras serão limitadas ao mínimo indispensável. Todos os Autores do Ultramar devem reter cópia do manuscrito. As provas são enviadas por avião não acompanhadas do original, que será remetido junto com as separatas.

O Autor, ou Autores, de cada trabalho recebem 50 exemplares grátis. Emendas feitas nas provas, além dos erros tipográficos, serão onerados aos Autores.

Os originais serão enviados a qualquer dos redactores ou editores que os poderão aceitar sem alterações, ou propor alterações sem as quais o trabalho não poderá ser impresso.

Para a secção *Noticiàrio* aceitam-se de bom grado críticas de livros e principalmente de grupos de trabalhos, cuja articulação em conjunto contribua para a clareza na compreensão dos problemas em causa, auxiliando assim a sua resolução. Referência sucinta a acontecimentos (viagens, descobertas, falecimentos, etc.), que interessam à biologia serão também insertos nesta secção.

*

* *

This is an international journal publishing work in any branch of the biological sciences. Reviews will only be accepted if they present a new approach or may stimulate further research by their critical (but not controversial) nature.

As a rule, papers should not exceed 50 pages, including plates, and these must be reduced to a minimum.

Overseas contributors should keep a copy of their original manuscript as this will not accompany the air-mailed galley proofs; the manuscripts will be returned with the reprints. Contributors are entitled to 50 reprints free of cost. Authors are asked to reduce corrections in the proof to typographical errors; excessive corrections will be charged to the authors.

Manuscripts submitted to the editors may be subject to alterations before being accepted for publication.

The section of *notices* will gladly accept reviews on books and especially on groups of related papers whose combined results provide a clearer insight of the problem under review. Brief notes on expeditions, discoveries, etc. of biological interest may also be included in this section.

COMPOSTO E IMPRESSO NA TIPOGRAFIA MATEMÁTICA, LDA. — RUA DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 134, 1.º, ESQ. — TELEF. 29449 — LISBOA

FASCÍCULO ENCERRADO
EM 27-12-1958

ESTA REVISTA É MANTIDA PELA RUBRICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS INSTITUTOS BOTÂNICO DE LISBOA E DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE MOÇAMBIQUE

HERB.

A. CHAVES-BATISTA e H. DA SILVA-MAIA

130

ESTUDO ICONOGRÁFICO DE ALGUNS FUNGOS VALSACEAE E XYLARIACEAE

SEPARATA DA
REVISTA DE BIOLOGIA
1 (3-4): 325-332
1958

COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE
8 OCT 1959

REVISTA DE BIOLOGIA

REVISTA BRASILEIRA E PORTUGUESA DE BIOLOGIA EM GERAL

VOL. 1 — 1958 — N.º 3-4

ÍNDICE

1. R. W. G. Dennis — Some *Xylosphaeras* of tropical Africa 175
2. Mário de Carvalho — Experimentação algodoeira Resultados de alguns ensaios . . 209
3. Johanna Döbereiner e Alaides Puppim Ruschel — Uma nova espécie de *Beijerinckia* . 261
4. M. M. Ventura e R. Vieira da Cunha — Acessório para a densitometria direta de eletroforogramas sôbre papel 273
5. A. Chaves-Batista e A. F. Vital — Dois novos gêneros de fungos *Polystomellaceae* . . 280
6. A. Chaves-Batista, H. Silva-Maia e Marie L. Farr — Novos gêneros e novas espécies de fungos *Asterinaceae* 287
7. A. Chaves-Batista — Alguns *Dothideaceae* e *Phyllachoraceae* estudados em Pernambuco 299
8. K. Arens, M. G. Ferri e L. M. Coutinho — Papel do factor nutricional na economia d'água de plantas do *Cerrado* 313
9. A. Chaves-Batista e H. da Silva-Maia — Estudo iconográfico de alguns fungos *Valsaceae* e *Xylariaceae* 325
10. *Noticiário* 333

Os trabalhos deste Número foram escritos ou aceites, para publicar, por: J. Pinto-Lopes (1.), A. Quintanilha (2), H. C. Monteiro (3), M. Ventura (4), A. Chaves-Batista (5, 6, 7, 9), M. G. Ferri (8).

EDITORES

C. CHAGAS
INSTITUTO DE BIO-FISICA
AVENIDA PASTEUR, Nº 458
RIO DE JANEIRO

A. MACHADO
MUSEU DO DUNDO
LUNDA
ANGOLA

J. PINTO-LOPES
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA
DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

F. RESENDE
INSTITUTO BOTANICO
FACULDADE DE CIENCIAS
LISBOA

LISBOA·LOURENÇO MARQUES·LUNDA·RIO DE JANEIRO

ESTUDO ICONOGRÁFICO DE ALGUNS FUNGOS VALSACEAE E XYLARIACEAE

por

A. CHAVES-BATISTA

e

H. DA SILVA-MAIA

Instituto de Micologia da Universidade do Recife — Brasil

Publicação N.º 130

(*Recebido em Julho, 16, 1958*)

Condensam-se, neste trabalho, os resultados que obtivemos com o estudo de alguns fungos Valsaceae e Xylariaceae, de ocorrência infrequente.

Dessa forma são identificados e redescritos *Diaporthe ailanthi* Sacc. sôbre especímen de *Wistaria*, colectado na Austrália, *Valsaria subcoccodes* (Speg.) Bat. n. comb. sôbre *Dalbergia variabilis*, *Hypoxylon truncatum* (Schw. ex Fr.) Mill. sôbre *Protium heptaphyllum*, colectado em Pernambuco, Brasil, e *Xylobotryum coralloides* Syd., analisado sôbre o cotipo de Sydow, em *Ackama muelleri*, ainda colectado na Austrália.

DIAPORTHE AILANTHI Sacc.

in Sacc. I: 621, 1882

Micélio livre ausente.

Colónias negras, efusas. Estromas valsóides, corticais, marron-negros, epidérmicos, efusos, coriáceo-lenhosos, de 33-50 *u* de altura, formados por células indistintas. Peritécios marron-negros, gregários (5-6) ou isolados, imersos, irrumpentes, coriáceo-membranosos, longamente rostrados, rostro de 700-965 *u* de altura e 130-154 *u* de diam. globoso-deprimidos, de 360-450 *u* de diam.; paredes subparenquimáticas, de 19-24,5 *u* de diam., formadas por células poligonais, de 5-11 × 3,5-6 *u*; lóculo ascígero, globoso a subgloboso, revestido de perifisis, de 22-30 *u* de diâmetro. Ascos elipsóides a cilindráceo-fusóides, 1-tunicados, sésseis, 8-esporos, aparafisados, de 39-50 × 7-9 *u*. Ascosporos hialinos, oblongo-fusóides, 1-septados, constrictos, 4-gutulados, dísticos, de polos obtusos, de 12-15 × 3-4 *u*. Fig. 1.

Picnídios agregados aos peritécios, imersos, astomos, coriáceo-membranosos, subglobosos ou irregulares, de 130-280 × 150-380 *u* de alt.; paredes subparenquimáticas, de 14-22 *u* de espessura, formadas por células poligonais, de 2,5-4,5 × 2,5-3,5;



Fig. 1 — DIAPORTHE AILANTHI Sacc.
a) Peritécios e picnídio.
b) Asco e ascosporos.
Orig.



Fig. 2 — DIAPORTHE AILANTHI Sacc.
Picnídio, em secção longitudinal.
Orig.

conidióforos em todas as paredes do picnídio, lageniformes, hialinos, contínuos de 12-25 × 1,5-2 u. Picnidiosporos acrógenos, solitários, hialinos, gutulados, ovóides, contínuos, de 4,5-7 × 1,5-2,5 u. Fig. 2.

Sôbre córtex de *WISTARIA*. Leg. M. V. Carter, 3.1957. Adelaide, Austrália do Sul. Espec. WARI, n.º 7784, e 13.005, Instituto de Micologia, Universidade do Recife, doado por C. G. Hansford, com a etiqueta de *DIAPORTHE*.

VALSARIA SUBCOCCODES (Speg.) Bat. n. comb.

Sin: *Roussoella subcoccodes* Speg.

Speg. — *In* F. Puig. I, pag. 549
Sacc. — *in* Syl. Fung. IX: 1045, 1891
Th. & Syd. *in* Ann. Myc. XIII: 186, 1915
Sin: *Munkiella pulchella* Speg.
Speg. *in* Syll. Fung. IX: 1035, 1891
Cocconia machaerii P. Henn.
P. Henn. *in* Hedwigia XLI: 112, 1902
Sacc. — in Syll. Fung. XVIII: 160, 1906

Estromas epífilos, sub-cuticulares a princípio, depois irrumpentes, pulvinados, conoides, de base plana, isolados, 1 1,5 mm de diam., ou gregários, até 3 mms de diam., 438-543 *u* de altura, de papila quási indistinta, negros, superfície áspera, carbonáceos, pluriloculares; a substância estromática é pseudo-parenquimática, formada por células poliédricas, de 3.5-17 *u* de comprimento na maior dimensão; partindo dessa substância, desenvolvem-se massas de hifas hialinas, que se aprofundam no tecido foliar. Pseudotécios dispostos num só plano, globosos ou de forma irregular, por pressão mútua, 196-371 *u* diam., Fig. 3-a-b; perídio delgado, marron, de estrutura fibrilar, 10-17,5 *u* de espessura; ostíolos cilindráceos, 135-168 × 55-90 *u*, perifisados. Fig. 4, a.

Ascos cilindro-clavados, 45 — 58 × 13 — 17 *u*, octosporos, pedicelados, membrana dupla, nos ascos jovens, desaparecendo muito cedo, entretanto.

Paráfises filiformes, ramificadas e septadas, tornando-se gelatinosas.

Ascosporos elipsoides, hialinos depois marron, com um septo que divide o esporo em células desiguais, sendo maior a superior; polos um pouco truncados, principalmente o inferior, dísticos, fragmentários, no septo, 8 — 11 × 4 — 5 *u*. Fig. 4, b.

Sôbre folhas de *Dalbergia variabilis*.

São Francisco — Brasil — E. Ule, 1885.

Fig. 3 — *Valsaria subcoccodes* (Speg.) Bat.
a) Primórdio do estroma ascígero.
b) Secção longitudinal do estroma observando-se detalhes da constituição do pseudotécio.



Fig. 4 — *Valsaria subcoccodes* (Speg.) Bat.
a) Secção longitudinal do estroma.
b) Asco evanescente e ascosporos.

Tipo, n.º 3461, ex Rabenhorst — Winter, Fungi Europaei, in New York Botanical Garden.

Est *Valsaria* per pseudothecia stromatica, longo-ostiolata et ascosporos 1-septatos, brunneos.

Também analisamos os especimens 3470, ex Rabenhorst — Winter, Fungi Europei, sôbre Leguminosa indet e o de n.º 3246, ex Romeguère, Fungi Gallici exsicati, coletado por B. Balansa, Maio 1881, em Guarapi, Paraguai, sôbre Leguminosa arborescente.

Êsses especimens ora pertencem a New York Botanical Garden, que no-los cedeu para a presente investigação.

Nota: Agradecemos ao Dr. A. Fernandes Vital, pelo auxílio que nos prestou no estudo dêste fungo.

HYPOXYLON TRUNCATUM (Schw. ex Fr). Mill.

In Bothalia, Vol. IV. Part II: 254, 1942.

Micélio livre ausente. Estromas pulvinados ou efusos, carbonáceos, marron, depois negros, superficiais, de 2 — 3,5 mm de diam. e 1 — 2 mm. de altura; tuberculares hemisféricos, irregulares ou aplanados, gregários ou espalhados; hipostroma penetrando profundamente a matriz, formado por células cilindráceas ou sub-globosas, marron, de 5 — 7 × 3,5 — 4,5 *u*. Peritécios imersos ou mesmo livres, ovoides, marron-negros, carbonáceos, isolados ou confluentes de 530 — 710 *u* de altura e 500 — 700 *u* de diam; ectostroma produzindo disco anelar ao redor do ostíolo papilado, de 10 — 17 *u* de diam. O ectostroma é opaco de 36 — 98 *u* de diam, marron-negro; endostroma hialino, constituido por células poligonais de 7,5 — 20 × 2,5 — 10 *u*; lóculo ascígero de 400 — 600 *u* de altura e 460 - 580 *u* de diam. Fig. 5.

Ascos cilindráceos, longamente pedicelados, 1-tunicados, 8 esporos, numerosos de 63,5 — 110 × 3,5 — 6 *u*; paráfises, filiformes hialinas, simples de 0,5 *u* de diam. Fig. 6.

Ascosporos hialinos a princípio, depois marron, contínuos, ovoides, levemente encurvados, monósticos, de 6,5 — 9 × 3 — 3,5 *u*. 1-gutulados.

Sôbre *Potrium heptaphyllum* (Aubl.) March. Caruarú — Pern. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 4/4/58. Espec. n.º 13030, Instituto de Micologia, Univ. do Recife.



Fig. 5 – HYPOXYLON TRUNCATUM (Schw. ex Fr.) Mill
Secção longitudinal de peritécios.
Orig.

XYLOBOTRYUM CORALLOIDES Syd.

In Ann. Mycol. XXXVI: 297, 1938

Estromas irregularmente dispersos ou gregários, irrumpentes, eretos, 4 — 6 mms de altura e 0,5 — 1 mm de diam, marron-negros, de base cilíndrica, ramificando-se no ápice em 2 — 3 ramos, coraloides, onde se formam numerosos peritécios botriosos, agregados, ovoides a sub-globosos, glabros, marron-negros com 650 — 100 *u*. de diam. coriáceo-gelatinosos, Fig. 7. Lóculos ascígeros de 650 — 800 × 500 — 660 *u*, paredes sub-parenquimáticas, 122 — 195 *u* de diam, formadas de 2 camadas de células bem distintas: uma externa, de células poligonais, marron-negras de 16 — 24,5 × 5.5 — — 36 *u*; outra interna, de células sub-globosas, sub-hialinas ou marron-claras com 6,5 — 11 × 3 — 6 *u*. Ostíolo pertuso com 25 — 35 *u* de diam. Ascos numerosos, cilindráceo-clavados, 8 esporos, 1-tunicados, longamente pedicelados, 66 — 75 × 7 — 8,5 *u*; paráfises hialinas, septadas, numerosas, simples, 1 — 1,5 *u* de diam. Ascosporos oblongos, oblongo-elipsoides ou fusoides, monósticos ou dísticos, marron, 1 septados, polos rotundos, 7 — 13 × 3 — 4,5 *u*. Fig. 8.

Sôbre córtex de *Ackama muelleri* Benth. Salisbury, New South Wales. L. Fraser, VIII, 1935. Det. H. Sydow.

Obs.: O especímen que nos serviu ao presente estudo é cotipo de Sydow e foi-nos cedido pela Dr. L. Fraser, de New South Wales.

Fig. 6 — HYPOXYLON TRUNCATUM (Schw. ex Fr.) Mill
Ascos parafisados e ascosporos.

ABSTRACT

This paper deals with the identification or revision of the following fungi: *Diaphorte ailanthi* Sacc. on *Wistaria, Valsaria subcoccodes* (Speg.) Bat. n. comb. on *Dalbergia variabilis, Hypoxylon truncatum* (Schw. ex Fr.) Mill. on *Protium heptaphyllum* and *Xylobotryum coralloides* Syd. on *Ackama muelleri.*

Obs.: Os A. A. agradecem a ilustração que lhes preparou M. L. Nascimento.

Fig. 8 – XYLOBOTRYUM CORALLOIDES Syd.
Ascos parafisados e ascosporos.
Orig.

Fig. 7 – *Xylobotrium coralloides Syd.*

REVISTA DE BIOLOGIA

A *Revista de Biologia* é uma revista internacional que aceita, para publicação, trabalhos, cujo conteúdo represente progresso na resolução de problemas respeitantes a qualquer ramo da biologia. Trabalhos de compilação só poderão ser aceites se apresentarem pontos de vista novos, ou contribuírem pelo seu aspecto crítico (mas nunca polémico), para o estímulo da investigação.

Só excepcionalmente serão aceites trabalhos contendo mais do que 50 páginas, incluíndo figuras. As figuras serão limitadas ao mínimo indispensável. Todos os Autores do Ultramar devem reter cópia do manuscrito. As provas são enviadas por avião não acompanhadas do original, que será remetido junto com as separatas.

O Autor, ou Autores, de cada trabalho recebem 50 exemplares grátis. Emendas feitas nas provas, além dos erros tipográficos, serão onerados aos Autores.

Os originais serão enviados a qualquer dos redactores ou editores que os poderão aceitar sem alterações, ou propor alterações sem as quais o trabalho não poderá ser impresso.

Para a secção *Noticiário* aceitam-se de bom grado críticas de livros e principalmente de grupos de trabalhos, cuja articulação em conjunto contribua para a clareza na compreensão dos problemas em causa, auxiliando assim a sua resolução. Referência sucinta a acontecimentos (viagens, descobertas, falecimentos, etc.), que interessam à biologia serão também insertos nesta secção.

*

* *

This is an international journal publishing work in any branch of the biological sciences. Reviews will only be accepted if they present a new approach or may stimulate further research by their critical (but not controversial) nature.

As a rule, papers should not exceed 50 pages, including plates, and these must be reduced to a minimum.

Overseas contributors should keep a copy of their original manuscript as this will not accompany the air-mailed galley proofs; the manuscripts will be returned with the reprints. Contributors are entitled to 50 reprints free of cost. Authors are asked to reduce corrections in the proof to typographical errors; excessive corrections will be charged to the authors.

Manuscripts submitted to the editors may be subject to alterations before being accepted for publication.

The section of *notices* will gladly accept reviews on books and especially on groups of related papers whose combined results provide a clearer insight of the problem under review. Brief notes on expeditions, discoveries, etc. of biological interest may also be included in this section.

COMPOSTO E IMPRESSO NA TIPOGRAFIA MATEMÁTICA, LDA. — RUA DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 134, 1.º, ESQ. — TELEF. 29449 — LISBOA

FASCÍCULO ENCERRADO
EM 27-12-1958

ESTA REVISTA É MANTIDA PELA RUBRICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS INSTITUTOS BOTÂNICO DE LISBOA E DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE MOÇAMBIQUE

Atas do IMUR
Ano I, págs. 275-281, 1960

ALGUNS **HYALOPUS** ASSINALADOS SÔBRE SUCO GÁSTRICO E BILE HUMANA, NO RECIFE (*)

A. CHAVES BATISTA
J. AMÉRICO DE LIMA
S. DIOSCÓDIO DE OLIVEIRA
R. C. ARTAGAVEYTIA - ALLENDE (*)

Os A. A. relatam as conclusões de suas pesquisas sôbre o assinalamento de fungos do gênero **Hyalopus**, no suco gástrico e na bile humana.

A presente comunicação resulta de 8 casos isolados de bile humana, obtidos por cateterismo duodenal e 2 assinalamentos no suco gástrico. Tôdas as amostras foram isoladas com relativa facilidade, nos meios comuns de laboratório, acrescidos de antibióticos, particularmente a acromicina, afim de evitar o desenvolvimento de organismos bacterianos.

Foram assinaladas então as seguintes espécies: **Hyalopus acremonium** (Fres.) S. Barbosa, **H. keratoplasticum** (Morikawa) S. Barbosa, **H. onychophilus** (Vuill.) Asch. e **H. serrae** (Maffei) S. Barbosa.

(*) Do Lab. Botanico da Faculdade de Humanidade y Ciencias — Montevideo — Uruguay.

HYALOPUS ACREMONIUM (Fresenius) S. Barbosa

Barbosa, F.A.S. **in** Subsídios para o estudo parasitológico do gênero **Hyalopus**, Corda 1838, Recife, p. 33, 1941.

Sin.: **Cephalosporium acremonium** Fresenius
Saccardo P. A. **in** Michelia — Patavii Typis Seminarii, v. II, p. 456, 1882.

(*) Publicação nº 131

Rabenhorst's, L. Krypptogamen-Flora Leipzig, Verlag von Eduard Krummer, v. VIII, p. 103, 1907.

Colônias sôbre sab-dextrose-agar. com 13 dias de desenvolvimento, apresentando côr róseo-clara, circular, com ramificações imersas em tôda a superfície inferior, aspecto cremoso, bordos ramosos, plana, com pequena elevação mamilar, medindo 8 cm. de diâmetro. Reverso liso, côr róseo-clara. Ausência de exsudato.

Colônias sôbre Czapeck-agar com 13 dias de desenvolvimento, apresentam-se de côr róseo-clara, arborescentes, aspecto cremoso compacto, bordos ramosos, imersas, aflorando à superfície, planas, levemente mamiladas, medindo 2 cm. de diâmetro. Reverso liso, de côr rósea. Não apresentam exudatos.

Micélio hialino, densamente disposto, com hifas ramificadas ou simples, septadas, não constrictas, cilíndricas, com 3,5 — 5,4 u de diâmetro.

Conidióforos curtos ou longos, septados, medindo até 67,5 x 1,5 — 2,5 u.

Cabeças globosas, hialinas com 10 — 18 u de diâmetro. Conídios hialinos, unicelulares, falciformes a cilíndricos, com 8 — 3 x 2,7 — 1,5 u. Clamidosporos hialinos, intercalares ou terminais, globosos, medindo 8 — 16 u de diam.

Obs.: Penzig descrevendo a forma "major" apresenta maiores dimensões em alguns elementos microscópicos. São as seguintes: Conídios = 4,5 — 5 x 2 — 2,5 u

Hifas = 3 — 3,5 u
Cabeças = 12 — 18 u

Isolado de suco gástrico, obtido por tubagem, de N. G., Leg. Dr. Astier Moutinho, 28-1-58. Cepa 1033 no IMUR.

HYALOPUS KERATOPLASTICUM (Morikawa) S. Barbosa

Sin. **Cephalosporium keratoplasticum** Morikava
Barbosa, F.A.S. — **in** "Subsídios para o estudo parasitológico do gênero **Hyalopus** Corda 1838, Recife, p. 18, 1941.

Colônias em Batata — Dextrose — Agar, aos 7 dias de cultivo e à temperatura de 26 — 27° C, se apresentam planas, de micélio submersamente desenvolvido, circulares, róseas, com sector branco, de hifas aéreas. Aspecto úmido.

Bordos filamentosos. Medem de 5 — 6,5 cm. de diam. Reverso plano, liso, de côr rósea.

Micélio hialino, septado, ramificado, com dilatações em forma de raqueta, com 3 — 5,5 u diam.

Conidióforos simples, hialinos, suportando 1 conídio na extremidade, ao se desfazerem as cabeças, com 10 — 40 x 2,5 — 3 u.

Conídios hialinos, falcoides 1 — 2 septados, lisos, 5 — 27 x 2,5 — 5 u.

Cabeças conidiais hialinas, globosas a sub-globosas, 16 — 21 x 10 — 13,5 u.

Clamidosporos — intercalares ou terminais, isolados ou 2 a 2, com 3 — 8 u diam.

Isolado de suco gástrico obtido por tubagem, de A.P.C., leg. dr. Dioscódio de Oliveira, 3-12-57. Cepa 975, no IMUR.

HYALOPUS ONYCHOPHILUS (Vuillemin) Aschieri

Aschieri, E. **in** Atti. Ist. Bot., R. Univ. Pavia Ser. IV, v. 3, pp. 45-63, 1932.

Sin.: **Allantospora onychophila** Vuillemin
Vuillemin, Paul **in** Les champignons parasites et les mycoses de l'homme — Paris, p. 63, fg. 32, 1931.



FIG. 1

HYALOPUS ONYCHOPHILUS (Vuill.) Aschieri

Conidióforo curto, apresentando capítulo com conídios unicelulares.

Orig.

Colônias sôbre Sabouraud-dextrose agar com 14 dias de desenvolvimento à temperatura ambiente (26 — 28° C) apresentam-se circulares, feltrosas, côr branca inicialmente, tomando uma coloração violácea do centro para a periferia, com o envelhecimento, planas, de bordos regulares, inodoras, com escasso exsudato hialino em tôrno do centro, 7,5 — 8 cm diam., reverso amarelo cremoso com tonalidades violáceas.

Micélio submerso frouxo, de hifas cilíndricas regulares, pouco anastomosadas, hialinas. Micélio aéreo denso, com hifas regulares ou sinuosas, simples ou ramificadas, hialinas, 3,5 — 5 diam.

Conidióforos laterais curtos, pouco septados, dispostos quase em ângulo reto, simples, 0 — 48 x 2 — 3 u.

Conídios em capítulos globosos de vários esporos, 30 — 45 u diam. que se desarticulam com facilidade, cilíndricos a falciformes, 0 — 1 septo, mas geralmente unicelulares, hialinos, 6 — 25 x 2,5 — 6 u. Fig. 1.

Sôbre Czapek-agar as colônias se desenvolvem em condições idênticas, variando apenas a coloração, que se torna mais escura nas primeiras semanas de crescimento.

Os caracteres morfológicos não sofrem modificações apreciáveis.

Isolado de bile humana, obtida por cateterismo duodenal, de M.S.D., Leg. Dr. Astier Moutinho, 10-4-58. Cepa 1148 no IMUR.

Isolado de bile humana, obtida por cateterismo duodenal, de P.F.C., Leg. Dr. Torlando Fraga, 10-4-58.

HYALOPUS SERRAE (Maffei) Simões Barbosa

Barbosa, F.A.S. — **in** Subsídios para o estudo parasitológico do gênero **Hyalopus** Corda, 1838 — Recife, p. 19, 1941.

Sin.: **Cephalosporium serrae** Maffei
Maffei, L. — **in** Atti. Ist. Bot. R. Univ. Pavia, Ser. IV, v. I, pp. 183-196, 1929.

As colônias sôbre sab. dextrose-agar, com 13 dias de desenvolvimento, apresentam-se de côr róseo-amarelada, circular, aspecto feltroso, estriada, bordos ciliados, planas, medindo 8 cm. de diâmetro, sem exudato. Reverso liso, amarelo cremoso.

Colônias sôbre Czapek, à temperatura ambiente, com 13 dias de desenvolvimento, apresentam-se arborescentes, róseo-

claras, planas, úmidas em tôda a superfície, semi-imersas, de bordos ramosos, medindo 7,5 cm. de diâmetro. Reverso liso, amarelo, cremoso.

Micélio emaranhado, com hifas hialinas, septadas, não constrictas, medindo 2,5 — 4 u de diâmetro.

Conidióforos curtos ou longos, septados, simples ou ramificados, 0 — 43,2 x 2,5 — 4 u. Fig. 2.



FIG. 2

HYALOPUS SERRAE (Maffei) Simões Barbosa

Diferentes aspectos de conidióforos e conídios.

Orig.

Conídios elípticos a falciformes, 1-septados, hialinos, agrupados no tôpo dos conidióforos, medindo 3 — 13,5 x 2,5 — 5,4 u. Fig. 3.

Clamidosporos numerosos, geralmente intercalares, globosos, hialinos, 8 — 10,5 u diam.

Capítulos globosos, 13,5 — 19 u diam.

Isolado de bile humana obtida por cateterismo duodenal, de E. T. S., Leg. Dr. Astier Moutinho, 17-1-58. Cepa 1031, no IMUR.

Isolado de bile humana, obtida por cateterismo duodenal, de N. G. Leg. Dr. Astier Moutinho, 28-1-1958. 1031, no IMUR.



FIG. 3

HYALOPUS SERRAE (Maffei) Simões Barbosa

Conidióforos e conídios.

Orig.

Isolado de bile humana, obtida por cateterismo duodenal, de E. M. Leg. Dr. Dioscódio de Oliveira, 13-3-1958 — Cepa 1031, etc.

Bibliografia: "Subsldios para o estudo parasitológico do gênero Hyalopus — Fred. Simões Barbosa" — Tese — Recife. Atti Istit. Bot. Univ. Pavia, I — pág. 19, 1941; 183, 1929.

RESUMEN

Los autores comunican sus observaciones de la presencia de hongos pertenecentes al genero **Hyalopus** en la bilis y jugo gastrico humanos.

En la presente comunicación se señala que fueron aislados en 8 casos de bilis humana obtenida por cateterismo duodenal y 2 veces de jugo gastrico.

En todos los casos el aislamiento fué relativamente facil, em-

pleandose los medios comunes de laboratorio, adiccionandoles antibioticos, principalmente acromicina, con la finalidad de evitar el desarrollo de germenes bacterianos.

Se describen los estudios morfológicos realizados, constatandose la presencia de 4 especies del genero **Hyalopus.**

RÉSUMÉ

Les auteurs rélatent l'occurrence du champignon **Hyalopus** dans la bile humaine et dans le suc gastrique. Ils ont étudié 8 échantillons isolés de la bile humaine provenant de cathéterisme duodénal et 2 signalement dans le suc gastrique. Tous les cas ont été isolés dans les milieux communs de laboratoire avec des antibiotiques, particulièrement l'acromicine pour eviter le développement d'autres microorganismes. Ils ont décrit les études morfologiques en résultant la présence de 4 espèces diférentes.

ABSTRACT

The genus **Hyalopus** was found by the authors in human bile and gastric juice; 8 cases of bile collected by duodenal cateterism and 2 in gastric secretion.

All of them grew perfectly well in artificial laboratory media with antibiotics, mainly in acromicine, which were used to prevent bacterial development. Four species of this genus are described hereby.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 283-303, 1960

ASCOMYCETES VULGARES OU NOVOS (*)

A. CHAVES BATISTA
H. DA SILVA MAIA
M. L. NASCIMENTO

Agrupam-se neste trabalho distintos Ascomycetes do mais variado interêsse. Contudo, o objetivo principal dos autores consiste em apresentar suas conclusões sôbre o re-exame de antigas espécies, que lograram analisar, do ponto de vista de suas características taxonômicas, juntando-se a isso a descrição de um novo gênero e de novas espécies e novas combinações.

São tratados, aqui, os seguintes fungos: **Actinomyxa australiensis** Syd., **Byssochlamys nivea** Westl., **Corynelia uberata** Fries ex Acharius, em seu estádio imperfeito, **Eumela usterii** Bat. & Maia n. sp., então impròpriamente identificado como **Asterella trichodea** Rehm, **Metasphaeria stypheliae** Hansf., **Nectria trachylaena** Syd., **Parodiopsis orbignyae** Bat. & Nasc. n. sp., **Phaeochorella parinarii** (P. Henn.) Theiss. & Syd., **Trichosphaeropsis** n. gen. Bat. & Nasc. com a espécie tipo **T. crescentiae** Bat. & Nasc. e **Tryblidiella fusca** E. & E.

PHACIDIACEAE

Actinomyxa australiensis Syd.
in Ann. Mycol. XV: 146, 1917
Syll. Fung. XXIV: 533

Micélio externo ausente. Ascomas hipófilos, separados, superficiais, membranosos, assentes sôbre os pêlos foliares, globoso-depressos, 250-360 u de diam., 98 — 120 u de altura, negros, de paredes radiadas, 15 — 42.5 u de espessura, apresentando a parte superior amplamente aberta

(*) Publicação nº 132

por dissolução ou tombamento de tecido, e formado por hifas marron, de septação indistinta, 2.5 — 6.5 u de diam., Fig. 1. Ascos cilindro-clavados, 55 — 62.5 x 7.5 — 11 u,



FIG. 1

ACTINOMYXA AUSTRALIENSIS Syd.

a-b — Ascostromas sob córtes longitudinais.

Orig.

pedicelo até 37 u, conoide, octosporos, bitunicados; paráfises ramificadas e septadas, 1 — 1.5 u de diam. Ascosporos clavados, 18 — 22.5 x 2— 4 u, hialinos, 3-septados, transversalmente, dísticos, não constrictos. Fig. 2.

FIG. 2

ACTINOMYXA AUSTRALIENSIS Syd

Asco e paráfise.

Sôbre folhas de **Lasiopetalum ferrugineum** var. **cordatum** — Monte Wilson, Austrália. Leg. Maiden & J. Bornmüller, Out. 1899. Tipo ex Herb. Haussknecht, ex Herb. Syd. Êsse especímen foi-nos cedido para uma revisão, pelo Bot. Mus. Stockhl. A. Chaves Batista & A. F. Vital, 13-4-957.

BYSSOCHLAMYS NIVEA Westl.

in Svensk Bot. Tids. 3: 134, 1909.

Aos 10-12 dias e à temperatura ambiente de 26-28° C sôbre Czapek-agar, malte-agar e "steep-corn"-agar desenvolvem-se colônias brancas, lanosas, de textura frouxa, de 8.5 — 9 cm. de diam., efusas, sem exsudato e inodoras, de reverso branco-creme; à superfície das colônias, à lupa, observam-se pontuações que são conglomerados ou cachos de ascos. Em batatinha-dextrose-agar as colônias mostram-se mais ricas de ascos. O micélio aéreo é hialino, constituido por hifas septadas, densamente ramificadas, constrictas eventualmente, em geral sinuosas, de membrana lisa, 2 — 5 u de diam. Conidióforos filamentosos, curto-decumbentes, hialinos, produzem conídios terminais, amarelados, ovoides, lisos, de epispório distinto, 3 — 7 x 3 — 5 u, às

vêzes em longas cadeias acrópetas. Hifas alongadas, da superfície das colônias, filamentosas, pouco ramificadas, originam na sua extremidade livre clamidosporos piriformes, isolados ou em cadeia, de paredes espessas e às vêzes dotadas de expansões irregulares, hialinos, a princípio, depois amarelo-oliváceos, 6 — 12 x 4 — 10 u, lisos. As hifas ascó-



Orig.

FIG. 3

BYSSOCHLAMYS NIVEA Westl.

Conglomerados de ascos, em Czapek-agar.

1000 x

genas Fig. 3, crescem de modo limitado e dão formação lateralmente e no tôpo, a cachos de ascos sub-globosos ou ovoides, Fig. 4, não tunicados, octosporos, lisos, 6.5 — 12 u em nosso material, os quais, por sua frequência em hifas próximas, compõem verdadeiros conglomerados. Ascosporos ovoides ou elipsoides, unicelulares, lisos, 3.5 — 5 x 3 — 4 u, hialinos.

Isolado de essência de caju, em garrafas que sofreram esterilização comercial.

Leg. I. Hollanda Lima, Fortaleza, Ceará, 17-1-56. Det. A. Chaves Batista e H. Silva Maia.

FIG. 4

BYSSOCHLAMYS NIVEA Westl. Strain 658 I.M.U.R.

a) ascos; b) ascosporo; c) conidióforos e conídios; d) porção de catênulas de conídios; e) conídios; f) clamidosporos terminais; g) clamidosporo de paredes irregularmente expandidas.

Orig.

CORYNELIA UBERATA Fries ex Acharius

in Systema Mycologicum 2:535, 1822
Mycologia, XII, 5: 247 — 253, 1950.

Micélio livre ausente. Picnostromas superficiais hipófi-

los, isolados ou confluentes, gregários, caulícolas e folícolas, homogêneos, negros, coriáceos, multilobados, erectos, de 1.000 — 1.660 u de diam. e 550 — 720 u de altura, reunidos a um pé central estromático de 300 — 650 u de diam. cilindráceo, penetrando até o mesófilo, numa profundidade de 150 — 380 u, e ramificando-se na porção basal, com hifas hialinas, septadas, células poligonais e arredondadas, de 3,5 — 8 x 2,5 — 5 u, distribuidas intercelularmente; paredes



FIG. 5

CORYNELIA UBERATA Fr. ex Acharius

Secção longitudinal de picnostromas.

Orig.

estromáticas formadas por células poligonais, paralelamente dispostas, de 5 — 14 x 4,5 — 10 u; lóculos picnidiais, imersos, subglobosos, oblongos ou irregulares de 88 — 250 u de altura e 160 — 270 u de diam., pseudo-ostiolados, inteiramente férteis. Fig. 5.

Picnidiosporos numerosos, fusoides ou fusoide-clavados, contínuos de 5 — 7 x 1,5 — 2. Conidióforos lageniformes, hialinos, septados de 9 — 14,5 x 2 — 2,5 u.

Ascostromas ausentes.

Sôbre folhas e caule de **Podocarpus spinulosa** R. Br. —

Olladulla, New South Wales. Leg. L. R. Fraser, II, 1934. Det. H. M. Fitzpatrick.

Obs.: O especímen em tela, muito rico em estruturas, apresenta-se completamente desprovido de ascostromas.

EUMELA USTERII Bat. & Maia n. sp.

Plágulas epífilas, marron-negras, circulares a sub-circulares, isoladas ou confluentes, de 2 — 4 mms de diam.

Micélio superficial, marron-claro, não setoso, não hifopodiado, telemórfico, ramificado oposta e alternadamente, em ângulos de 45°, com hifas sinuosas, septadas, não constrictas, tendo células de 16 — 29 x 3 — 4 u larg.

Haustórios — ausentes.

Peritécios dispersos ou gregários, marron-negros, subglobosos, sésseis, 97 — 170 u de diam., 70 — 100 u alt., mem-



FIG. 6

EUMELA USTERII Bat. & Maia n. sp.

Secção longitudinal de peritécio.

Orig.



FIG. 7

EUMELA USTERII Bat. & Maia n. sp.

a) micélio;
b) asco parafisado e ascosporo;
c) peritécio setoso.

Orig.

branosos, de paredes de 13,5 — 19 u, formadas por 1 — 3 camadas de células poligonais, de 7 — 8 u no maior diam.; ostíolo central circular, de 19 — 21 u de diam., setosos. Fig. 6.

Setas periteciais marron-escuras, septadas, simples ou dentadas, flexuosas, de ápice ponteagudo, marron-claro, de 40 — 270 x 5,5 — 8 u. Fig. 7.

Ascos obclavados ou elipsoides, 2-tunicados, curto-pedicelados, 8-esporos, 35 — 54 x 11 — 16 u larg.

Paráfises filiformes, hialinas, septadas, simples, de 0,5 — 1 u larg.

Ascosporos clavado-fusoides, 1-septados, não constrictos, lisos, dísticos, hialinos, 14 — 16 x 4 — 5,5 u.

Sôbre fôlhas de hospedeiro indet. Penha, 1° de Janeiro 1906. Dr. Alfred Usteri, sob a etiqueta de **Asterella trichodea** Rehm. Tipo, no Herb. Mus. Bot. Univ. de Zurich.

Plagulae epihyllae, atro-brunneae, rotundatae, 2-4 mm diam, efformatae. Mycelium brunnescens, haud setosum, haud hyphopodiatum, ex hyphis opposite et alternatim ramosis, septatis, haud constrictis, ex cellulis 16-29 x 3-4 u, compositum. Haustoria nulla. Perithecia sparsa vel gregaria, atro-brunnea, subglobosa, sessilia, 97-170 u diam, 70-100 u alt, membranosa, parietibus 13,5-19 u cr., 1-3 stratosis, ex cellulis polygonalibus, 7-8 in maj. diam, ostiolo centrali, 19-21 u diam, setosa. Setae peritheciales atrobrunneae simplices, vel dentatae, flexuosae, apicaliter acutae et brunnescentes, 40-270 x 5,5-8 u. Asci obclavati, 8-spori, 35-54 x 11-16 u. Paraphyses filiformes, septati, simplices, hyalini, 0,5-1 u cr. Ascosporae clavato-fusoideae, 1-septatae, non constrictae, leves, distichae, hyalinae, 14-16 x 4-5,5u. In foliis plantae. Penha, 1-1-906. Leg. Dr. Alfred Usteri, sub **Asterella trichodea** Rehm. Typus, in Herb. Mus. Bot. Univ. Zurich.

NECTRIA TRACHYLAENA Syd.

in Ann. Myc. vol. XXXVI: 299, 1938

Ascostromas de côr cinabarina, sub-globosos, elipsoides ou ovoides, densamente agregados, nunca isolados, raramente confluentes, superficiais, carnoso-gelatinosos, 310 — 416 u de altura e 200 — 450 u de diam., uniloculares, sendo o lóculo de 145 — 245 x 200 — 227 u de diam.; paredes sub-parenquimáticas com 55 — 150 u de largura, formadas por células ovais, sub-globosas ou poligonais, de 8 — 44 x 6 — 31,5 u; ostíolo central, 12 — 15 u de diam.

Ascos cilindráceo-clavados, curtamente pedicelados, numerosos, 8 esporos, 1-tunicados, 75 — 82 x 10 — 13 u.

Paráfises hialinas, filiformes, simples ou ramificadas, finíssimas e ligeiramente mucosas, 0,5 u de diam.

Ascosporos contínuos a princípio, depois 1-septados, hialinos, não constrictos, ovoides, monósticos, 12 — 16 x 6,5 — 9

u, de citoplasma granuloso, Fig. 8.

Sôbre cortex de planta morta. Mt. Warning, New South Wales, Leg. L. Fraser, 15-1-936. Cotipo de Sydow, nº 175, University of Sydney.



FIG. 8

NECTRIA TRACHYLAENA Syd.

a) Ascostroma sob secção longitudinal.
b) Asco parafisado e ascosporos.

Orig.

METASPHAERIA STYPHELIAE Hansf.

Micélio superficial, septado, hialino a marron pálido, constricto, não setoso, não hifopodiado, de células de 15 — 33 x 8 — 10 u; peritécios marron-negros, piriformes, superficiais, membranosos, ostiolados, glabros, gregários ou isolados, de 240 — 350 u de diam., 260 — 300 u de altura; paredes subparenquimáticas, formadas por células poligonais, de 3,5 — 12 x 3 — 11 u, Fig. 9. Ascos cilindráceos, 2-tunicados, curtamente pedicelados, parafisados, 8-esporos, numerosos, de 85 — 93 x 8 — 13 u; paráfises, hialinas, septadas, ramifi-

cadas, de 1 — 2 u de diam. Ascosporos, hialinos, fusoides a cilindráceos, 1-3-septados, levemente constrictos, polos rotundos, monósticos, de 16 — 21 x 5,5 — 6,5 u. Fig. 10.

Sôbre fôlhas de **Styphelia exarrhena** — Menningie, South Australia. Leg. L. D. Williams, X — 1956.

O especímen ora analisado, cotipo de Hansford, foi-nos doado sob a etiqueta WARI — 7611 e tem o nº 13018, IMUR.



FIG. 9

METASPHAERIA STYPHELIAE Hansf.

Peritécio.

Orig.



FIG. 10

METASPHAERIA STYPHELIAE Hansf.

Ascos parafisados e ascosporos

Orig.

PARODIOPSIS ORBIGNYAE Bat. & Nasc. n. sp.

Colônias marron-negras, efusas, superficiais, feltrosas.

Micélio livre superficial, marron, de hifas sinuosas, longas, septadas, não constrictas, com células de 14 — 27 x 4 — 5 u, raramente ramificado, em ângulos de 90°, não hifopodiado, não setoso.

Macroconídios cilindráceo-fusoides, 3-7-septados, não constrictos, marron-claros, 21 — 38 x 6,5 — 11 u, tendo polo rotundo e outro reto.

Estomopódios de 4,5 — 12 x 5,5 — 7 u, contínuos e 1-septados, sub-globosos a clavados e raros, laterais.

Microconidióforos simples, erectos, septados, 40 — 50 x 4 — 5 u.

Microconídios ovoides, hialinos, terminais, raros 4 — 4,5 u de diam.

Peritécios ovoides a sub-globosos, marron-negros, desprendendo pigmento amarelo, superficiais, densamente agregados, de colapso deprimido ou não, 270 — 390 u de diam. pseudo-ostiolados, membranosos, glabros; paredes sub-parenquimáticas de 30 — 55 u de espessura, formadas por várias



FIG. 11

PARODIOPSIS ORBIGNYAE Bat. & Nasc. n. sp.

a) Peritécio;
b) Hipostroma;
c) Hifas do micélio;
d) Estomopódios;
e) Macronídios;
f) Microconidióforo;
g) Asco e paráfises;
h) Ascosporos.

Orig.

camadas de células poligonais, marron, externamente, e hialinas no interior, de 3,5 — 16 x 2,5 — 8 u.

Hipostroma central ou lateral de 27 — 55 u de diam., formado por células sub-hialinas a marron-claras, poligonais ou arredondadas, de 3,5 — 7 x 2,5 — 6 u, penetrando numa profundidade de 55 — 95 u, continuando-se pelo micélio interno, que se ramifica intercelularmente, e formado por células sub-hialinas a marron-claras, constrictas de 2 — 4 u de diam.; lóculo único sub-globoso a ovoide de 220 — 290 x 240 — 315 u de diam.

Ascos cilindráceos, numerosos, parafisados, longamente pedicelados, 2-tunicados, 8 esporos, de 102 — 122 x 9,5 — 13 u.

Paráfises hialinas, septadas, ramificadas de 1 — 2 u de diam.

Ascosporos cilindráceos ou cilindráceo-fusoides, marron-claros, 1-septados, levemente constrictos, monósticos, oblíquos, de 16 — 21 x 5,5 — 7 u. Fig. 11.

Sôbre espata de **Orbignya speciosa** — Caxangá-Recife —A. Chaves Batista, 15-5-58. Tipo, 13337, IMUR.

Coloniis atro-brunneis, effusis, lanosis, constitutus. Mycelium liberum superficiale, ex hyphis longis sinuosis, pauci ramosis, brunneis, septatis, non constrictis, ex cellulis, 14-27 x 4-5 u, non hyphopodiatis, haud setosis; stomopodia continua vel 1-septata, subglobosa vel clavata, lateralia, 4,5-12 x 5,5-7 u; macroconidiis cylindraceo-fusoideis, 3-7 septatis, non constrictis, brunnescentibus, 21-38 x 6,5-11 u.; microconidiophoris simplicibus, erectis, septatis, 40-50 x 4,5-5 u; microconidiis ovoideis, continuis, hyalinis, 4-4,5 u diam, raris, compositum.

Perithecia ovoidea vel subglobosa, atro-brunnea, sed cum pigmento flavo-brunneo soluto, denseque aggregata, colapso depressa vel non, 270-390 u diam, pseudo-ostiolata, membranosa, glabrata; loculum unicum, 220-290 x 240-315 u diam; parietibus sub-parenchymaticis, 30-55 u cr. pluri stratosis, ex cellulis polygonalibus, 3,5-16 x 2,5-8 u; hypostromata centralia vel excentrica, 27-55 u diam. penetrans usque 95 u, ex cellula oblonga vel sub-globosa, 3,5-7 x 2,5-6 u, efformata. Asci cylindracei, numerosi, longo-pedicellati, 2-tunicati, 8-spori, 102-122 x 9,5-13.

Paraphysibus filiformibus, septatis, ramosis, 1-2 u cr. Ascosporae primo hyalinae dein brunnescentes, cylindraceae vel cylindraceo-fusoideae, 1-septatae, constrictae, monostichae, obliquae, 16-21 x 5,5-7 u.

In spadicis **Orbignyae speciosae** — Caxangá — Recife — Leg. A. Chaves Batista, 15/5/58. Typus, 13337, IMUR.

PHAEOCHORELLA PARINARII (P. Henn.) Th. & Sydow

Th. & Syd. — **in** Ann. Myc. XIII: 405, 1915

Sin.: **Cocconia parinarii** P. Henn.

P. Henn. — **in** Engl. Bot. Jahrb. XXX: 277, 1901

Sacc. — in Syll. Fung. XVIII: 159, 1906

Estromas epifilos, sub-cuticulares, fendilhando a cutícula com o seu desenvolvimento, multiloculares, de contôrno arredondado ou irregular, 1 — 4 mm de diam. e 362 — 463 u de alt., irregularmente cupuliformes, negros; estrutura pseudo-parenquimática, na parte superior, formada por células marron-negras, arredondadas ou poligonais, de 3.5 — 13 u de diam. e prosenquimática, na parte inferior, formada por hifas marron, de 2.5 — 4.5 u de diam.

Lóculos monósticos, globoso-depressos, 225 — 495 u de



FIG. 12

PHAEOCHORELLA PARINARII (P. Henn.) Theiss. & Syd.

Detalhe da constituição do lóculo ascígero.

Orig.

largura e 180 — 236 u de altura, providos de ostíolo rotundo, de 16 — 21 u de diam. Fig. 12.

Ascos octosporos, quando jovens cilindro-clavados, muito cêdo, porém, tornam-se evanescentes, conservando, entretanto, os esporos seu arranjo natural, 62.5 — 75 x 12.5 — 15 u; parafisoides abundantes, mantendo os ascos como aglomerados.

FIG. 13

PHAEOCHORELLA PARINARII (P. Henn.) Theiss. & Syd.

a) Sôbre fôlhas de **Parinarium** sp.
b) Ascosporos aglutinados; após a evanescência do asco, a faixa hialina mediana assemelha-se a septo; são contínuos, no entanto.

Orig.

Ascosporos elipsóides, marron-escuros, polos rotundos, contínuos, um pouco constrictos, com uma faixa hialina mediana, 12.5 — 15 x 7.5 — 11.5 u, monósticos, Fig. 13.

Mat. S/N "ex-Herbarium Prof. Pe. Camille Torrend, S. J." (Herbário do Colégio Campolide) — Flora africana.

Sôbre fôlhas de **Parinarium sp.**, Zumbo, África do Sul,

Leg. Pe. C. Torrend, 1904, determinado, então, como **Cocconia parinarii** P. Henn. Espec. nº 8602, IMUR.

Obs.: Revendo o fungo em tela verificamos que êle, de fato, é **Phaeochorella,** segundo o senso estabelecido por Petrak, **in** Sydowia, 1: 126, 1947.

TRICHOSPHAEROPSIS Bat. & Nasc. n. gen.

Tipo: **T. crescentiae,** nobis

Micélio superficial pouco desenvolvido, de hifas retilíneas, simples ou ramificadas, marron, septadas, não constrictas, sem setas ou hifopódios.

Peritécios superficiais, globosos, subglobosos ou piriformes, membranosos, marron, ostiolados, setosos.

Ascos bitunicados, aparafisados, evanescentes.

Ascosporos elipsoide-oblongos, marron, 1-septados, constrictos.

Typus: **Trichosphaeropsis crescentiae** nobis.

Mycelium superficiale, parce evolutum, ex hyphis rectis, simplicibus vel ramosis, brunneis, septatis, haud constrictis, non setosis, haud hyphopodiatis, compositum.

Perithecia superficialia, globosa, subglobosa vel pyriformia, membranosa, brunnea, ostiolata, setosa.

Asci 2-tunicati, aparaphysati, evanescentes.

Ascosporae ellipsoide-oblongae, brunneae, 1-septatae, constrictae.

TRICHOSPHAEROPSIS CRESCENTIAE Bat. & Nasc. n. sp.

Colônias hipófilas marron-cinza, semi-circulares, isoladas ou confluentes, de 1,5 — 2 cm. de diam.

Micélio superficial marron-claro, não setoso, não hifopodiado; hifas retilíneas simples ou ramificações alternas, septadas, não constrictas, tendo células de 12 — 22 x 1,5 — 2,2 u.

Peritécios sub-globosos a piriformes, 45 — 60 u de diam., setosos, superficiais, numerosos, gregários, marron, de ostíolo pertuso, levemente papilado, membranosos; paredes sub-parenquimáticas, formadas por células poligonais e sub-globosas, de 4 — 6 x 3 — 5,5 u. Setas periteciais numerosas, espalhadas, marron-claras, septadas, flexuosas, simples, de ápice agudo ou obtuso, 20 — 1200 x 2,5 — 4 u, fundindo-se às vêzes com hifas do micélio.

Ascos elipsoides ou ovoides, (evanescentes à maturidade) 2-tunicados, aparafisados, 8 esporos, de 22 — 24,5 x 14,5 — 16 u.

Ascosporos elipsoide-oblongos, hialinos a princípio, de-



FIG. 14

TRICHOSPHAEROPSIS CRESCENTIAE Bat. & Nasc. n. sp.

a) Peritécios setosos
b) Asco e ascosporos.

pois marron, 1-septados, levemente constrictos, conglobados de 12 — 13,5 x 4 — 5 u. Fig. 14.

Sôbre folhas de **Crescentia sp.** Caruaru Pern. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 4-4-58. Tipo, 13032, IMUR.

Coloniae hypophyllae, brunneo-cinereae, subcirculares, simplices vel confluentes, 1,5-2 cm diam.

Mycelium superficiale, brunnescens, non setosum, haud hypho-

podiatum, ex hyphis septatis non constrictis, rectis, simplicibus vel alternatim ramosis, ex cellulis 12-22 x 1,5-2,5 u, compositum.

Perithecia superficialia, numerosa, gregaria, subglobosa vel, pyriformia, 45-60 u diam, brunnea, setosa, ostiolata, parietibus membranosis, subparenchymaticis, ex cellulis polygonalibus vel sub globosis, 4-6 x 3-5,5 u, efformata. Setae peritheciales numerosae, sparsae, brunnescentes, flexuosae, simplices, acutae vel obtusae, 20-1200 x 2,5-4 u.

Asci ellipsoidei vel ovoidei, 2-tunicati, 8 spori, 22-24,5 x 14,5-16,5 u, aparaphysati sed dein evanescentes.

Ascoporae ellipsoide-oblongae, hyalinae dein brunneae, 1-septatae, parve constrictae, conglobatae, 12-13,5 x 4-5 u.

In foliis **Crescentiae sp.** — Caruaru — Pern. — Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 4/4/58. Typus, 13032, IMUR.

TRYBLIDIELLA FUSCA E. & E.

in "North American Pyrenomycetes", 691: 1892

Apotécios negros, irrompentes, sésseis a curtamente estipitados, carbonáceos, glabros, isolados ou em número de



FIG. 15
TRYBLIDIELLA FUSCA E. & E.

a) Apotécios irrompentes;
b) Secção longitudinal de apotécio;
c) Asco.

2 — 4, de forma vulvar, retos ou recurvados, 1 — 2.5 x 0.5 — 1 mm larg. e 752 — 849 u alt.

Perídio marron-negro, ondulado, sulcado, invaginante, com paredes de 97 — 145 u larg., formadas por células poligonais de 8 — 13.5 x 6 — 10 u, em 6 camadas.

Himênio plano, ocre, liso, com 230 — 267 x 1578 — 1821 u.

Medula amarelo-clara, com 339 — 364 u alt.



FIG. 16

TRYBLIDIELLA FUSCA E. & E.

Asco parafisado e ascosporos.

Orig.

Ascos cilindráceos, sésseis ou curtamente pedicelados, inoperculados, parafisados, de paredes duplas, 4 — 8 esporos, 130 — 140 x 9 — 11 u. Fig. 15.

Paráfises hialinas, septadas, ramificadas nos ápices, que são clavados, com 1 — 2.5 u larg.

Ascosporos marron-claros, 1-septados, de início, depois 3-septados, marron-escuros, constrictos, lisos, monósticos, com 21.5 — 24 x 8 — 9.5 u. Fig. 16.

Sôbre ramos sêcos de **Bougainvillea** sp. — Iputinga — Recife — Leg. Regina M. Rocha Batista. Especímen nº 12557, IMUR.

ABSTRACT

In this paper the following new fungi are described: **Trichosphaeropsis** n. gen. and **T. crescentiae** Bat. & Nasc., **Eumela usterii** Bat. & Nasc. n. sp. on the Parodiopsidaceae. Other old species are equally analysed, as **Actinomyxa australiensis** Syd., **Byssochlamys nivea** Westl., **Corynelia uberata** Fries ex Acharius in their imperfect stage, **Metasphaeria styphaeliae** Hansf., **Nectria trachylaena** Syd. and **Phaeachorella parinarii** (P. Henn.) Theiss. & Syd.

RÉSUMÉ

Ici nous trouvons décrits ces nouveaux champignons: **Trichosphaeropsis** n. gen. et **T. crescentiae** Bat. & Nasc., **Eumella usteri** Bat. & Maia n. sp., insérés dans les Sphaeriaceae et **Parodiopsis orbignyae** Bat. & Nasc. n. sp., dans les **Parodiopsidaceae.** D'autres vieilles espèces sont également analisées comme: **Actinomyxa australiensis** Syd., **Byssochlamys nivea** Westl. **Corynella uberata** Fries ex Acharius dans leur état imparfait, **Metasphaeria styphaeliae** Hansf., **Nectria trachylaena** Syd. et **Phaeochorella parinarii** (P. Henn.) Theiss. & Syd.

INSTITUTO DE MICOLOGIA - UNIVERSIDADE DO RECIFE
(Publicação n. 133)

A. CHAVES BATISTA

Heraldoa um novo gênero de Asterinaceae, com himênio multiplo

(COM 9 FIGURAS NO TEXTO)

FORLÌ
TIPOGRAFIA VALBONESI
1959

INSTITUTO DE MICOLOGIA - UNIVERSIDADE DO RECIFE
(Publicação n. 133)

A. CHAVES BATISTA

Heraldoa um novo gênero de Asterinaceae, com himênio multiplo

(COM 9 FIGURAS NO TEXTO)

Em continuação aos nossos estudos sôbre os fungos Asterinaceae deparâmo-nos com alguns organismos descritos no gênero *Lembosia* Lév. e que não correspondiam às características taxonômicas dêsse gênero. Depois, assinalamos o encontro de outros especimens, distintos dos anteriormente analisados, mas apresentando, em comum, os mesmos caracteres de um gênero ainda não descrito.

Deliberamos, então, propor para êsses fungos o novo gênero — *Heraldoa*, numa homenagem ao ilustre micólogo brasileiro, Dr. Heraldo da Silva Maia, nosso colaborador constante, como Assistente de Pesquisas, da Instituto de Micologia, da Universidade do Recife.

Esso novo gênero particularisa-se por possuir micélio asterináceo com ascostromas de himênio múltiplo. A spécie tipo, *H. ardua* (Syd.) Bat. n. comb. repousa sôbre *Diospyros cargillia.*

H. microcarpa (Hansf.) Bat. é estudado sôbre *Pseudospondias microcarpa; Heraldoa pandani n. sp.*, sôbre *Pandanus utilis* e *H. oxyanthi* n. sp. sôbre *Oxyanthus speciosus* são outras duas espécies ora descritas tambem nêsse novo gênero.

ASTERINACEAE

HERALDOA Batista, n. gen.

(Dedicado ao micólogo brasileiro Dr. Heraldo da Silva Maia)

Tipo: *H. ardua* (Syd.) Bat. n. comb.

Micélio asterináceo, com hifopódios laterais, porém não setoso. Ascostromas sub-orbiculares a lineares, carbonáceos, radiados, marron-negros, fimbriados, dehiscentes por fenda longitudinal. Himênio múltiplo, em distintas lojas ascígeras. Membrana basal marron. Ascos elipsoides a sub-globosos, 2-tunicados, 6-8 esporos, parafisados. Ascosporos 1-septados, marron.

Mycelium asterinaceum, non setosum cum hyphopodiis lateralibus. Ascostromata suborbiculata vel linearia, carbonacea, radiata, atro-brunnea, fimbriata, rima longitudinali dehiscentia. Hymenium plurimum, loculis distinctis. Paries basalis brunnea. Asci ellipsoidei vel subglobosi, 2-tunicati, 6-8 spori, paraphysati. Ascosporae 1-septatae, brunneae.

HERALDOA ARDUA (Syd.) Bat., n. comb.

Sin.: *Lembosia ardua* Syd.

in Ann. Mycol. XXXV: 41, 1937

Plágulas epífilas, marron-negras, carbonáceas, dispersas, circulares a sub-circulares, 2-10 mms, às vezes confluentes. Micélio superficial, de hifas septadas, não constrictas, não setosas, apresentando telemorfismo; ramificações regulares, opostas, em ângulos de 45-90; células hifais cilindráceas, 10-19 × 5-6,5 µ. Hifopódios raros, oblongos, simples a multilobados, unilaterais, unicelulares, 10-14 × 9-10 µ, (fig. 1). Micélio interno subhialino, epidermal, com hifas septadas, de 2,5-5 µ de diam. Ascostromas superficiais, sub-orbiculares, elipsoides ou lineares, carbonáceos, simples ou confluentes, marron-negros, de dehiscência em fenda longitudinal (fig. 2) irregular, 200-438 × 150-300 µ e 60-86 µ de altura; margens fimbriadas. Parede superior de 48-82 µ de espessura, sub-parenquimática, radiada, formada por células retangulares, de 12.5-25.5 × 5-9 µ. Himênio multiplo (fig. 2 b); lóculos ascígeros distintos, separados por colunas de hifas marron-negras, irregulares, de 2.5-13.5 µ de diam, (fig. 3 e 4, 4a). Ascos elipsoides

a sub- globosos, 6-8 esporos, 2-tunicados, sésseis, 38.5-53.5 × 22.5-25.5 μ. Paráfises filiformes, simples, septadas, hialinas, 1.2-2.5 μ. Ascosporos oblongos, 1-septados, constrictos, conglobados, marron-negros, lisos, 17.5-22.5 × 7.5-10 μ. Estampa III.

Sôbre folhas de *Diospyros cargillia* F.v.M. Salisbury, New South Wales. Leg. L. FRASER, Maio, 1934. Tipo n. 15, no Departamento de Botânica, de University of Sydney (cotipo de Sydow).

Est *Heraldoa* n. gen. per hymenium multiplum et mycelium hyphopodiatum.

Obs.: O fungo em tela é redescrito sob novo binômio, de um gênero novo, aliás, por se apresentar o micélio hifopodiado, com ascostromas exibindo himênio múltiplo, de lojas ascígeras separadas por colunas hifais, marron; ascosporos feodídimos.

HERALDOA MICROCARPA (Hansf.) Bat. n. sp.

Sin. *Lembosia microcarpae* Hansf.
in Proc. Linn. Soc. Lond. 153 Sess: 48, 1941
idem, 157 Sess: 36, 1945.

Plágulas epifilas, marron-negras, crustaceas, circulares a sub-circulares, 1-6 mms. de diam. Micélio superficial, marron, não setoso, telemorfico, septado, não constricto, com ramificações opostas, alternas e unilaterais, em angulos de 45°; células hifais de 14-28 × 8-11 μ. Hifopodios unilaterais ou alternos, cilindraceos, clavados ou oblongos, unicelulares, 11-16 × 8-11 μ. Ascostromas superficiais, elipsoides a lineares, de fenda longitudinal, isolados ou confluentes em X ou Y, marron-negros, glabros, subparenquimaticos, de 422-655 × 243-364 μ e 61-100 μ de alt. Himenio multiplo, com loculos em numero de 1 a 3, elipsoidais, 180-315 × 36-60 μ, separados entre si por colunas marron-negras, com células pouco distintas, 5,5-11 μ de diam. Parede superior radiada, de células retangulares de 11-21.5 × 6,5-8 μ, de margens crenadas; membrana basal tenue, hialina (fig. 5). Lóculos 182-315,5 × 36,5-60,5 μ. Ascos elipsoides ou ovoides, 6 a 8 esporos, 2 tunicados, sesseis, 60-67,5 × 46-48,5 μ. Parafises filiformes, simples, septadas, hialinas, 1,5-2μ de diam. Ascosporos elipsoides, oblongos, lisos, 1 septados, marron-escuros, constrictos, conglobados, 27-32,5 × 13,5-14 μ.

Sôbre folhas de *Pseudospondias microcarpa*. Entebbe Road, Uganda. C. G. HANSFORD, 11-943. Tipo, n. 3302, associado a *Asterostomella pseudospondiadis* Bat. e *Asterinella pseudospondiadis* Hansf.

HERALDOA PANDANI Bat. n. sp.

Plágulas epífilas, efusas, membranosas, marron-negras. Micélio superficial, marron escuro, não setoso, telemórfico, de hifas septadas, não constrictas, ora paralelas ora com ramificações opostas, alternas e unilaterais em angulos de 45 a 90; células hifais de 15-25.5 × 3-4 μ. Hifopódios raros, laterais, alternos, cilindráceos, 1 celulares, direitos ou recurvados, de 9-13.5 × 6.5-9.5 μ (fig. 6) algumas vezes crenulados. Micélio interno inobservado. Conídios presos diretamente no micélio, globosos, lisos, contínuos 10-12.5 μ de diam. Ascostromas superficiais, dispersos ou confluentes, marron-negros, elipsoides a lineares, às vezes em fórma de Y, membranosos, glabros, de dehiscência longitudinal, 243-846,5 × 145.5-194 μ, subparenquimáticos, tendo a altura de 48.5-73 μ; parede superior radiada de 5.5-13.5 μ de diam. formada por células retangulares, 6.5-12.5 × 4-5 μ. Himênio múltiplo; lóculos separados por frouxas colunas de hifas marron, em zigzague (fig. 7); parede inferior de células marron claras, irregulares; margens com hifas franjadas, marron claras, telemórficas, raramente hifopodiadas, com células de: 9-16.5 × 3-4.5 μ. Ascos elipsoides ou subglobosos, sésseis, 4-8 esporos, bitunicados, 38-48.5 × 27-32.5 μ. Paráfises simples, hialinas, septadas, 1.5-2 μ de diam. Ascosporos oblongos, lisos, 1 septados, constrictos, conglobados, marron claros, de: 24.5-27 × 10-11 μ.

Sôbre folhas de *Pandanus utilis* - Singapura, Straits Setlments. C. F. Baker, Fungi Malayana n. 4444, Agosto, 1917. Tipo.

Esse especímen fôra det. por Saccardo como *Lembosia pandani* (Rostr.) Theiss., do qual difere pelo avantajado das proporções de suas estruturas e sobretudo, por apresentar himênio múltiplo.

Foi-nos impossível localisar o tipo de Rostrup, e assim julgamos de melhor alvitre descreve-lo como entidade distinta.

Plagulae epiphyllae, effusae, membranosae, atro-brunneae. Mycelium superficiale, atro-brunneum, non setosum, ex hyphis septatis, non constrictis, parallelis et opposite, alternatim vel unilateraliter ramosis in angulis 45-90°, ex cellulis 15-25 × 3-4 μ, compositum. Hyphopodia rara, lateralia, alternata, cylindracea vel crenulata, continua, 9-13.5 × 6.519.5 μ. Mycelium internum non visum. Conidia in hyphis mycelicis, globosa, levia, continua, 10-12.5 μ diam. Ascostromata sparsa, vel confluentia, atro-brunnea, ellipsoideo-linearia ,aliquando Y-efformata, membranosa, glabrata, longitudinaliter dehiscentia, 243.846.5 × 145.5-194 μ, et 48.5-73 μ

alt.; pariete superiore radiata, 5.5-13.5 μ cr. ex cellulis rectangularibus, 6.5-12.5 × 4-5 μ composita; hymenium multiplum; loculi separati brunneis columnis, irregulariformibus; pariete inferiore ex cellulis *brunnescentibus, irregularibus* ex marginibus fimbriatis, non hyphopodiatis, ex cellulis 9-16.5 × 3-4.5 μ, brunnescentibus, efformata. Asci ellipsoidei vel sub globosi, sessiles, 2-tunicati, 4-8-spori, 38-48.5 × 27-32.5 μ. Paraphyses filiformes simplices, septatae, hyalinae, 1.5-2 μ cr. Ascosporae oblongae, leves, 1-septatae, constrictae, conglobatae, brunnescentes, 24.5-27 × 10-11 μ.

In foliis *Pandani utilis* - Singapure - Straits Setlements. C. F. Baker, Fungi Malayana, n. 4444. Typus. Magyar Nemzetti Muzeum.

HERALDOA OXYANTHI Bat. n. sp.

Plágulas anfígenas, superficiais, marron-negras, 2-5 mms. de diam. Micélio, marron-negro, não setoso, de hifas septadas, não constrictas com ramificações alternas, opostas e uni-laterais, em ângulos de 45 á 90°; células hifais cilindráceas, de 9-23.5 × 6-7 μ. Hifopódios laterais, alternos, cilindráceos ou oblongos, uni-celulares, de 9-12 × 7,5-9 μ. Haustórios-elípticos a globosos, hialino-coraloides, epidermais; 13,5-17,5 × 22 μ (fig. 9). Ascostromas superficiais, orbiculares a sub circulares, isolados e confluentes, marron-negros, membranosos, glabros, de dehiscência longitudinal, irregular; 182-400 × 205-243 μ de diam. e 85-133,5 μ de alt. Parede superior, marron-negra, subparenquimática, formada por células radiadas, pouco distintas, de 5,5-13,5 μ de extensão; margens pouco fimbriadas (fig. 8). Parede inferior de estrutura prosenquimática, marron-clara a hialina; 13,5-21,5 μ de espessura; himênio multiplo. Lóculos ascígeros elipsoides, contendo 1 a 3 ascos e separados por colunas marron-negras, de 3-12 μ de diam (fig. 9). Ascos elipsoides, 6 a 8 esporos, 2 tunicados, sesseis: 51,5-55 × 35,5-38 μ Paráfises simples, filiformes, septadas, hialinas, 1,5-2 μ de diâmetro. Ascósporos elipsoide-oblongos, lisos, 1 septados, constrictos, marron-negros, conglobados, de 24,5-31 × 12-15 μ.

Sôbre fôlhas de *Oxyanthus speciosus*. Entebbe Road, Leg. C. G. Hansford, 5-944. Tipo, 3461, Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda. Associado a *Dimerium leptosporum* Speg.

Plagulae amphigenae, atro-brunneae, 2-5 mm diam. Mycelium superficiale, atro-brunneum, ex hyphis septatis, non constrictis, alternate, opposite vel unilateraliter ramosis, in angulis 45-90°, ex cellulis cylindraceis, 9-23,5 × 6-7 μ, non setosis, compositum. Hyphopodia lateralia, alternata, cylindracea vel oblonga, continua, 9-12 × 7,5-9 μ. Haustoria epidermalia,

coraloidea, hyalina, 13,5-22 μ diam. Ascostromata superficialia, orbiculata vel sub-orbiculata, simplicia vel confluentia, atro-brunnea, glabrata, 182-400 × 205-243 μ diam., 85-135 μ alt., longitudinaliter vel irregulariter dehiscentia, membranosa. Pariete superiore subparenchymatica, ex cellulis radiatis, 5,5-12,5 μ long., marginibus pauco fimbriatis, efformata; pariete inferiore prosenchymatica, brunnescenti vel hyalina, 13,5-21,5 μ cr.; hymenium multiplum. Loculi ellipsoidei, cum 1-3 ascis, separatis, atrobrunneis columnatis, 3-12 μ cr. Asci ellipsoidei, 6-8 spori, 2 tunicati, sessiles, 51,5-55 × 35,5-38 μ.

Paraphysibus filiformibus, simplicibus, hyalinis, 1,5-2 μ cr. Ascosporae ellipsoido-oblongae, leves, 1 septatae, contrictae, atrobrunneae, conglobatae, 24,5-31 × 12-15 μ.

In foliis *Oxyanthi speciosi*. Entebbe Road, Leg. C. G. Hansford 5-944. Typus, 3461, Herb, Mycologist, Dep. Agr. Uganda. Socia, *Dimerii leptospori* Speg.

Obs. O especímen em tela fòra identificado como *Asterina aterrima* Syd.

SUMMARY

This paper undertakes the study of a new genus *Heraldoa* Bat. on the Asterinaceae, characterized by asterinaceous mycelium and ascostromata with multiple hymenium, having paraphysate asci and brown didymospores. The type, *H. ardua* (Syd.) Bat. n. comb. is made on *Diospyros cargillia*. Two other species, on the same genus, are studied: *H. oxyanthi* Bat. n. sp. on *Oxyanthus speciosus* and *H. pandani* Bat. n. sp. on *Pandanus utilis*.

RÉSUMÉ

Il s'agit de l'étude du nouveaux genre *Heraldoa* Bat. dans les *Asterinaceae*, caractérisé par le mycélium astérinéen et les ascostromes avec hyménium multiple, ayant des asques paraphysées et didymospores marrons. Le type *H. ardua* (Syd.) Bat. n. comb. vit sur *Diospyros cargillia*. Deux autres espèces du même genre sont etudiées: *H. oxyanthi* Bat. n. sp. sur *Oxyanthus speciosus* et *H. pandani* Bat. n. sp. sur *Pandanus utilis*.

Reprint from **Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia** Serie 5, Vol. **XVI**, pag. 104-114, 1959



ESTAMPA I.

FIG. 1 - *Heraldoa ardua* (Syd.) Bat. - ao centro. micelio hifopodiaceo.

FIG. 6 - *Heraldoa pandani* Bat. - em. baixo - Sector da parede superior do ascostroma e micelio hifopodiado, com conidios.

FIG. 8 - *Heraldoa oxyanthi* Bat. - ao alto e lateral, esquerda - Sector da parede superior do ascostroma, micelio hifopodiado e asco parafisado.



ESTAMPA II.

Heraldoa ardua (Syd.) Bat.

Himênio múltiplo.

ESTAMPA III.

FIG. 2, 2a, 3, 4, 4a) *Heraldoa arduaz* (Syd.) Bat. - ao alto, lateral esquerda - ascostroma de fendilhamento longitudinal; no plano seguinte - diferentes aspectos de lojas ascigeras.

FIG. 5 - *Heraldoa microcarpa* (Hansf.) Bat. - ao alto lateral direita - secção longitudinal do ascostroma.

ESTAMPA IV.

FIG. 8 - *Heraldoa oxyanthi* Bat. - Ascostroma sob secção longitudinal, observando. se tambem haustorios.



ESTAMPA V.

FIG. 7 - *Heraldoa pandani* Bat. - Ascostroma visto sob secção longitudinal.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 305-321, 1960

(121)

NOVAS CONSIDERAÇÕES SÔBRE O GÊNERO **VIEGASIA** Bat. (*)

A. CHAVES BATISTA

Nesta publicação o autor tece novas considerações sôbre o gênero **Viegasia** Bat., além de ampliar, também, a diagnose dêsse gênero.

O gênero **Viegasia** é mantido na família **Asterinaceae** e enriquecido com ilustrações e re-descrição da espécie tipo, **V. cissampeli** (Hansf.) Bat., assim como com a inclusão de três novas espécies: **V. costaricensis** (Syd.) Bat. & Vital n. comb., **V. faureae** (Doidge) Bat. & Vital n. comb. e **V. radiata** (Doidge) Bat. & Vital n. comb.

ASTERINACEAE

Viegasia Batista

Typus: **V. cissampeli** (Hansf.) Bat.

Batista, A. C. — Discussion on the genera **Parmulária** and **Schneepia** and election of new genus **Viegasia,** in Bol. S.A.I.C. Pern. XVIII, ns. 1 — 2, pp. 29-34, 1951.

Hansford, C. G. — Fungus Flora of Uganda, **in** Proc. Lin. Soc. part. 3, p. 194, 1944-45.

Mycelium superficiale, brunneum, ex hyphis ramosis, septatis, non setosis sed lateraliter hyphopodiatis compositum. Stromata superficialia, orbiculata-applanata, radiata, glabra, atro-brunnea, car-

(*) Publicação nº 134

bonacea; loculi plures radiantes, lineares; paries inferior brunneus. Hypostroma multipla, epidermalia, parenchymatica; hyphae intramatricales in cellulis epidermidis prorumpens ad hyphopodia; haustoria coralloidea. Asci basales, 8-spori, paraphysati. Ascosporae 1-septatae, brunneae.

—— o ——

VIEGASIA CISSAMPELI (Hansf.) Batista

Sin.: **Schneepia cissampeli** Hansf. (loc. cit.)

Micélio epífilo, superficial, não setoso, de hifas marron, ramificadas, septadas, tendo células cilindráceas, de 20 — 35 x 6 — 7 u. Hifopódios unilaterais ou alternos, hemisféricos, Fig. 1, contínuos, 11 — 14 u de diam., emitindo haustórios coraloides para as células epidérmicas. Ascostromas superficiais, orbiculares, aplanados, 1 — 1.5 mm de diam., marron-negras; parede superior radiada, de cêrca de 10 u de diam., e margens sub-fimbriadas; parede inferior tênue, marron-clara. Hipostroma epidermal, múltiplo, Figs. 2 e 3, marron-claro, sub-globoso a colunar, 22 — 37.5 u de diam., em correspondência com os lóculos ascigeros. Lóculos vários, radiantes, lineares, direitos ou recurvados, 600 — 700 x 200 u e 50 — 75 u de altura. Ascos basais, ovoides, 8-esporos, 2-tunicados, sésseis ou curto-estipitados, 45 — 54 x 21 — 32 u. Paráfises filiformes, simples, um tanto mucosas. Ascosporos oblongos, 1-septados, constrictos, marron-negros, verrugosos, 21 — 25 x 12 — 13 u.

Sôbre fôlhas de **Cissampelos mucronata, Kawanda,** Uganda. Tipo 2848, Hansf. Bulemezi — Leg. C. G. Hansford, Nov. 1940 Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda.

Est typus n. gen. **Viegasiae** per mycelium hyphopodiatum, ascostromata radiata, pluriloculata, cum hypostromate et ascosporos brunneos, 1-septatos. Fam. Asterinaceae.



FIG. 1

VIEGASIA CISSAMPELI (Hansf.) Bat.

Margens do ascostroma e micélio hifopodiado.

Orig.



FIG. 2

VIEGASIA CISSAMPELI (Hansf.) Bat.

a) Secção do ascostroma;
b) Ascosporos em germinação;
c) Hifas hfiopodiadas.
(Ex C. G. Hansford, Fungus Flora of Uganda, in the Linn. Soc. Lond., part. 3, pág. 194, 1944-45).

Orig.



FIG. 3

VIEGASIA CISSAMPELI (Hansf.) Bat.

Ascostroma sob secção longitudinal, observando-se, bem destacado, múltiplo hipostroma.

Orig.

VIEGASIA COSTARICENSIS (Syd) Bat. & Vital n. comb.

Sin.: **Hysterostomina costaricensis** Syd.

H. Sydow — **in** Ann. Myc. XXV: 34, 1927
..... — **in** Ann. Myc. XXVIII: 128, 1930
Hysterostomella costaricensis (Syd) Hansf.
C. G. Hansford — **in** The foliicolous Ascomycetes their parasites and associate fungi, p. 169, 1946

Micélio externo epífilo, raramente hipófilo, formado por hifas marron, tortuosas, muito ramificadas, telemórficas, geralmente crescendo juntas umas às outras, em feixes de 2 — 5; septação pouco distinta, 2.5 — 4 u de diâmetro, sem setas. Fig. 4. Hifopódios raros, unicelulares, laterais, contínuos, lobados, 6.5 — 10 u de diam. Fig. 6. Ascostromas situados no centro das plágulas micélicas, arredondado-angulosos, negros, carbonáceos, fàcilmente destacáveis da matriz, isolados, 0.5 — 1.5 mm diam., havendo na face hipófila, em correspondência com os estromas e com as dimensões dêstes, manchas marron e depressas; parede superior 5 —22.5 u de espessura, marron-negra, opaca no centro, clareando para os bordos, que são de estrutura radiante, cujas hifas se continuam pelo micélio; parede inferior marron clara, 2.5 — 6 u de espessura, de estrutura mal definida. Lóculos lineares, até 1 mm de comprimento, 112 — 190 u de larg. e 90 — 112 u alt., direitos, angulosos ou encurvados, isolados ou confluentes, irregularmente dispostos ou, às vêzes, de distribuição um pouco radial, fendilhados longitudinalmente, através de uma rima de 5 — 25 u de largura. Hipostroma múltiplo, Fig. 5, constituido por células arredondadas, de 3 — 7.5 u de diam., marron-escuras, que formam uma base de 40 — 75 u de diâmetro, no seio da cutícula, a qual se afila em direção à superfície da fôlha, aí chegando com um diâmetro de 8 — 22 u, onde dá origem ao estroma superficial; dessa base hipostromática partem ramificações hifais, hialinas, que se desenvolvem nas células epidérmicas e dos tecidos paliçádicos e lacunosos inter e intracelularmente; a formação da massa estromática na espessura da cutícula ocasiona uma proeminência na superfície da fôlha, notável à lupa. Ascos elipsoides a ovoides, 40 — 60 x 20 — 25 u, bitunicados, 6 — 8 esporos, sésseis ou curto pedicelados; paráfises filiformes, simples, septados, 1.5 — 2 u diam. Ascosporos elipsoides a ovoides, 1-septados, constrictos, hialinos depois marron, 19 —



FIG. 4

VIEGASIA COSTARICENSIS (Syd) Bat. & Vital

Micélio marginal aos ascostromas.

Orig.



FIG. 5

VIEGASIA COSTARICENSIS (Syd.) Bat. & Vital

Detalhes do hipostroma.

Orig.



FIG. 6

VIEGASIA COSTARICENSIS (Syd.) Bat. & Vital

a) Hifa, com hifopódios;
b) Asco parafisado;
c) Ascosporos.

23 x 8 — 10 u, irregularmente dispostos, um pouco fragmentáveis.

Material tipo nº 145 da "Fungi itineri costaricensi collecti, sôbre **Miconia longifolii**, San Pedro de San Ramon, 28-1-1925, leg. H. Sydow, determinado como **Hysterostomina costaricensis** Syd. n. sp.

Obs.: Na sua descrição original (Ann. Myc. XXV: 34, 1927) H. Sydow diz que a côr vermelha do tecido paliçado do hospedeiro é devida à presença do fungo.

Hansford, entretanto, acha que tal fenômeno seja um efeito de desidratação, uma vez que em áreas livres do fungo também se observa essa alteração.

Nossas observações concordam com as de Hansford. É **Viegasia** por ter micélio hifopodiado.

E Hysterostomina removendum per mycelium hyphopodiatum.

VIEGASIA FAUREAE (Doidge) Batista & Vital n. comb.

Sin.: **Hysterostoma faureae** Doidge

E. M. Doidge — **in** Bothalia I: 197, 1924
B. J. Dippenaar — **in** Ann. van die Univ. van Stellenbosch, Jaargang VIII: 23, 1930.
Doidge & Bottomley — **in** Bot. Survey of South África, Memoir 11, p. 62, 1931.
G. C. Nel. **in** Ann. Univ. Stellenbosch, Jaargang XX, p. 22, 1942.
E. M. Doidge — **in** Bothalia X: 202, 1950.

Micélio livre marron-negro, superficial, hifopodiado, tendo hifas septadas, de 4 — 6 u de diam., formando uma franja radiante em tôrno dos ascostromas, Fig. 7 e, frequentemente, tranças de 2 — 5 hifas; a porção hifal terminal é dilatada, à semelhança de vesícula, com 10 — 15 u de diam. Hifopódios laterais, contínuos, sub-globosos, 7 — 8 u de diam., escassos, fig. 8.

Ascostromas anfígenos, geralmente epífilos, isolados ou gregários, superficiais, circulares, plano-convexos, carbonáceos, negros, com 1 ou mais lóculos, até 400 u de diam. e 64 — 105 u de alt.; parede superior marron-negra, de 12,5 — 25 u de diam., opaca no centro e radiante nos bordos, abrindo-se irregularmente, à maturidade; parede basal marron-negra, 5 — 12,5 u de diam.



FIG. 7

VIEGASIA FAUREAE (Doidge) Bat. & Vital n. comb.

Ascostromas e micélio livre.

Orig.

Hipostroma epidermal, à semelhança de placa de células poliédricas abaixo da cutícula, conectado com a porção basal dos ascostromas, através de filamentos direitos, simples e marron; esta placa é marron em sua porção espessa e hialina em sua porção terminal, de onde se desenvolve micélio hialino, intramatrical e intercelular, fig. 9.

Os lóculos são irregulares ou lineares, de 212 x 45 — 75 u.

Paráfises filiformes, ramificadas, hialinas, de 1,5 — 2 de diam.

Ascosporos ovoides, 1-septados, constrictos, com células desiguais, inicialmente hialinas, depois marron, irregularmente dísticos, 17,5 — 22,5 x 8 — 11 u de diam.

Sôbre fôlhas de **Faurea McNaughtonii**, Gouna Forest, Knysma District, Cape, 23-5-23, Leg. J. Phillips, Tipo nº 17293, Union of South África, Depart. of Agriculture, Mycological Herbarium.

Mycelio hyphopodiato est **Viegasia.**



FIG. 8

VIEGASIA FAUREAE (Doidge) Bat. & Vital n. comb.

Micélio hifopodiado.

Orig.

FIG. 9

VIEGASIA FAUREAE (Doidge) Bat. & Vital n. comb.

a) Ascostromas em córte longitudinal e hipostroma.
b) Ascos e paráfises.

Orig.

VIEGASIA RADIATA (Doidge) Batista & Vital comb. nov.

Sin.: **Schneepia radiata** (Doidge) Doidge
Doidge — **in** Bothalia I: 5, 1921
Lembosia radiata Doidge
Doidge — **in** Trans. Roy. Soc. South Afric. p. 269, 1920

Colônias epífilas, arredondadas, espalhadas ou agregadas, 1 — 2 mm de diam., negras. Micélio livre formado por hifas marron, de ramificações alternas, septadas, com células de 9 — 23 x 2.5 — 3.5 u, telemórficas. Hifopódios unicelulares, capitados, 5 — 10 x 3.5 — 6 u, emitindo haustórios coraloides para as células epidérmicas do hospedeiro, Fig. 10. Estromas arredondados, negros, carbonáceos, isolados ou confluentes, 400 u — 3 mm de diam., pluriloculares; parede superior marron-negra, 10 — 35 u de espessura, opaca no



Orig.

FIG. 10

VIEGASIA RADIATA (Doidge) Batista & Vital n. comb.
Micélio hifopodiado.

Orig.



FIG. 11

VIEGASIA RADIATA (Doidge) Bat & Vital n. comb.

a) Córte longitudinal de ascostroma, exibindo dois lóculos ascígeros e múltiplo hipostroma;
b) Porção marginal da parede superior do ascostroma;
c) Asco e paráfises;

centro e radiada para os bordos, que são constituidos por células mais ou menos retangulares, de 6 — 13 x 1.5 — 3.5 u, e assim fimbriados; parede inferior marron, até 19 u de espessura; lóculos lineares, dispostos mais ou menos radialmente, 38 — 61.5 u de altura e 47.5 — 140 u de diam., fendilhados longitudinalmente até 48 u de larg. Hipostroma múltiplo, sub-cuticular a epidermal, marron, opaco, constituido por uma base alargada de 30 — 42 u de diam. e 15 — 19 u de altura, o qual se liga ao ascostroma por um istmo de 7.5 — 15 u de largura, pseudo parenquimático. Ascos elipsoides ou clavados, 33.5 — 37 x 10.5 — 16.5 u, sésseis, octosporos, 2-tunicados, evanescentes; paráfises simples ou ramificadas, septadas, mais longas do que os ascos, 1 — 2 u de diam. Ascosporos elipsoides ou clavados, 14 — 17 x 4.5 — 5 u, 1-septados, marron, aproximadamente dísticos, constrictos, Fig. 11.

Sôbre folhas de Leguminosae — Rikattli, África Oriental Portuguesa. Leg. H. A. Junod, Set. 1918. Spec. tipo 11729, Union of South África, Dep. of Agric. Myc. Herb.

Est **Viegasia** per mycelium hyphopodiatum, ascostromata radiata, pluriloculata cum hypostroma et ascospores phaeodidimos.

Obs. — Um detalhado exame do especímen tipo de Doidge (nº 11729) revelou-nos a presença de micélio hifopodiado e, assim, em face ao rearranjo da Sistemática das famílias Polystomellaceae e Asterinaceae, que esatmos fazendo, verificamos que o fungo em tela não concorda com **Parmularia**, razão porque o transferimos, então, para Viegasia.

RÉSUMÉ

Il est présenté un sommaire des études entrepris par les auteurs sur le genre **Viegasia** Batista qui est de nouveau décrit et illustré avec une bonne documentation, obtenue de l'Histologie de l'espèce type: **V. cissampeli** (Hansf.) Batista.

Définie la position de ce champignon parmi les champignons Asterinaceae, de nouvelles espèces lui ont été ajoutées comme: **V. costaricensis** (Syd.) Batista & Vital. comb. sur **Miconia longifoliae** collecté en Costa Rica, **V. faureae** (Doidge) Batista & Vital n, comb. trouvé sur **Faurea Mc Naughtonii** au Cap, Afrique du Sud, et **V. radiata** (Doidge) Batista & Vital n. comb. étudiée sur Leguminosa indet. et collectée en Rikattli, Afrique Orientale Portugaise.

SUMMARY

In this paper, the AA. summarized the studies carry on **Viegasia** Bat., once more described, with fairly abundant documentation

acquired, with the aid of hystological preparations, made on **V. cissampeli** (Hansf.) Bat.

The taxomic position of this genera was defined as among the fungi belonging to the Asterinaceae family, to which it was added **V. costaricensis** (Syd.) Bat. & Vital n. comb., on **Miconia longifolii,** in Costa Rica, **V. faureae** (Doidge) Bat. & Vittal, on **Faureae Mc. Naughtonii,** on Cape, South Africa and **V.radiata** (Doidge) Bat. & Vital on undeterminated Leguminosae, in East Portuguese Africa, at Rikattli.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 323-329, 1960

LEMBOSIELLINA E PARASTERINOPSIS, DOIS NOVOS GÊNEROS DE ASTERINACEAE (*)

A. CHAVES BATISTA
H. SILVA MAIA

Dois novos gêneros de fungos **Asterinaceae** são propostos pelos A.A. nesta publicação.

Lembosiellina compreenderá os fungos de ascostromas lineares, semelhantes a **Lembosia** Lév., porém dotados de ascos parafisados e ascosporos hialinos, sendo seu tipo **L. pernambucensis** n. sp., ao passo que **Parasterinopsis** abrangerá os fungos semelhantes a **Parasterina** Theiss. & Syd., mas de ascosporos feofragmos, tendo **P. sersalisiae** (Hansf.) Bat. como tipo.

LEMBOSIELLINA Bat. & Maia, n. gen.

Tipo: **L. pernambucensis** nobis

Micélio superficial, marron, de hifas reticuladas, com hifopódios laterais e haustórios mesofílicos, sem setas.

Ascostromas semelhantes a **Lembosia.**

Ascos bitunicados, 8-esporos, parafisados. Ascosporos 1-septados, hialinos.

Typus — **L. pernambucensis** nobis.

Mycelium superficiale, brunneum, ex hyphis reticulatis, lateraliter hyphopodiatis, haustoriis usque mesophyllicis, non setosis, compositum.

Ascostromatibus **Lembosiae** similibus. Asci bitunicati, 8-spori, paraphysati. Ascosporae 1-septatae, hyalinae.

Obs.: O gênero **Lembosiellina**, ora proposto, difere de **Lembosia** Lév e de **Morenoella** Speg. por apresentar ascos parafisados, com ascosporos hialinos à maturidade.

(*) Publicação nº 135

As suas características parecem bem firmadas, do ponto de vista do **taxon**, pois, anteriormente, não se descrevera outro gênero de esporos hialodídimos, tendo micélio hifopodiado e ascostromas linear-elipsoides.

Lembosidium Speg. (Bol. Acad. Nac. Ci. Cordoba, 26: 342, 1922) foi descrito como possuindo ascostromas lineares de ascosporos hialodídimos, porém destituido de micélio livre. Contudo Von Petrak & Sydow (Ann. Myc. XXXII: 163, 1935), reexaminando o tipo de Spegazzini, assinalaram a presença de micélio hifopodiado e ascostromas com esporos oliváceo-marron, claros, que o identificam como **Lembosia** Lév, além da presença de **Phyllachora**, no mesmo material. E reconheceram, então, a espécie **L. portoricensis** Speg. como igual a **Lembosia coccolobae** Earle.

Stevens & Ryan (The Microthyriaceae — Univ. IU. Press, III. pág. 39, 1939) referem **Lembosidium** Speg., aparentemente desconhecendo o aludido trabalho de Petrak & Sydow, o mesmo verificando-se, mais tarde, com Hansford (The Foliicolous Ascomycetes, etc. Comm. Myc. Inst. Myc. Pap. nº 15, pág. 167, 1946).

LEMBOSIELLINA PERNAMBUCENSIS Batista & Maia n. sp.

Plágulas epífilas, negras, nunca hipófilas, 0.5 — 1 mm de diam.

Micélio superficial, marron, não setoso, hifopodiado, sinuoso, telemórfico-reticulado, de hifas lisas, septadas, com células de 17.5 — 25 x 2.5 — 4 u.

Hifopódios laterais, contínuos, nodulares, lisos, esparsos, de côr marron mais intensa do que a do micélio, 5 — 7.5 x 2.5 — 7.5 u.

Haustórios hialinos a levemente corado, septados, simples ou ramificados, globosos, a sub-globosos, espinescentes na porção bulbosa, colonizando as células da epiderme e do mesófilo. Medem de 5.6 — 9 x 1 — 1.5 u e, na porção bulbosa, de 3 — 4.5 de diam.

Ascostromas lineares, negros, carbonáceos, 168 — 450 x 40 — 95 u, não setosos, ástomos abrindo-se em fenda longitudinal com 10 — 12.5 u larg., Fig. 1, de células parietais indistintas e bordos franjados, com células de 7.5 — 10 x 2.7 — 3 u, multiascígeros; parede superior de 12 — 24 u de espessura; parede basal hialina, de 0.5 — 1.2 u de diam. Fig. 2-a.

Ascos hialinos, bitunicados, cilindráceos a sub-cilindráceos, séssèis a curtamente pedicelados, 8 esporos, 20 — 32.5

x 7.5 — 15 u. Paráfises filiformes, ramificadas, septadas, 0.5 — 1.5 u de diam. Fig. 2-b.

Ascosporos elipsoides ou clavados, 1-septados, constric-



Fig. 1

LEMBOSIELLINA PERNAMBUCENSIS Batista & Maia n. sp

a-b) Ascostromas e micélio.

Orig.

tos, lisos, de célula apical rotunda e basal acuminada, polísticos, não caudados, 10 — 17.5 x 3.5 — 6.5 u.

Sôbre fôlhas vivas de **Didymopanax morototoni** — Dois Irmãos. Recife, H. S. Maia, 2-9-956. Tipo, 5783, associado a **Peltasterella lembosicola** n. sp. Bat. & Maia.

Plagulae epiphyllae, atrae, 0.5-1 mm diam. Mycelium superficiale brunneum, ex hyphis sinuosis, reticulatis, septatis, ex cellulis 17.5-25 x 2.5-4 u. Hyphopodia lateralia, continua, nodulata, laevia, sparsa, 5-7.5 x 2.5-7.5 u; haustoria bulbosa, spinescentia, 3-4.5 u diam



Fig. 2

LEMBOSIELLINA PERNAMBUCENSIS Bat. & Maia n. sp.

a) Ascostroma em córte longitudinal, observando-se ainda haustórios espinescentes;
b) Ascos e paráfises;
c) Ascosporos.

Orig.

in area dilatata, usque mesophyllica. Ascostromata linearia, atra, carbonacea, 168-450 x 40-95 u glabra, longitudinaliter rimosa, rima 10-12.5 u diam; paries superior 12-24 u cr, ex cellulis indistinctis, marginibus fimbriatis; paries basalis hyalina, 0.5-1.2 u cr. Asci cylindracei vel sub-cylindracei, sessiles vel curto stipati, 8-spori, bitunicati, 20-32.5 x 7.5-15 u. Paraphysibus filiformibus, ramosis, septatis, 0.5-1.5 u cr. Ascosporae ellipsoideae vel clavatae, 1-septatae, constrictae, hyalinae, polystichae, 10-17.5 x 3.5-6.5 u. In foliis vivis **Didymopanacis morototoni**, socius **Peltasterellae lembosicolae** nobis (status imperfecti?) Dois Irmãos — Recife — Leg. H. S. Maia, 2-9-956. Typus, 5783, IMUR.

PARASTERINOPSIS Bat. n. gen.

Tipo: P. sersalisiae (Hansf.) Bat. n. comb.

Micélio livre, reticulado, marron, não setoso, com hifopódios laterais.

Ascostromas orbiculares, plano-convexos, radiados, marron-negros, glabros, de dehiscência estelar.

Ascos 4 — 8 esporos, 2-tunicados.

Paráfises filiformes simples ou ramificadas, hialinas.

Ascosporos cilindráceos com 3 ou mais septos transversais, marron.

Typus — **Parasterinopsis sersalisiae** (Hansf.) Bat. n. comb.
Mycelium liberum, reticulatum, brunneum, non setosum, lateraliter hyphopodiatum. Ascostromata orbiculata, plano-convexa, radiata, dehiscentia stellata, atrobrunnea, glabrata. Asci 4-8-spori, 2-tunicati. Paraphysibus filiformibus, simplicibus vel ramosis, hyalinis. Ascosporae cylindraceae, 3 pro more transversaliter septatae, brunneae.

É **Meliolastetr** v. Hohn., parafisado.

PARASTERINOPSIS SERSALISIAE (Hansf.) Bat. n. comb.

Sin. **Patouillardina sersalisiae** Hansf.
in — Proc. Linn. Soc. Lond. 156 sess: 117, 1943-4.

Plágulas hipófilas, efusas, tênues, marron-claras, confluentes.

Micélio superficial, marron claro, não setoso, telemórfico, de hifas septadas, não constrictas apresentando ramificações opostas, alternas e uni-laterais em ângulos de 45 a 90°; células hifais de 16,5 — 25,5 x 2,5 — 4 u.

Hifopódios laterais, cilindráceos, 2 celulares; célula basal cilindrácea de 6,5 — 12,5 x 4 — 5 u; célula apical recurvada, às vêzes lobada, 6 — 10 x 3 — 5 u.

Ascostromas superficiais, dispersos, orbiculares, marron-negros, isolados ou confluentes, membranosos, glabros, de dehiscência estelar, 100 — 170 u de diam., subparenquimáticos; parede superior radiada, de células retangulares, 6,5 — 10 x 4 — 5 u; margens com hifas franjadas, marron claras, telemórficas, não hifopodiadas, com células de 12,5 — 20,5 x 2,5 — 4 u; membrana basal tênue, hialina.

Ascos elipsoides a clavados, sésseis ou nodoso-estipitados, 4 a 8 esporos, bitunicados, 46 — 56,5 x 19 — 27 u.

Paráfises simples ou ramificadas, septadas, 2 — 2,5 u de diam.

Ascosporos paralelos, cilíndricos, lisos, 4-septados, constrictos, conglobados, marron claros, de 35 — 51,5 x 5,5 — 6,5 u. Fig. 3.

Sôbre fôlhas de **Sersalisia edulis** Kisubi — Entebbe, associado a **Parasterina robusta** (Doidge) Bat. e **Meliola sersalisiae** Hansf. Leg. C. G. Hansford, XII, 1944.

Tipo, nº 3650, no Herb. Mycologist. Dep. Agr. Uganda.



Fig. 3

PARASTERINOPSIS SERSALISIAE (Hansf.) Bat.

a) Sector da parede superior do ascostroma e micélio hifopodiado;
b) Ascos parafisados;
c) Ascosporos.

Plagulae hypophyllae, effusae, tenues, brunnescentes.

Mycelium ex hyphis dilute brunneis, non setosis, septatis, non constrictis, opposite, alternatim vel lateraliter ramosis in angulis 45-90.º, ex cellulis 16,5-25, x 2,5-4, compositum.

Hyphopodia lateralia, 2-cellularia, cylindracea; cellula basalis cy-

lindracea 6,5-12,5 x 4-5 u; cellula apicalis recurvata vel lobata, 6-10 x 3-5 u. Ascostromata sparsa, simplicia vel confluentia, atro-brunnea, membranosa, glabrata, stellatim dehiscens, 100-170 u diam; paries superior subparenchymaticus, radiatus, ex cellulis rectangularibus 6,5-10 x 4-5 u; marginibus fimbriatis, ex hyphis brunnescentibus, haud hyphopodiatis, ex cellulis 12,5-20,5 x 2,5-4 u; paries basalis tenuissimus, hyalinus, efformatus. Asci ellipsoidei vel clavati, sessiles vel nodosostipitati, 4-8-spori, 2-tunicati, 46-56,5 x 19-27 u.

Paraphysibus filiformibus, simplicibus vel ramosis, septatis, hyalinis, 2-2,5 u diam.

Ascosporae parallelae, cylindraceae, leves, 4-tranversaliter septatae, constrictae, brunnescentes, 35-51,5 x 5,5-6,5 u.

In foliis **Sersalisiae edulis,** socius **Parasterinae robustae** (Doidge) Bat. et **Meliolae sersalisiae** Hansf. Kisubi — Entebbe. Leg. C. G. Hansford, XII — 1944. Typus n.° 3650, Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda.

ABSTRACT

This contribution deals with two new genera of fungi, of the Asterinaceae family:

Lembosiellina Batista & Maia, which is paraphysate, with linear ascostromata and hyaline ascospores, hence differing from **Lembosia** Lév., having as type species **L. pernambucensis.**

Parasterinopsis Batista will group Parasterina as fungi, but with phaeophragmeous ascospores; the types species is **P. sersalisiae** (Hansf). Batista n. comb. on **Sersalisia edulis.**

RÉSUMÉ

Il s'agit, dans cette contribution, de deux nouveaux genres de champignons de la famille Asterinaceae: **Lembosiellina** Batista & Maia, paraphysé, avec ascostromes linéaires et ascospores hyalines, partant se diversifiant de **Lambosia** Lév., et ayant comme espèce type **L. pernambucensis.**

Parasterinopsis Batista pourra grouper les champignons semblables à Parasterina, mais avec d'ascospores phaeophragmes; l'espèce type est **P. sersalisiae** (Hansf) Batista n. comb. sur **Sersalisia edulis.**

Atas do IMUR
Ano I, págs. 331-336, 1960

CLADOCHAETE FEVILLEAE n. sp., POSSÍVEL ESTÁDIO METAGENÉTICO DE PHAEODIMERIELLA FEVILLEAE n. sp. (*)

A. CHAVES BATISTA
M. L. NASCIMENTO
MARIE L. FARR

INSTITUTO DE MICOLOGIA — UNIVERSIDADE DO RECIFE

Apresentamos neste trabalho as descrições de duas espécies de fungos de hábitos hiperparasitários sôbre Asterinaceae, sendo uma caracterìsticamente do gênero **Cladochaete** e a outra um **Phaeodimeriella.**

Êsses fungos, intimamente associados sôbre plágulas de **Asterina hamatula** Cif. e **Asterostomella walleniae** Petrak & Cif., quase indiferençáveis ao estereoscópio, por sua morfologia globosa e presença de setas contínuas, de ápice dicotômicamente ramificado, parecem conservar entre si estreitas relações biológicas, sendo **Cladochaete, possìvelmente,** o estado imperfeito de **Phaeodimeriella.**

Os fungos em tela, sôbre especímen de herbário, conservados sob envenamento, desde 1930, não puderam ser cultivados nos meios de laboratório e, por isso, foi-nos impraticável obter provas de que, de fato, as formas picnidiais de **Cladochaete** constituiriam uma fase evolutiva do **Phaeodimeriella**.

As diversas espécies de **Phaeodimeriella,** contudo, apresentam-se associadas a algum Sphaeropsidaceae, e até Hansford, C. G. (The Foliicolous Ascomycetes, etc. **in** Comm. Myc. Pap. 1946), ao focalizar a diagnose dêsse gênero, aponta **Ectosticta** e **Cicinnobella** como representativos de seu estádio conidial, declarando, entretanto, que a intergradação entre êsses Sphaeropsidaceae é tão ampla, que se torna virtualmente impossível separá-los, e assim considera sòmente o estádio peritecial de **Phaeodimeriella**.

(*) Publicação nº 136

Em nosso caso, porém, **Cladochaete fevilleae** é descrito como entidade autônoma, até que, eventualmente, sejam obtidas em cultivo as provas de que representa, sem contestação, um prévio degráu na escala filogenética da evolução de **Phaeodimeriella fevilleae** n. sp.

Salientamos, igualmente, que **P. fevilleae** se distancia das outras espécies conhecidas de **Phaeodimreiella**, pelo tamanho de seus peritécios e tipo das setas.

Também **Cladochaete fevilleae** afigura-se-nos distinto dos demais, não obstante as suas setas assemelharem-se às de **C. horrida** (Oud.) Sacc.

CLADOCHAETE FEVILLEAE Bat., Nasc. & Farr. n. sp.

Micélio hipófilo, superficial, densamente associado ao micélio de **Asterina hamatula** Cif., sub-hialino a marron-claro, irregularmente ramificado, sem setas, não hifopodiado, septado, não constricto, tendo células de 7.5 — 16 x 2 — 3 u.

Picnídios sub-globosos, de colapso deprimido, gregários, de 85 — 100 u de diam., pseudo-ostiolados, 9 — 15 u de diam marron, membranosos, setosos, sub-parenquimáticos, de células parietais poligonais, 3 — 8 x 3 — 5.5 u. Fig. 1.

Setas picnidiais como fulcros, de 3 — 8, marron-negras, erectas, ramificadas, dicotomicamente, contínuas, de 19 — 28 x 4.5 — 6 u. Picnidiosporos elipsoides ou fusoide-clavados, oliváceos a marron-claros, contínuos, numerosos, 6.5 — 11 x 2 — 3 u.

Sôbre fôlhas de **Fevillea cordifolia** L., associado a **Phaeodimeriella fevilleae** Bat., Nasc. & Farr., e parasitando **Asterina hamatula** Cif. e **Asterostomella walleniae** Petrak & Cif. Samaná — Dominica, E. L. Elkman, 13-6-930. Tipo, nº 244, ex R. Ciferri, Mycoflora Domingensis Exsiccata, no Herb. de The Pennsylvania State Univ.

Mycelium hypophyllum, superficiale, subhyalinum vel brunescens, irregulariter ramosum, non setosum, haud hyphopodiatum, septatum, non constrictum, ex cellulis 7.5-16 x 2-3 u, compositum. Pycnidia superficialia, sub-globosa, colapso depressa, pseudo-ostiolata, 9-15 u de diam, brunnea, setosa, parietibus membranosis, subparenchymaticis, ex cellulis polygonalibus, 3-8 x 3-5.5 u, efformatis. Setae pycnidiales atro-brunneae 3-8, erectae, dichotomicae ramosae, continuae, 19-28 x 4.5-6. Pycnidiosporae ellipsoideae vel fusoide-clavatae, olivaceae vel brunnescentes, continuae, numerosae, 6.5-11 x 2-3 u.

In foliis **Fevilleae cordifoliae L.** socius **Phaeodimeriellae fevilleae** Bat., Nasc. & Farr. parasita in **Asterina hamatula** Cif. et **Asterostomella walleniae Petrak** & Cif. Samaná — Dominica, E. L. Elkman, 13.6.930. Typus, n.º 244, ex R. Cifèrri, Mycoflora Domingensis Exsiccata, in Herb. The Pennsylvania State University.

FIG. 1

CLADOCHAETE FEVILLEA Bat. Nasc. & Cif. n. sp.

Picnídio setoso e picnidiosporos.

Orig.

PHAEODIMERIELLA FEVILLEAE Bat., Nasc. & Farr n. sp.

Micélio hipófilo, superficial, entrelaçado ao micélio de **Asterina hamatula** Cif., sub-hialino a marron-claro, sem setas ou hifopódios, septados, não constricto, irregularmente ramificado, tendo células de 7.5 — 16 x 2 — 3 u.

Peritécios sub-globosos, de colapso deprimido, sésseis, gregários, 110 — 125 u de diam., ostiolados, membranosos, setosos, marron, sub-parenquimáticos, de células parietais poligonais, 4.5 — 9 x 3 — 6.5 u; ostíolo irregularmente circular, central, de 11 — 17 u de diam.; setas à maneira de fúlcios, marron, erectas, contínuas, de 5 — 10, ramificadas dicotomicamente, obtusas, 19.5 — 27 x 4.5 — 6 u.

Ascos cilindráceos a elipsoides, 1-tunicados, sésseis, parafisados, 8 esporos, 29.5 — 32 x 9.5 — 11 u; paráfises, septadas, simples, de 1.5 u de diam. Ascosporos cilindráceo-oblongos, marron, 1-septados, constrictos, monósticos ou dísticos, de 9 — 11 x 3.5 — 4 u. Fig. 2.

Sôbre fôlhas de **Fevillea cordifolia L.** associado a **Cladochaete fevilleae** Bat., Nasc. & Farr em parasitismo sôbre **Asterina hamatula** Cif. e **Asterostomella walleniae** Petrak & Cif. Samaná — Dominica. E. L. Elkman, 13-6-930. Tipo, nº 244, ex R. Ciferri Mycoflora domingensis, no Herb. de The Pennsylvania State Univ.

Mycelium hypophyllum, superficiale, subhyalinum vel brunnescens, non setosum, haud hyphopodiatum, ex hyphis irregulariter ramosis, septatis, non constrictis, ex cellulis 7.5-16 x 2-3 u, compositum. Perithecia subglobosa, colapso depressa, sessilia, gregaria, 110-125 u diam, ostiolata, 11-17 u diam, membranosa, setosa, brunnea, subparenchymatica, parietibus ex cellulis polygonalibus, 4.5-9 x 3-6.5 u, efformatis. Setae peritheciales 5-10, brunneae, erectae, continuae, dichothomicae, apicaliter ramosae, obtusae, 19.5-27 x 4.5-6 u. Asci cylindracei vel ellipsoidei, 1-tunicati, sessiles, 8-spori, 29.5-32 x 9.5-11 u. Paraphysibus filiformibus, septatis, simplicibus, 1.5 u cr. Ascosporae cylindraceo-oblongae, brunneae, 1-septatae, constrictae, monostichae vel distichae, 9-11 x 3.5-4 u. In foliis **Fevilleae cordifolii** L. socii **Cladochaetae fevilleae** Bat., Nasc. & Farr, parasita in **Asterina hamatula** Cif. & **Asterostomella walleniae** Petrak & Cif. Samaná, Dominica. E. L. Elkman, 13.6.930. Typus, n.º 244, ex Ciferri Mycoflora domingensis, in Herb. The Pensylvania State Univ.

FIG. 2

PHAEODIMERIELLA FEVILLEAE Bat., Nasc. & Farr. n. sp.

Peritécio setoso, asco e ascosporos.

Orig.

ABSTRACT

The A. A. are describing in this paper **Cladochaete fevilleae** Bat. Nasc. & Farr, n. sp. and **Phaeodimeriella fevilleae** Bat. Nasc. & Farr, n. sp. as hyperparasites of **Asterina hamatula** Cif. and **Asterostomella walleniae** Petrak & Cif.

They admit the possibility of **Cladochaete fevilleae** being an imperfect stage of **Phaeodimeriella fevilleae** but they were unable to prove the real existence of such relationship.

RÉSUMÉ

Les auteurs décrivent dans ces feuilles **Cladochaete fevilleae** Batista, Nasc. & Farr n. sp. et **Phaeodimeriella fevilleae** Batista, Nascimento & Farr, comme hyperparasites de **Asterina hematula** Cif. et **Asterostomella walleniae** Petrak & Cif.

Ils admettent la possibilité de **Cladochaete fevilleae** être un état imparfait du **Phaeodimeriella fevilleae;** cependant ils se trouvent dans l'impossibilité de prouver cette relation.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 337-347, 1960

ALGUMAS ESPÉCIES DE DIMERINA, DIMERIUM E PHAEODIMERIELLA, ASSINALADAS COMO HIPERPARASITAS (*)

A. CHAVES BATISTA
H. DA SILVA MAIA

Um grupo de fungos hiperparasitas constitue a razão dêste trabalho.

São espécies analisadas através do estudo do cotipo, como **Dimerina allogena** Syd., ou que identificamos, pela primeira vez, ao examinar especimens sôbre os quais tais fungos foram impròpriamente reconhecidos, como **Dimerium baccharidicola** (P. Henn.) Sacc., e **Phaeodimeriella guarapiensis** (Speg.) Speg. ou ainda que foram diagnosticados sôbre novos hospedeiros, como **Dimerium leonensis** Hansf., sôbre **Poropeltis davillae** P. Henn., **Dimerium leptosporum** Speg. sôbre **Heraldoa oxyanthi** Bat., **Dimerium piceum** (B. & C.) Theiss., **Dimerium pulveraceum** (Speg.) Theiss.

DIMERINA ALLOGENA Syd.

In Ann. Myc. XXXVII: 342, 1939

Colônias hipófilas, marron-negras, circulares ou irregulares, isoladas ou confluentes, com 1 — 2 mm de diam.

Micélio, superficial, marron-claro, não setoso, não hifopodiado, septado, de hifas reticuladas, formadas de células cilindráceas de 11 — 14,5 x 2 — 3 u.

Peritécios superficiais, globosos ou sub-globosos, densamente gregários, glabros, ástomos a princípio, depois irregularmente ostiolados, hipófilos, oliváceo-marron, 50 — 80 u de diam., membranosos; paredes de 5 — 8 u de espessura e células parietais poligonais, de 4 — 10 u no maior diam. Fig. 1.

(*) Publicação nº 137

Ascos, elipsoides a obclavados, 1-tunicados, 8 esporos, aparafisados, 22 — 36 x 8 — 11,5 u.

Ascosporos oblongo-clavados, hialinos, 1-septados, levemente constrictos, dísticos, de polos rotundos, 8 — 11 x 2.5 — 3.5 u.

Hiperparasita sôbre **Isaria acaricida** Pat. em fôlhas de

Fig. 1

DIMERINA ALLOGENA Syd.

Peritécios, ascos e ascosporos.

Orig.

Chusquea serrulata Pilger. Hacienda San Antônio, pr. Banos, prov. Tungurahua, Equador. Leg. H. Sydow, 5-12-1937.

Cotipo de Sydow, nº 1151, Fungi exotici exsiccati, cedido pelo Magyar Nemzetti Museum — Hungria. Rev. por A. C. Batista & M. L. Nascimento.

DIMERIUM BACCHARIDICOLA (P. Henn) Sacc.

in Syll. Fung. XVII: 537, 1905
in Mycological Pap. nº 15, Comm. Myc. Inst. p. 76, 1946.

Plágulas epífilas formadas sôbre as de **Asterina.**
Micélio marron-claro a oliváceo, septado, ramificado, não setoso não hifopodiado, 2 — 4 u de diam.

Peritécios espalhados, superficiais sôbre o micélio, marron-negros, carbonáceos a coriáceos, globosos a sub-globosos, de colapso deprimido à maturidade, 62 — 100 u de diam.;

Fig. 2

DIMERIUM BACCARIDICOLA (P. Henn.) Sacc.

a) Peritécio visto sob secção longitudinal e implantado sôbre micélio de **Asterina sp**.
b) Asco parafisado;
c) Ascosporo.

Orig.

paredes de 10 — 13,5 u larg., formadas por uma só camada de células poligonais de 6 — 10 u de larg.; ostíolo indistinto.

Ascos — 2-tunicados, sub-clavados, curtamente pedicelados, 8-esporos, parafisados 43 — 40 x 12,5 — 16 u.

Paráfises filiformes, hialinas, septadas, ramificadas ou não, com 2 — 2,5 u larg. Fig. 2.

Ascosporos clavado-fusoides, 1-septados, marron-claros, constrictos, célula apical sub-globosa e caudal sub-cilindrácea ou fusoide, levemente espinescente, de 12 — 15 x 5 — 6,5 u.

Sôbre fôlhas de **Melanolepsis sp.** Luzon, Filipinas. Leg. M. S. Clemens, XI-1923. Sob o nº 1735, F. Petrak, **Mycotheca Generalis,** com o nome de **Dimerium clemensiae** Syd., que é agora sinônimo. Está associado a **Asterina sp.**

DIMERIUM LEONENSE Hansf.

In the Follicolous Ascomycetes, their Parasites and Associated Fungi. Commonw. Mycol. Inst. Mycol. pág. 15: 79, 1946.

Micélio escasso, parasitando picnostromas.

Peritécios espalhados ou gregários, subglobosos, 120 — 190 u de diam., marron ou marron-negros, à maturidade ostiolados, 15 — 20 u de diam., glabros, subcoriáceos, parenquimáticos, de paredes de 8 — 15 u de espessura, formadas por 2 — 4 camadas de células poligonais e arredondadas, 6,5 — 12,5 x 5 — 7,5 u, as quais são subhialinas na cavidade ascígera. Os peritécios situam-se sôbre espessamento da parede superior dos picnostromas parasitados apresentando-se sésseis, entretanto. Fig. 3.

Ascos cilindráceos, alongados, 2-tunicados, 6 — 8 esporos, simples ou fasciculados, basais, sésseis, 28 — 56 x 8 — 12 u.

Paráfises filiformes, simples, septadas, hialinas, mais longas do que os ascos, 0,5 — 1,5 u de diam.

Ascosporos oblongo-clavados, 1-septados, a princípio hialinos, depois marron, constrictos, tendo a célula superior um pouco mais desenvolvida.

Sôbre Poropeltis davillae P. Henn., em fôlhas de **Davilla rugosa.** Paulista, Pern.

Leg. Severino Pires, 24-2-953. Espec. nº 12741. IMUR.

Obs.: A identificação do fungo em tela salienta o seu assinalamento no Brasil, como hiperparasita de outro hospedeiro, que não **Meliola**.

Fig. 3

DIMERIUM LEONENSE (Hansf.) parasitando.
POROPELTIS DAVILLAE P. Henn.

Orig.

DIMERIUM LEPTOSPORUM Speg.

in Rev. Mus. La Plata, XV: 14, 1918

Sin.: **Dimerium singaporense** Sacc.
Dimerium japonicum Syd.
Bolosphaera degenerans Syd.
? **Dimerosporium pannosum** Speg.
? **Dimerium paulense** (P. Henn.) Sacc.

Esta sinonimia é indicada por C. G. Hansford, in The Foliicolous Ascomycetes, etc. Mycol. Pag. nº 15, Comm. Mycol. Inst. pág. 76, 1946.

Micélio oliváceo, escasso, de hifas indistintamente sep-

Fig. 4

DIMERIUM LEPTOSPORUM Speg.

Peritécio em secção longitudinal.

Orig.

tadas, 2 — 4 u de diam. Peritécios superficiais sôbre o micélio, às vêzes sôbre os ascostromas de **Heraldoa,** dispersos, ou gregários, ovoide-conoides, ástomos quando imaturos, Fig. 4, 70 — 140 u de diam., até 200 u de alt., de superfície áspera, irregular ou granulosa, marron-negros, pseudo-parenquimáticos, com as paredes formadas por células poligonais ou subglobosas, de 6 — 8 x 4,5 — 6 u de diam.; a espessura dessas paredes é de 20 — 35 u. Ascos clavados, 2-tunicados, 8 esporos, 35 — 64 x 10 — 18 u. Paráfises filiformes, quase sempre evanescentes. Ascosporos clavados, 1-septados, levemente constrictos, lisos, 2 — 3 seriados, marron-claros, 15 — 21 x 3,5 — 5 u. Fig. 5.

Sôbre **Heraldoa oxyanthi** Bat. n. sp., em fôlhas de **oxyanthus speciosus.** Entebbe Road, Leg. C. G. Hansford, 5-944. Espec. nº 3461, Herb. Mycologist, Dep. Agr. Uganda.

FIG. 5

DIMERIUM LEPTOSPORUM Speg.

Peritécio, ascoparafisado e ascosporos.

Orig.

DIMERIUM PICEUM (Berk & Curt) Theiss.

in Ann. Mycol. X: 5, 1912.

Micélio sub-hialino a marron-claro, ligeiramente constricto, septado, 5 — 13 x 2 — 3,5 u, superficial, parasitando micélio de Meliola sp.

Peritécios marron, superficiais, globosos, às vêzes de colapso deprimido, 82,5 — 209 u de diam., pseudo-ostiolados, isolados ou confluentes, glabros, membranosos; paredes sub-



Fig. 6

DIMERIUM PICEUM (Berk. & Curt.) Theiss.

Orig.

parenquimáticas formadas por células poligonais de 3 — 8 x 3 — 5,5 u, Fig. 6.

Ascos elipsoides a cilindráceos, 2-tunicados, 27 — 51,5 x 7 — 15 u, sésseis, 8-esporos, parafisados.

Paráfises hialinas, septadas, ramificadas 1,5 — 2 u diam., evanescendo à maturidade.

Ascosporos marron-claros, oblongo-elipsoides, 1-septados, constrictos, 8,5 — 16 x 3,5 — 6 u.

Sôbre fôlhas de **Neurolaena lobata** — Puerto Rico — F. L. Stevens, 12-8-915. Espec. nº 13348, IMUR.

DIMERIUM PULVERACEUM (Speg.) Theiss.

in Beih. Bot. Zbl. Abt. 2, XXIX: 50, 1912

Micélio pálido-oliváceo, septado, não hifopodiado, de 1.5 — 3 u de diam.

Peritécios globosos a sub-globosos, glabros, marron-negros, opacos, de 70 — 145 x 85 — 120 u, membranosos.

Ascos cilindráceos a sub-cilindráceos, 2-tunicados, sésseis, 8-esporos 32 — 40 x 8 — 12 u.

Paráfises filiformes, septadas, hialinas, simples, 0.5 — 1 u de diam.

Ascosporos oblongo-elipsoides, 1-septados, constrictos dísticos, marron-claros, lisos de 10 — 15 x 3 — 4 u larg.

Sôbre fôlhas de **Clidemia dentata**, parasitando **Parasterina schlechteriana** (Syd.) Bat. & Maia, associado a **Cicinnobella sp.**, San Pedro de San Ramon — Costa Rica. H. Sydow, 23-1-925. Det. A. Chaves Batista & H. Silva Maia, 15-6-1958.

PHAEODIMERIELLA GUARAPIENSIS (Speg) Speg.

In "Foliicolous Ascomycetes, etc." Myc. Pap. 15; 65 1946.

Micélio superficial, marron-claro a oliváceo, entrelaçado com o de **Asterina**, reticulado, tendo células de 10 — 12,5 x 2,5 — 5 u escasso.

Peritécios superficiais, espalhados ou agrupados, marron-negros setosos, globosos, sub-globosos ou conoides, 80 — 150 u de diam., 87,5 — 100 u de altura, ostiolados à maturidade; paredes de 10 — 15 u de espessura, formadas por 2 — 3 camadas de células poligonais de 6 — 9 x 5 — 6 u.

Setas periteciais marron-claras, rígidas não septadas, recurvadas ou não, 30 — 75 x 3,5 — 6 u, de ápice acuminado

e base bulbosa, com 7,5 — 10 u larg., nas paredes dos peritécios ou da região ostiolar. Fig. 7.

Ascos — cilindráceos a sub-cilindráceos, 2 tunicados, 30 — 42,5 x 12,5 — 15 u, curtamente pedicelados, 8-esporos, densamente parafisados. Paráfises filiformes, simples, septadas, hialinas, 1 — 1,5 u.

Ascosporos marron-escuros, 1-septados, lisos, constrictos, dísticos 12 — 15 x 5 — 6 u larg.

Sôbre fôlhas de Melastomacea, parasitando **Parasterina cissi** (Hughes) Bat. & Maia. São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Prof. Rick, S. J. 1906.

Obs.: Êste especímen, cedido pela Universidade de Zurich, tem a etiqueta seguinte: Rehm — Ascomycetes. 1699. **Asterina? Coriacella** Speg. ex Pilzcollection Dr. Alfr. Usterí.

Fig. 7

PHAEODIMERIELLA GUARAPIENSIS (Speg) Speg.

Peritécio, asco parafisado e ascosporos.

Orig.

ABSTRACT

This paper deals with the following hyperparasite fungi: **Dimerina allogena** Syd., **Dimerium baccharidicola** (P. Henn.) Sacc., **D. leonensis** Hansf. **D. leptosporum** Speg., **D. piceum** (B & C) Theiss. **D. pulveraceum** (Speg.) Theiss. and **Phaeodimeriella guarapiensis** (Speg.) Speg.

These fungi have been studied through the analysis of the cotype or identified on new hosts.

RÉSUMÉ

Il s'agit des champignons hyperparasites: **Dimerina allogena** Syd., **Dimerium baccharidicola** (P. Henn.) Sacc., **D. leonensis** Hansf. **D. leptosporum** Speg., **D. piceum** (B. & C.) Theiss., **D. pulveraceum** (Speg.) Treiss. et **Phaeodimeriella guarapiensis** (Speg.) Speg.

Ils furent étudiés dans les cotypes ou identifiés dans de nouveaux hôtes.

1959

INSTITUTO DE MICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO RECIFE
(Publicação n. 138)

A. CHAVES BATISTA, A. F. VITAL
& H. da SILVIA MAIA

Anotaçeõs taxonômicas de alguns Melanconíales

(COM 4 FIGURAS NO TEXTO)

FORLÌ
TIPOGRAFIA VALBONESI
1959

13 JUL 1959

INSTITUTO DE MICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO RECIFE
(Publicação n. 138)

A. CHAVES BATISTA, A. F. VITAL
& H. da SILVIA MAIA

Anotações taxonômicas de alguns Melanconíales

(COM 4 FIGURAS NO TEXTO)

Estas notas dizem respeito a uma sumária revisão dos seguintes fungos *Melanconiales*:

Gloeosporium sphaerelloides Sacc., assinalado sôbre *Hoja australis; Myxosporium latvicensis* Vital, Cif. & Bat. n. sp., estudado sôbre *Salix cinerea; Placella fraseriana* Syd. cujo tipo, sôbre *Aristida armata,* logramos examinar, graças à gentileza da Dra. L. FRASER, da Austrália.

GLOEOSPORIUM SPHAERELLOIDES Sacc.

in Michelia, I: 92; Syll. Fung. III: 709, 1884.

Acérvulos anfígenos, intraepidermais, gregários, isolados ou confluentes, punctiformes, marron, 162-324 μ de diam. Conidióforos hialinos, contínuos, cilindráceos, de 7,5-24 × 2,5-5 μ, raros até 50 μ de extensão, fasciculados. Conídios ovóide-oblongos, hialinos, de 10-15 × 2-5,5 μ contínuos, de citoplasma granuloso (fig. 1).

Sôbre *Hoja australis* R. Br. - Pennant Hills, New South Wales. Leg. L. FRASER, IV, 1937. Espec. n. 2091 Dep. Bot. University of Sydney.

MYXOSPORIUM LATVICENSIS

Vital, Ciferri & Batista n. sp.

Acérvulos localizados em áreas descoloridas, que envolvem o ramo numa extensão até de 4.5 cm, isolados, marron, arredondados, 360-725 μ de diâmetro, formados sob o periderma, o qual se fende, à maturidade do fungo, por fissura longitudinal ou por fendas irregularmente dispostas, apresentando então delgado estroma marron claro. Conidióforos cilindráceos ou clavados, 15-24 × 3-6 μ, hialinos, contínuos, paralelos, simples, desenvolvidos sôbre tênue estroma basal, marron-claro. Conídios elipsoides ou ovalados, hialinos, unicelulares, 20-25 × 10-12,5 μ, epispório espesso, citoplasma granulado, com apículo basal, não envoltos em substância mucosa (fig. 2). Estampa I.

E' afim de *M. diplodioides*, do qual difere por possuir conidióforos não fasciculados, de maiores proporções, e conídios sempre hialinos.

Esse fungo foi encontrado na mesma peça onde está *Thyrostromella salicella*, Moesz & Smarods, Material S/N do Herbarium J. Smarods - Fungi latvici, sôbre *Salix cinerea* L., Letônia, Riga, legado por J. Smarods, 29-6-1937 e que nos foi emprestado pelo Dr. G. Bohus, do Magyar Nemzetti Muzeum, Hungria.

Acervuli ramulicoli, in areis decoloratis usque 45 mm long., solitarii, brunnei, rotundati, 360-725 μ diam., sub periderma evoluti sed longitudinaliter ad maturitatem rimosi. Conidiophora continua, brunnescentia cylindracea vel clavata, parallela, simplicia, continua, hyalina, 15-25 × 3-6 μ et ex basali stroma erumpentia. Conidia ellipsoidea vel ovata continua, granulata, basaliter apiculata, hyalina, 20-25 × 10-12.5 μ. In ramulis *Salicis cinerei* L. - Latviae, socium *Thyrostomellae salicellae* Moesz & Smarods. Leg. J. Smarods, 29-6-937. Typus, in Magyar Nemzetti Museum, Hungria.

PLACELLA FRASERIANA Syd.

in Ann. Myc. XXXVI: 308, 1938

Micélio interno, de hifas hialinas, tendo células de 3-4,5 × 2,5-3 μ. Estromas acervuliformes à maneira de crostas, marron-negras, irregulares ou elipsóide alongados, confluentes, espalhados, numerosos, epidermais, coriáceos, de 0,3-1 mm. de extensão, 150-500 μ de diâm e 40-80 μ de espessura; contexto parenquimático, formado por células marron-claras subglobosas e poligonais, de 3-6 μ de diam.; extrato basal de 13,5-22 μ de altura; lóculo elipsóide, até 200 μ de larg. Conidióforos paliçadiços, 11,5-18 × 1-4 μ, septados, hialinos, cilindráceos, numerosos. Picnidiospóros oblongo - elipsóides, hialinos, acrógenos, com 4-7 × 2-3 μ, contínuos (fig. 3).

Sôbre *Aristida armata* Henrard. Entre Collie e Gilgandra, New South Wales. L. Fraser, 5-1-1936. Tipo, 198, H. Sydow, Dep. of Bot. Univ. of Sydney (fig. 4). Estampas I-II.

SUMMARY

In this paper the following *Melanconiales*: *Gloeosporium sphaerelloides* Sacc. on *Hoja australis; Myxosporium latvicensis* n. sp. on *Salix cinerea* and *Placella fraseriana* Syd. on *Aristida armata* are revised or described.

Reprint from **Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia** Serie **5**, Vol. **XVI**, pag. 127-130, 1959



ESTAMPA I.

Fig. 1. - acima: *Gloesporium sphaerelloides* Sacc.
Acérvulo e conídios. Orig.

Fig. 2. - no meio: *Myxosporium latvicensis* Vital, Ciferri & Batista n. sp.
Acérvulo e conídios.

Fig. 3. - em baixo: *Placella fraseriana* Syd.
Secção longitudinal do estroma acervuliforme. Orig.

ESTAMPA II.

FIG. 4. - *Aristida armata* Henr.
Lesões produzidas por *Placella fraseriana* Syd. Orig.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 349-358, 1960

LEPTOSTROMACEAE E SPHAEROPSIDACEAE NOVOS OU REESTUDADOS (*)

A. CHAVES BATISTA

J. AMÉRICO DE LIMA

Esta publicação dá conta dos estudos que os A.A. lograram efetuar sôbre alguns fungos Leptostromaceae e Sphaeropsidaceae.

Muitas espécies ora focalizadas são, aqui, ilustradas pela primeira vêz e examinadas do ponto de vista da moderna conceituação da taxonomia micológica.

Apomella casuarinae Syd., **Coniothyrium callistum** Syd., **Hendersonia phyllodiorum** Syd. são analisados e redescritos através do exame de cotipos; **Leptostroma pinastri** Desm. é conferido sôbre especímen de Starcs, da Letônia, **Metadiplodia encalypti** Syd. idem, sôbre especímen de L. Fraser, da Austrália, e **Plenodomus mollerianus** Bres. é identificado sôbre **Apeiba surinamensis**, de Pernambuco, Brasil.

Um novo gênero — **Schizothyropsis** Bat. & Vital, de picnostromas intra-cuticulares, não radiados, uni ou biloculares, globoso-deprimidos, com picnidiosporos contínuos, hialinos, tendo como tipo **S. citri** Bat. & Vital, n. sp., é descrito entre os Leptostromaceae.

Também é ilustrado o fungo **Scutopeltis alafiae** Bat. & Maia, prèviamente publicado (Rev. Biolog. Portugal, 1, nº 2: 123, 1957).

APOMELLA CASUARINAE Syd.

in Ann. Myc. XXXV: 47. 1937

Picnostromas não maculícolas, marron-negros, sub-epidérmicos, Fig. 1, plano-convexos, ástomos, semicirculares ou irregulares, coriáceo-membranosos, isolados, confluentes ou

(*) Publicação nº 139

gregários, de 100 — 200 u de diam. e 55 — 80 u de alt.; parede superior estromática, de 8 — 19 u de espessura, formada por células poligonais, marron-negras de 5 — 12 x 2 — 7 u; parede basal de 4,5 — 12 u de diam., constituida por células sub-hialinas, de 4 — 7 x 2,5 — 6 u; lóculos vários, sub-globosos, de 110 — 200 x 56 — 60 u de altura. Picnidiosporos elipsoides ou clavados, hialinos, acrógenos, contínuos, de epispório liso e espesso com 1 polo rotundo e outro reto, 18 — 24 x 7 — 9 u; prendem-se na parede basal em conidióforos hialinos, simples contínuos, cilindráceos de 10 — 18 x 2,5 — 3,5 u.

Sôbre ramos de **Casuarina suberosa** Ott & Diet Mt. Wilson, New South Wales. VI, 1932. — Leg. L. Fraser. Cotipo de Sydow, nº 83, Dep. Bot. Univ. of Sydney.



Fig. 1

APOMELLA CASUARINAE Syd.

Picnostroma sob secção longitudinal.

Orig.

CONIOTHYRIUM CALLISTUM Syd.

in Ann. Myc. XXXV: 358, 1937

Máculas anfígenas, espalhadas, 2 — 7 mms de diam., amarelo violáceas, de margens elevadas.

Micélio marron-claro, septado, inter e intracelular, irregularmente ramificado, não constricto, de 2,5 — 5,5 u de diam.

Picnostromas na área central das lesões, marron-negros, subglobosos, gregários, de 140 — 200 u de diam., 108 — 157 u de altura, globosos, imersos, depois irrumpentes, anfígenos, membranosos; ostíolo atípico; paredes subparenquimáticas

de 13 — 35 u de diam., formadas por várias camadas de células poligonais de 4 — 6 x 2,5 — 6 u, Fig. 2.

Conidióforos hialinos, contínuos, papiliformes a subcilindráceos, numerosos, ocupando todo o lóculo picnostromático, de 4,5 — 10 x 1 — 2,5 u.



Fig. 2

CONIOTHYRIUM CALLISTUM Syd.

Orig.

Conídios ovoides, elipsoides ou subglobosos, marron-claros, contínuos, de 2 — 8 x 4 — 5 u.

Sôbre fôlhas de **Eucalyptus haematostoma** Smith. Beeli, New South Wales, — Leg. L. Fraser, VIII, 1935. Cotipo de H. Sydow, nº 158, generosamente cedido pela Dra. L. Fraser.

HENDERSONIA PHYLLODIORUM Syd.

in Ann. Myc. vol. XXXV: 361, 1937

Máculas anfígenas, irregulares ou orbiculares, marron-negras, isoladas ou confluentes, com 2 — 3 mm de diam., de linha marginal elevada, negra.

Picnostromas anfígenos, desenvolvendo-se irregularmente nas máculas, imerso-irrumpentes, subglobosos ou irregulares, marron-negros, 145 — 250 x 240 — 350 u; ostíolo central de 14 — 25 u; paredes subparenquimáticas, de 27,5 — 55 u de altura, formadas por células poligonais e arredondadas, de 4 — 13 x 3,5 — 10 u, em duas camadas bem distintas: uma interna, hialina e outra externa marron.

Picnidiosporos numerosos, oblongos, ovais ou fusoides, 1 — 3 septados, não constrictos, oliváceos a marron, lisos, de 10 — 15 x 5 — 8 u.

Conidióforos pouco desenvolvidos, confundindo-se com as células da parede interna, hialinos, cilindráceos, contínuos, com 4,5 — 6 x 2 — 2,5 u. Fig. 3.

Sôbre **Acacia gladiformis** A. Cunn. Orange, N. S. Wales XI-1935. Leg. M. Groundwater. Det. por H. Sydow.

Obs.: A descrição supra deriva do exame do cotipo de H. Sydow, espec. nº 156, do Dep. Bot. da Univ. de Sydney.



Fig. 3

HENDERSONIA PHYLLODIORUM Syd.

Picnostroma.

Orig.

LEPTOSTROMA PINASTRI Desm.

in Ann. Sci. Nat. XIX: 338, 1843
Syll. Fung. III: 641, 1884

Micélio interno de hifas marron-claras, septadas, com células de 6 — 18 x 1 — 2,5 u, ligeiramente constrictas, penetrando até o mesófilo.

Picnídios dimidiados, marron-negros, sub-cuticulares ou imersos, membranosos, 0,5 — 1 mm de diam.; lóculo 175 — 300 u de diam. 54 — 70 u de altura; paredes sub-parenquimáticas, formadas por células poligonais; parede superior marron-negra, 27 — 62 u de altura; parede inferior marron-clara, sub-parenquimática, também formada por células po-

ligonais de 2,5 — 7,5 x 2,5 — 5 u, com a espessura de 16 — 40 u. Fig. 4.

Conidióforos hialinos, cilindráceos, 16,5 — 24 x 1 — 3 u.

Picnidiosporos hialinos, unicelulares, cilindráceos, de 5 — 8 x 0,5 — 2 u.

Sôbre **Pinus silvestris**. Prov. Vidzeme, Riga, Letonia. Leg. K. Starcs, 8-7-934. Espec. nº 1175, ex Herb. K. Starcs.



Fig. 4

LEPTOSTROMA PINASTRI Desm.

Córte em secção longitudinal.

Orig.

METADIPLODIA EUCALYPTI Syd.

In Ann. Myc. Vol. XXXV: 359, 1937
Bull. Soc. Mycol. France, LXX — fasc. 3: 278, 1954

Micélio intramatrical marron-negro.

Picnostromas anfígenos, imersos, grupados, sub-globosos, ovoides ou irregulares, marron, membrano-carnosos, 144 — 400 u de altura e 150 — 350 u de diam.; ostíolo com 20 — 22

u de diam.; paredes sub-parenquimáticas, de 7 — 14,5 de diam., formadas por células poligonais de 3,5 — 8 x 2 — 4,5 u. Fig. 5.

Picnidiosporos oblongos, ovoide-alongados, hialinos a princípio, depois marron, 1-septados, polos rotundos, às vêzes piriformes, 12,5 — 20 x 6,5 — 8 u. Conidióforos hialinos, ao redor de tôda a cavidade picnostromática, cilindráceos ou conoides, simples, contínuos, 5 — 13 x 2,5 — 3 u.

Sôbre fôlhas de **Eucalyptus blakelyi**, Mayden, Coonabarabran, New South Wales. Leg. L. Fraser, I — 1936. Det. H. Sydow. Espec. nº 191, University of Sydney.



Fig. 5

METADIPLODIA EUCALYPTI Syd.

Picnostroma imerso.

Orig.

PLENODOMUS MOLLERIANUS Bres.

In Fung. Lusit. p. 6
Syll. Fung. X: 213, 1892.

Plágulas marron-negras, carbonáceas, isoladas, circulares a sub-circulares, 0,5 — 1,5 mm. de diam.

Micélio livre ausente.

Picnostromas imerso-irrompentes, abrindo fendas na matriz, aglomerados e confluentes; subhemisféricos, de base aplanada, ástomos, glabros, carbonáceos, rijos, 500 u — 1,5 mm de diam..

Lóculo elipsoidal, 194,5 — 450 x 48,5 — 121,5 u. Parede superior pseudo-parenquimática, marron-negra, de 60,5 — 218,5 u, formada por células cilindráceas, alongadas, marron claras a negras, de 9 — 19 x 2,5 — 5 u; parede inferior de côr marron clara a hialina, constituida por células poligonais e arredondadas, de 5 — 11,5 x 3 — 5 u.

Himênio fértil em todo o lóculo picnostromático.

Conidióforos cilindráceos, contínuos, hialinos, simples e ramificados, 4 — 6,5 x 1 — 1,5 u.

Picnidiosporos cilindráceo-alongados a subfusoides, contínuos, direitos ou recurvados, hialinos, de 5 — 7,5 x 1 — 1,5 u.

Sôbre o córtex de **Apeiba surinamensis.** Dois Irmãos — Recife — Leg. Oswaldo Soares. 23-2-58. Espec. nº 12737, IMUR.

SCHIZOTHYROPSIS n. gen. Bat. & Vital.

Tipo: **S. citri** nobis

Micélio livre ausente.

Picnostromas maculícolas, intracuticulares, globoso-deprimidos, uni ou biloculares, negros; parede superior não radiada, ástomo, fendilhando-se irregularmente, à maturidade, uni ou biloculares; himênio fértil em tôda a cavidade locular.

Conidióforos simples. Picnidiosporos elipsoides, hialinos, contínuos.

Typus: **S. citri** nobis.

Mycelio libero nullo. Pycnostromata maculicola, intracuticularia, globoso-depressa, uni vel bilocularia, atra; paries superior non radiatus, astomus. Hymenium fertile in tota cavitate. Conidiophori simplices. Pycnidiosporae continuae, hyalinae.

Obs.: É afim de **Schizothyra** Bat. & Costa, e **Schizothyrella** Thüm., diferindo de ambos por não possuir picnidiosporos catenulados, nem parede superior radiada.

SCHIZOTHYROPSIS CITRI Bat. & Vital n. sp.

Máculas epífilas, marron-claras, arredondadas, 0,5 — 2 mm de diam., no seio das quais são vistas, ao microscópio estereoscópico, diminutas pontuações ou estrias negras, além

das saliências cupuliformes dos picnídios; micélio ausente.

Estromas intracuticulares, efusas, de estratura imprecisa, hialinos ou sub-hialinos, apresentando pequenas áreas marron-negras, opacas.

Picnostromas também intracuticulares, plano-convexos,



Fig. 6

SCHIZOTHYROPSIS CITRI Bat. & Vital

a) Primórdio;
b) Picnostroma individualizado.

Orig.

uni ou biloculares, negros, 155 — 215 u de diam. e 57,5 — 103 u de alt., isolados ou raro 2 — confluentes; **parede superior** marron-negra, opaca, de consistência entre coriácea, 14 — 33 u de espessura, ástoma, fendilhando-se irregularmente à maturidade; **parede inferior** marron-clara, 2,5 — 3 u de espessura. Fig. 6 e 7.

Conidióforos revestindo tôda a cavidade picnostromática, conóides, simples, 3,5 — 7 x 1,5 — 2,5 u, hialinos.

Picnidiosporos elipsóides, gutulados, hialinos, 3,5 — 5 x 1,5 — 2 u, contínuos.

Sôbre folhas de **Citrus sp.** Paraguai, 1880. Tipo, n.º 4076, da coleção Balansa, sob a etiqueta de **Polystomella pulcherrima**, Speg., New York Botanical Garden.

Mycelio libero nullo.

Maculae epiphyllae, brunnescentes, rotundatae, 0,5-2 mm diam.

Stromata intracuticularia, effusa, hyalina vel subhyalina;

Pycnostromata plano-convexa, nigra, 155-215 u diam., 57-103 u alt, 1-2 locularia; paries superior ater, opacus, coriaceus vel carbonaceus, 14-33 u cr. irregulariter dehiscens ad maturitatem; paries basalis brunnescens, 2,5-3 u cr.

Conidiophori conoidei, simplices, hyalini, 3,5-7 x 1,5-2,5 u, in tota pycnostromatis cavitate.

Pycnidiosporae ellipsoideae, continuae, guttulatae, hyalinae, 3,5-5 x 1,5-2 u.

In foliis **Citri sp.**, Paraguari — Paraguay, 1880. Typus, 4076, ex Balansa coll. New York Botanical Garden, sub **Polystomella pulcherrima,** Speg.



Fig. 7

SCHIZOTHYROPSIS CITRI Bat & Vital n. gen, n. sp, type

Picnostroma sob secção longitudinal.

Orig.

ABSTRACT

In this paper the following fungi of the families Leptostromaceae and Sphaeropsidaceae are reexamined through the study of their cotypes, identified for the first time in Brazil or described as new species: **Apomella casuarinae** Syd. on **Casuarina suberosa, Coniothyrium callistum** Syd. on **Encalyptus hematostoma, Hendersonia phyllodiorum** Syd. on **Acacia gladiiformis, Leptostroma pinastri** Desm. on **Pinus sylvestris, Metadiplodia eucalypti** Syd. on **Euca-**



Fig 8

SCUTOPELTIS ALAFIAE Bat. & Maia.

Orig.

lyptus blakeli, Plenodomus mollerianus Bres. on **Apeiba surinamensis, Schyzothyropsis** n. gen. **citri** n. sp. Bat. & Vital on **Citrus.**

The fungus **Scutopeltis alafiae** Bat. & Maia is also illustrated.

RÉSUMÉ

Il s'agit de champignons de la famille Leptostromaceae et Sphaeropsidaceae, lesquels furent re-examinés au moyen de leurs cotypes et identifiés pour la première fois au Brésil, comme aussi de nouvelles espèces décrites telles que:

Apomella casuarinae Syd. sur **Casuarina suberosa, Coniothyrium callistum** Syd. sur **Encalyptus hematostoma, Hendersonia phyllodiorum** Syd. sur **Acacia gladiiformis, Leptostroma pinastri** Desm. sur **Pinus sylvestris, Metadiplodia eucalypti** Syd. sur **Eucalyptus blakeli, Plenodomus mollerianus** Bres. sur **Apeiba surinamensis, Schyzothyropsis** n. gen. **citri** n. sp. Bat. & Vital sur **Citrus.**

Le champignon **Scutopeltis alafiae** Bat. & Maia est aussi illustré.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 359-364, 1960

ESTUDO ANALÍTICO DE ALGUNS BASIDIOMICETOS (*)

A. CHAVES BATISTA
A. FERNANDES VITAL

Agrupamos neste trabalho os resultados de pesquisa alcançados pelos A. A. sôbre uns poucos Basidiomicetos.

Redescrevemos, assim, **Ctenoderma diploglottidis** (Cke. & Mass.) Syd. à luz da nossa investigação sôbre o especímen tipo de Sydow. **Graphiola phoenicis** (Moug.) Poit. é identificado sôbre **Sabal palmetto.** Uma nova espécie **Hymenochaete caxangaensis** Bat. & Vital, de hábito terrestre, é descrita e ilustrada.

CTENODERMA DIPLOGLOTTIDIS (Cke & Mass.) Syd.

in Ann. Myc. XX: 55, 1922
Ann. Myc. XXXV: 350, 1937

Soros epífilos, lenticulares, subepidérmicos, gregários, isolados ou confluentes, de 240 u — 3 mms. de extensão, 200 — 500 u de diam., e 155 — 250 u de altura; membranosos, de parede superior subparenquimática, hialina, compacta, de 55 — 60 u de espessura, formada por células poligonais e arredondadas, de 3,5 — 10 x 2,5 — 4,5 u. Fig. 1.

Teleutosporos elipsoide-lanceolados, curtamente caudados, de epispório rugoso, denso e marron-pálido, de espessura de 3 — 5,5 u, centro hialino, de polo superior obtuso-acuminado, 46 — 71 x 16,5 — 22 u; prendem-se a um pequeno esporóforo hialino, contínuo, de 12 — 16,5 x 5,5 — 8 u.

Sôbre fôlhas de **Diploglottis cunninghamii** Hook. Clichester River, New South Wales. Leg. L. Fraser, 11-1936. Tipo, 215, Dep. Bot., Univ. of Sydney, cedido pela Dra. L. Fraser.

(*) Publicação nº 140



FIG. 1

CTENODERMA DIPLOGLOTTIDIS (Cke. & Mass) Syd.

Teleutosoro e teleutosporos.

Orig.

GRAPHIOLA PHOENICIS (Moug.) Poit.

Soros à maneira de pústulas cilíndricas, negras, de estrutura homogênea, anfígenas, mas principalmente hipófilas, imerso-irrumpentes, 470 u — 1 mm de diam., 290 — 540 u de alt.

Exoperídio negro, opaco, muito fragmentável, 108 — 128 u de espessura, amplamente aberto, à maturidade, deixando ver uma massa pulverulenta-creme — os esporos do fungo; endoperídio membranoso, fugaz, hialino; **himênio** constituido por hifas esporígenas hialinas, muito septadas e um pouco constrictas, 1 — 1,5 u de espessura, dispostas em paliçada, suportando, na parte superior, esporos que lhes são presos através de curtos ístmos — os probasídios. Entre as hifas esporígenas elevam-se, isoladamente, pêlos estéreis, Fig. 2, que alcançam até 2 mm de altura, tendo 5 — 10 u de diam.; **esporos** globosos a elipsoides, Fig. 3. contínuos ou 1-septados, hialinos, de paredes espessas, 3 — 4,5 x 3 — 3,5 u.

Sôbre **Sabal palmetto** — A. C. Batista & A. F. Vital. Identificado sôbre os seguintes especimens, em associação com **Hysterostomina sabalicola** (Tracy & Earle) Bat. & Vital, Longboat Key, Fla U.S.A. coll. by S. M. Tracy, 1900, e R. Ciferri Mycoflora Domingensis Exsiccata, col. em El Jovaro, H. 15770.

FIG. 2

GRAPHIOLA PHOENICIS — (Moug.) Poit

— Secção longitudinal de um sôro, observando-se pêlos estéreis.

Orig.



FIG. 3

GRAPHIOLA PHOENICIS — (Moug.) Poit

Hifas férteis e esporos.

Orig.

HYMENOCHAETE CAXANGAENSIS Bat. & Vital n. sp.

Carpóforos de 4 — 6 cm. de diam. e 3,5 — 4,5 cm. de altura.

Pileo rijo, imbricado, reflexo, semiorbicular, velutino, formado por lâminas flabeliformes, papirinas, dispostas mais ou menos concêntricamente, em vários vertícilos, reunidas

a curtos pedicelos, os quais se fusionam uns aos outros, formando um estipe comum; essas lâminas são ferrugíneas, de zonamento concêntrico, mais pronunciado na face superior, fendilhadas, 450 — 517 u de espessura, e histològicamente constituidas por uma densa trama de hifas marron, de 2,5 — 4 u de diam. Fig. 4 e 5.

FIG. 4

HYMENOCHAETE CAXANGAENSIS Bat & Vital

a) Face inferior do carpóforo;
b) Face superior do carpóforo.

Orig.

Estipe ferrugíneo, de fórma irregular, até 2,5 cm de alt. e 2 cm. de diam., em parte subterrâneo.

Hymênio situado na face inferior das lâminas, da mesma côr marron que estas, porém mais claro, provido de setas, que são visíveis à lupa; as setas são marron-negras, ponteagudas, fragmentárias, numerosas, 110 — 130 x 5 — 7,5 u.

Basídios clavados, hialinos, 15 — 20 x 3 — 5 u, tetraspóricos, esterígmas curtos.

Basidiosporos sub-globosos a elipsoides, hialinos, com um pequeno apículo sub-terminal, 4,5 — 5,5 x 3,5 — 4,5 u, contínuos.

Sôbre o solo — Caxangá — Recife. Leg. A. Chaves Batista, 11-1-958. Tipo, 12127, IMUR.

Pileo 4-6 cm diam., 3,5-4,5 cm alt., reflexo, semiorbiculari, imbricato, papyrino, duro, marginibus irregularibus; superfícies superior concentrice zonata, brunnea, velutina.

Stipite irregulari, ferrugíneo, usque 2,5 cm. alt. et 2 cm. diam. parte imersus ad terram.

Hymenio laeve, brunnescente, efformato.

Setae hymeniales atro-brunneae, acutae, numerosae, 110-130 x 5-7 u.



FIG. 5

HYMENOCHAETE CAXANGAENSIS Bat. & Vital n. sp.

a) Basidiosporos;
b) Seta;
c) Basídio;

Orig.

Basidia clavata, 4-sporica, curto sterigmata, 15-20 x 3-5 u.

Basidiosporae subglobosae vel ellipsoideae, curto apiculatae, continuae, hyalinae, 4,5-5,5 x 3,5-4,5 u.

Caxangá — Recife. Leg. A. Chaves Batista, 11-1-958. Ad terram Typus, 13127, IMUR.

ABSTRACT

Three interesting Basidiomycetes are studied in this paper:
CTENODERMA DIPLOGLOTTIDIS (Cke. & Mass.) Syd. the type is analysed, on **Diploglottis conninghami,**
GRAPHIOLA PHOENICIS (Moug.) Poit. on **Sabal palmetto** and **Hymenochaete caxangaensis** Bat. & Vital n. sp., on soil.

RÉSUMÉ

Dans ce travail se trouvent les résultats de la recherche des auters sur quelques intéressants Basidiomycètes. Ils décrivent **Ctenoderma diploglottidis** (Cke. & Mass.) Syd., basés sur l'investigation de l'especimen type de Sydow, sur **Diploglottis cunninghami, Graphiola phoenicis** (Moug.) Poit. sur **Sabal palmetto** et **Hymenochaete caxangaensis** Bat. & Vital n. sp. sur le sol.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 365-369, 1960

DUAS NOVAS COMBINAÇÕES, NOS GÊNEROS **COCCOIDELLA** Höhnel e **CYCLOPELTIS** Petrak. (*)

A. CHAVES BATISTA
M. L. NASCIMENTO

O presente trabalho trata de novas combinações binomiais, pelo reconhecimento que ora fazemos de novas entidades fúngicas, pertencentes à família **Polystomellaceae.**

Coccoidella dodoneae (Stev.) Bat.

Cyclopeltis jasmini (Doidge) Bat. & Nasc.

São fungos cujas transposições taxonômicas ora efetuamos.

COCCOIDELLA DODONEAE (Stev.) Bat. comb. nov.

Sin.: **Dimerina dodoneae** Stev.
in Illinois Biolog. Monographs **XI**: 171, 1927.

Micélio livre ausente.

Estromas hipófilos, carbonáceos, pulvinados, isolados, ou confluentes, circulares a subcirculares, 1 — 3 mm de diam., dotideoides, compactos, negros, glabros, levemente rugosos, implantando-se na epiderme do hospedeiro por um pé central, que logo se atenua num hipostroma epidermal, marron-negro, constituido por células poligonais, subglobosas ou oblongas, marron claras a marron-negras, de 7.5 — 12.5 x 5 — 7.5 u; o hipostroma expande-se lateralmente, atingindo as proporções de 108 — 270 x 21.5 — 32.5 u. A porção fértil dêsses estromas é de 182 — 364 u de diam. e 97 — 121.5 u de altura; subparenquimático, formados por

(*) Publicação nº 141

células poligonais e subglobosas de 6.5 — 14 x 6.5 — 9 u; a parede superior é marron negra, de 12 — 24 u de espessura; a parede inferior é de 13.5 — 19 u de diam., formada também por células poligonais e subglobosas, marron 4 — 10 x 2.5 — 6.5 u. Os lóculos são de 2 — 7, globosos a subglobosos, 40 — 86.5 u de diam e contém de 3 — 10 ascos cada um. Fig. 1.



Fig. 1

COCCOIDELLA DODONEAE (Stev.) Bat.

a) Secção longitudinal de ascostroma;
b) Asco e ascosporos.

Orig.

Ascos elipsoides ou clavados, sésseis, 6 a 8 esporos, bitunicados, de 38 — 50 x 12.5 — 19 u, aparafisados.

Ascosporos cilindráceos, lisos, 1 septados, não constrictos, dísticos a conglobados, hialinos, de 15 — 19 x 4 — 5 u.

Sôbre fôlhas de **Dodonea viscosa** L. pr. Banos, prov. Tungurahua, Equador. Leg. H. Sydow, 28-12-937. Tipo, nº 12587, IMR., e 1152 da Sydow, Fungi exotici exsiccati.

Est **Coccoidella** per stromata dothideoidea, cum pede centrali innato, ascos aparaphysatos et ascosporos hyalodidymos.

CYCLOPELTIS JASMINI (Doidge) Bat. Nasc. & Vital

Sin.: **Ferrarisia jasmini** Doidge
in Bothalia IV: part II, p. 278, 1942

Colônias marron-negras, superficiais, anfígenas, circulares, com 3 — 6 mm de diam., resultantes de aglomerados de ascostromas. Micélio livre ausente. Ascostromas orbiculares ou semi-orbiculares, 120 — 200 u de diam., 41 — 56 u de alt., marron-negros, superficiais, isolados ou confluentes, ástomos, de dehiscência irregular ou estelar, membranáceo-carbonáceos, de parede superior opaca, formada de células retangulares radialmente dispostas, com 4.5 — 11 x 2.5 — 5.5 u; margens mais claras, deixando ver células irregulares, em franjas, com 11 — 14.5 de comprimento. Membrana basal sub-carnosa, delicada, 2 — 5 u de espessura. Hipostroma sub-cuticular a epidermal, Fig. 3, pseudo-parenquimático, marron, com células cuboides, paralelas, de 4.5 — 7 u de diam., penetrando até ao mesófilo e conectado com a membrana basal do ascostroma em vários pontos de sua área central. Ascos elipsoides a ovoides, raros, sésseis, 2-tunicados, 35 — 50 x 24.5 — 33 u, desenvolvidos num endotécio mucilagíneo-celulósico, levemente oliváceo. Ascosporos oblongo-cilindráceos, conglobados, hialinos, depois marron, 1-septados, transversalmente, constrictos, 19 — 25 x 9.5 — 12 u, lisos, sendo as células um tanto desiguais. Fig. 2.

Sôbre fôlhas de **Jasminum angulare** Vaill. Kentani, Cape. Leg. A. Pegler, 27-4-912. Typo 2288, Mycol. Herb. Dep. of. Agric. Union of South Africa.

Est Cyclopeltis per ascostromata pluries affixa in hypostromate subcuticulari vel subepidermali, cum ascosporis brunneis, 1-septatis.

Nota: Agradecemos ao Dr. Talbot pela cessão do especímen tipo de Doidge, sob o nº 2288, e determinado como **Ferrarisia jasmini** n. sp. Através da análise comparativa e histológica do especímen verificamos a presença de hipostroma e, assim, o fungo em tela é um **Polystomellaceae** e concorda com as características de **Cyclopeltis** Petrak. (Veja-se Sydowia, vol. VII: 370, 1953).



Fig. 2

CYCLOPELTIS JASMINI (Doidge) Bat. Nasc., & Vital

a) Vista frontal do ascostroma;
b) Asco;
c) Ascosporos.

Orig.

Fig. 3

CYCLOPELTIS JASMINI (Doidge) Bat. Nasc. & Vital.

Córte transverso do ascostroma, notando-se a presença de hipostroma.

Orig.

ABSTRACT

Two new combinations are made on the family **POLYSTOMELLACEAE:**

COCCOIDELLA DODONEAE (Stev.) Bat. on **Dodonea viscosa** and **CYCLOPELTIS JASMINI** (Doidge) Bat. & Nasc. on **Jasminun angulare.**

RÉSUMÉ

Deux nouvelles combinaisons sont faites dans la famille Polystomellaceae: **Coccoidella dodoneae** (Stev.) Bat. sur **Dodonea viscosa** et **Cyclopeltis jasmini** (Doidge) Bat. & Nasc. sur **Jasminum angulare.**

Atas do IMUR
Ano I, págs. 371-376, 1960

A RE-EXAMINATION OF THE TYPE SPECIES OF **PTYCHOPELTIS** Syd., ITS IDENTIFICATION AS A NEW VARIETY OF **ASTERINA GLABRATA** Bat. & Maia, AND THEIR ASSOCIATED FUNGI. (*)

A. CHAVES BATISTA
MARIE L. FARR

Sydow, in his description of **Ptychopeltis** (1927) states that this fungus "undoubtedly represents a new genus", but does not explain precisely which of its characteristics prompted him to elevate it to this rank. The lack of hyphopodia and presence of branched paraphyses are probably the outstanding characters of the generic description. In his description of **P. roupalae**, the type and only species, Sydow acknowledges the presence of "short hyphal side branches" forming scattered "hyphopodia-like processes", but does not recognize these as true hyphopodia. On the other hand, he considers the affinities of this fungus to be lembosiaceous, because some of its fruiting bodies are oval rather than round and have longitudinal folds. (**Lembosia** has linear ascostromata, paraphysate asci, and hyphopodiate mycelium). Stevens and Ryan (1939) agree with this concept in placing **Ptychopeltis** in their key near **Lembosia**, under the heading "ascomata linear". In the present study these longitudinal ridges do not appear to be constant or distinctive features, and most of the ascostromata are nearly orbicular.

The authors' recent examination of the type specimen of **Ptychopeltis roupalae**, as well as Sydow's original illustration reveals that Sydow's "hyphopodia-like processes" do not in any appreciable manner differ from true hyphopodia (see fig.); thus, this fungus belongs in the present family Asterinaceae.

Since it possesses the structural characteristics, as well

(*) Publicação nº 142

as the general appearance of an **Asterinema**, there appears to be no necessity for retaining the monotypic genus **Ptychopeltis**.

This fungus answers in general to the description of **A. glabrata** Bat. & Maia, but shows certain definite, though minor, differences; these are its smaller, non-capitate hyphopodia, the 8-spored and slightly wider asci, the branched paraphyses, and the slightly longer ascospores. It is therefore classified as a new variety of that species.

ASTERINEMA GLABRATA Bat. & Maia var. **ROUPALAE** Bat. & Farr. n. var.

Spots dark brown, but lighter-colored than the ascostromata, epiphyllous and causing hypophyllous discoloration, roundish, rather sharply demarcated, 2 — 3 mm diam.

Mycelium dense, irregularly branching and anastomosing, brown, hyphopodiate without setae; hyphae very flexuous, with strongly wavy margins, septate, 3 — 5 u diam. with cells 5 — 18 u long. Hyphopodia 2 — 3 by 3 — 5 u, cylindrical to vasiform, sometimes bent, lateral, irregularly distributed. Fig. 1.

Ascostromata loosely to closely gregarious within plagulae, extremely flattened, round to oval, radiate, opening by an indistinct pore or irregularly radiate fissures, carbonaceous, 340 — 500 u diam., 9 — 38 u high; margin smooth, with a slight fringe of short brown hyphae; wall 11 — 16 u thick, of irregularly rounded and polygonal cells 5 — 13 u diam., in the center, becoming rectangular and radially arranged toward the outside; the inferior wall is almost indistinct.

Asci ovate to clavate or cylindrical, 2-tunicate, 8-spored, 55 — 88 by 17 — 23 u, profusely paraphysate. Paraphyses filiform, hyaline, 1 u diam., much branched and intertwined, their tips interlaced above the asci and apically to the wall of the ascostromata.

Ascospores hyalodidymous, ellipsoid to fusiform, guttulate, 17 — 20 by 7 — 8 u. Fig. 2.

On living leaves of **Roupala veraguensis**, associated with **Annellophora africana** Hughes, **Parasterina consimilis** (v. Höhn) Theiss, and a not completely developed Sphaeropsidaceae. Costa Rica, Mondongo bei San Ramon. 3-11-1925. H. Sydow.

Asterinema glabrata Bat. & Maia var. **roupalae** Bat. & Farr. Ascostromata 340-500 u diam. Hyphopodia 2-3 x 3-5u, cylindrica,

non-capitata; asci octospori, 17-23 u crassi, dense paraphysati; paraphyses filiformes, copiose ramosae, 1-1.5 u. crassae; sporae 17-20 u longae.

A typo differt per hyphopodios minores et ascostromata majora.

BIBLIOGRAPHY:

STEVENS, F. L. and M. H. RYAN. 1939. The Microthyriaceae 111. Biol. Monog. 17 (2) 38 pp.
SYDOW, H. 1927. Ann. Myc. 25: 73.



Fig. 1

ASTERINEMA GLABRATA Bat. & Maia var. **ROUPALAE** Bat. & Farr.

Hyphopodiate mycelium.

Orig.



Fig. 2

ASTERINEMA GLABRATA Bat. & Maia var. **ROUPALAE** Bat. & Farr.

a) Hyphopodiate mycelium;
b) Longitudinal section of the ascostromata;
c) A sector of the superior wall of the ascostromata;
d) Paraphysate ascus and ascospores.

Orig.

ANNELLOPHORA AFRICANA Hughes

in Trans. Brit. Mycol. Soc. 34: 546, 1951

M. B. Ellis — **Clasterosporium** and some allied Dematiaceae. Comm. Myc. Inst. Mycol. Paper, nº 70: 84, 1958.

Colonies blackish, thin, effused superficial, epiphyllous.

Mycelium superficial, pale brown, formed by a netwark of repent flexuous, irregularly branching septate and telemorphic hyphae, 2 — 4 u diam., not hyphopodiate, nor setose.

Conidiophores borne singly and laterally on the mycelium, erect, straight or flexuous, dark brown, pale at the tip, 6 — 7 u wide, 110 — 200 u long, septate, with several, cylindrical proliferations, Fig. 3.

Conidia light brown to brown, 50 — 55 u by 10 — 12 u at the widest, obclavate to fusoid, the end cells smaller and paler.

On leaves of **Roupala veraguensis** associated with **Parasterina consimilis** (v. Höhn) Theiss. and **Asterinema glabrata** Bat. & Maia var. **roupalae** Bat. & Farr.

RESUMO

O reexame pelos AA. da espécie tipo do gênero **PTYCHOPELTIS** Syd. — **P. roupalae** evidenciou que o gênero em discussão não tem cabimento, pois as suas características, correspondem às de fungos Asterinaceae, sendo hifopodiado o seu micélio.

Assim, e por sua quase perfeita correspondência com **ASTERINEMA GLABRATA** Bat. & Maia, recombinamos **P. roupalae** como **ASTERINEMA GLABRATA** var. **ROUPALAE** Batista & Farr, fundando-se esta nova variedade nas discrepâncias constatadas quanto ao tamanho dos hifopódios e dos ascostromas.

São também assinalados sôbre o mesmo hospedeiro, **Roupala veraguensis,** os fungos associados **Annellophora africana** Hughes e **Parasterina consimilis** (v. Höhn.) Theiss.

RÉSUMÉ

Entrepris par les auteurs, l'examen de l'espèce type du genre **PTYCHOPELTIS** Syd. — **P. roupalae,** a mis en évidence que ce genre n'a pas de raisons d'être, puisque ses caractèristiques correspondent à celles des champignons Astérinaceae et avec mycélium hyphopodié.

Pour cette raison et sa presque parfaite correspondance avec **ASTERINEMA GLABRATA** Batista & Maia, les auteurs font de **Ptychopeltis roupalae** cette nouvelle combinaison: **ASTERINEMA GLABRATA** var. **ROUPALAE** Batista & Farr; cette variété est basée dans les différences de grandeur des hyphopodes et ascostromes.

Aussi, Il est signalé dans le même hôte: **Roupala veraguensis,** les champignons associés **Annellophora africana** Hughes et **Parasterina consimilis** (v. Höhn.) Theiss.

Fig. 3

ANNELLOPHORA AFRICANA Hughes

a) Superficial mycelium;
b) Conidiophores;
c) Conidia.

Orig.

Atas do IMUR
Ano I, págs. 377-380, 1960

ESTUDIO DE CANDIDA HUMICOLA (DASZEWSKA) DIDDENS ET LODDER Y EL RECONOCIMIENTO DE CANDIDA CURVATA (DIDDENS ET LODDER) LODDER ET VAN RIJ COMO SU SINONIMO. (*)

R. C. ARTAGAVEYTIA-ALLENDE (**)
R. PESSOA COELHO

El concepto de especie en lo relativo a las levaduras está sufriendo en estos momentos grandes modificaciones. En general, hasta el presente, en la clasificación de las levaduras, se tomaban muy en cuenta ciertos detalles de forma y tamaño lo mismo que del aspecto de la filamentización. Los trabajos de Wickerham (1) resaltan que el tomar en cuenta un mayor número de propiedades fisiológicas aumenta considerablemente las posibilidades de la correcta diferenciación entre las especies sobre todo considerando que diversos factores pueden influir en las particularidades morfológicas de un germen.

Por lo tanto, el concepto morfológico ha perdido bastante de su valor en especial cuando se han estudiado gran cantidad de cepas de una misma especie.

La alteración de las formas y posición de las células ha sido muy bien estudiada en los trabajos de Wickerham y Rettger (2). Es conocida la influencia de factores químicos y físicos sobre la morfologia, como ser los cambios en el pH, tensión de oxígeno, rayos ultravioletas y rayos X. Se han observado cambios tan profundos como la obtención de formas depigmentadas en el género Rhodotorula.

Aún las propriedades biológicas deben ser observadas

(*) Publicação nº 143

(**) Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad del Uruguay. Atuando como pesquisador do I.M.U.R., como convidado especial do Magnífico Reitor Prof. Joaquim Amazonas.

idénticas en varias cepas consideradas iguales para poder adjudicarles valor taxonómico.

Los trabajos de Wickerham (1) en especies del género **Hansenula** demuestran que por medio de la mezcla de cepas de una misma especie se pueden alterar propriedades que se consideraban importantes para la identificación de la especie.

Todo esto fuerza al investigador en el campo de las levaduras a ampliar cada vez mas los límites del concepto que se tiene de una especie, en especial cuando se han estudiado gran número de cepas de una misma especie.

Cepas estudiadas

IMUR: 918 **Cândida curvata** (Diddens et Lodder) Lodder et van Rij. Aislada de secreción uretral en Recife.

IMUR: 1123 **Cândida curvata** (Diddens et Lodder) Lodder et van Rij. Recibida de LBFHC: 1119 (originaria de NRRL Y-1511).

IMUR: 1126 **Cândida humicola** (Daszewska) Diddens et Lodder. Recibida de LBFHC: 1125 (originaria de Mrak Y-26).

Técnicas empleadas

Son las clásicas, empleadas en la clasificación de levaduras y preconizadas por los autores europeos. Por conocidas, quedamos eximidos de detallarlas.

Resultado del estudio de las cepas.

Temperatura de desarrollo. Tanto las cepas de **Candida curvata** como de **Candida humicola** son de lento desarrollo, aún a la temperatura de 22°C., acentuándose esta dificultad a la temperatura de 37°C.

Aspecto macroscópico. En agar malta, en cultivo en estría, en cuarto dias y a la temperatura de 22°C., las tres cepas tienen un aspecto semejante en cuanto al color y a la tendencia de dar colonias opacas o con muy poco brillo.

La cepas IMUR: 918 es muy plegada no así la IMUR: 1123, que lo es ligeramente y en cambio la IMUR: 1126 es lisa.

En agua de malta a los nueve dias y la temperatura de 22°C. las cepas IMUR: 918 e IMUR: 1126 muestran un gran

velo; en cambio la IMUR: 1123 da un velo de un desarrollo intermediario.

Aspecto microscópico: Las cepas de **Candida curvata** presentan pseudomicelio bien desarrollado. Blastoesporos ovales de 2.8 x 5.6 micras, cilindráceos, curvos a veces irregulares, midiendo 3 — 15 x 7 micras. A veces los artículos del pseudomicelio son aparentemente quebrados o con cantos redondeados.

La cepa de **Candida humicola** posee pseudomicelio bien desarrollado, blasteosporos ovales o cilindraceos, rectos, algunos de formas irregulares, de (1.4-2.8) x (2.8-7.2) micras.

Micelio verdadero ha sido observado en las cepas de **Candida curvata** en muy poca cantidad, siendo mayor el observado en **Candida humicola.** Propiedades biológicas: Las tres cepas no asimilan el nitrato de potasio por las técnicas auxanográficas.

El comportamiento frente a los azucares clásicos empleados en la identificación por el método auxanográfico: Las tres cepas son positivas para la glucosa, lactosa, sacarosa, maltosa y galactosa. La lactosa muestra una acción positiva, pero mas debil en las cepas IMUR: 916 e IMUR: 1126 de **Candida curvata** y **Candida humicola,** respectivamente.

Acción fermentativa frente a la glucosa, lactosa, sacarosa, maltosa y galactosa: las tres cepas no provocan formación de gas.

Discusión

Las especies **Candida curvata** y **Candida humicola** tienen propiedades biológicas semejantes, aun mismo segun Lodder y van Rij; pero resaltan que existe diferencia en el tipo y aspecto de las células. En nuestras observaciones hemos encontrado una diferencia mínima entre las células de ambas especies. Por otro lado, la película o velo es similar.

Tambien es necesario hacer resaltar que en la cepa **Candida curvata** IMUR: 918 hemos encontrado verdadero micelio, como se dejó establecido mas arriba.

Nos ha llamado la atención el aspecto muy plegado de la cepa IMUR: 918, semi plegado en la IMUR: 1123, en contraposición con el aspecto liso de la cepa IMUR: 1126.

Esto último nos permite pensar que **Candida curvata** sea la forma membranosa de **Candida humicola.**

Conclusiones

Consideramos a la especie **Candida curvata** (Diddens et

Lodder) Lodder et van Rij. sinónimo de **Candida humicola** (Daszewska) Diddens et Lodder, por tener similares propiedades biológicas y morfológicas.

REFERÊNCIAS:

WICKERHAM L. Taxonomy of Yeasts U. S. Depart. of Agric. Tech. Bull. N.º 1029 May 1951.

WICKERHAM L. and Rettger L. F. A taxonomic study of **Monilia albicans** with emphasis on morphology and morphological variation Jour. Trop. Med. and Hyg. 42:174-177, 1891192, 204-216, 1939.

RESUMO

Os A. A., estudando cepas de **Candida humicola** (Daszewska) Diddens & Lodder e de **Candida curvata** (Diddens & Lodder) Lodder & Van Rij — concluiram pela inexistência de características diferenciais entre essas duas espécies, quer do ponto de vista da morfologia, quer, ainda, quanto ao seu comportamento em relação aos auxanogramas e zimogramas.

Dessa maneira propõem tornar-se **Candida curvata** sinônimo de **Candida humicola** (Daszewska) Diddens & Lodder, pela prioridade desta.

MICOGINECOPATIA POR *BYRRHA PORTIO-VAGINALIS* N. GEN. N. SP.[1]

A. CHAVES BATISTA
FRANÇOISE MONNIER[2]
JARBAS SISENANDO SILVEIRA

No estudo da flora micótica vaginal que está sendo levado a efeito no Instituto de Micologia da Universidade do Recife, tivemos a atenção despertada para um caso de micoginecopatia relacionado com a incidência de uma levedura pigmentada de vermelho e de comportamento aparentemente distinto do das leveduras conhecidas até hoje.

Este trabalho objectiva então o relato desse achado, a diagnose do fungo assinalado e os resultados que obtivemos através da experimentação.

A doente, V. P. C., branca, pernambucana, casada, 40 anos de idade, apresentava queixas de leucorreia e ardor vaginal. Anteriormente essa mesma paciente fora submetida pelo 3.º autor a uma operação de Fothergill, para cura de genitoptose do 2.º grau e de colecistectomia, por colecistite calculosa.

Ao exame ginecológico, especular, visualizou-se o colo uterino hiperemiado e banhado por abundante secreção branco-amarela. As paredes vaginais também se mostravam hiperemiadas e revestidas por essa mesma secreção branco-amarela.

Foi procedida a determinação do *pH*, encontrando-se o valor 6, e feito esfregaço, para coloração pelo método de Gram, para a verificação da flora vaginal existente, obtendo-se então a constatação

---

[1] Publ. imur, n.º 144.

[2] Hospital S^{t}. Antoine, Paris — France.

Proc. 6th Int. Congr. Trop. Med. and Malar., 4: 728-733, 1959

de ausência total de *Lactobacillus* de Doderlein e presença de células epiteliais e de células brotantes, leveduriformes. Exame a fresco negativo para *Tricomonas vaginalis*.

Novas tomadas de material foram transferidas, como semeaduras, sobre os meios de Sabouraud simples e com acromicina, das quais floresceram em colónias pigmentadas as provenientes de inóculo recolhido do colo do útero.

Confirmada a identificação da presença de leveduras no colo uterino, com os resultados do cultivo artificial, foi a paciente submetida a tratamento, enquanto ainda continuavam as pesquisas para a diagnose do fungo isolado e reconhecimento de sua capacidade funcional, como eventual patógeno.

Foi empregada a gencitropina ginecológica (produto à base de genciana violeta) em aplicações tópicas, sob intervalos de 3-5 dias. A paciente referiu-se curada após 60 dias, tendo sido nessa ocasião negativos os testes efectuados para o reisolamento do fungo.

As investigações realizadas para o enquadramento desse fungo na sistemática revelaram completa discrepância das suas características em confronto com os diferentes géneros bem estabelecidos, entre os fungos leveduriformes.

Assim, propomos um novo género, para conter essa espécie, cujas características apresentamos a seguir:

Byrrha Bat. Monnier & J. Silveira n. gén.
(De Byrrh — chama corada, vermelha)
Tipo: *B. portio-vaginalis nobis*

Colónias amarelo-vermelhas.

Micélio ausente.

Células vegetativas de brotação múltipla, globosas, ovóides ou alongadas.

Ascos precedidos ou não por conjugação heterogâmica, globosos, 4-8 esporos.

Ascóporos elipsóides, contínuos, hialinos; zimograma e auxanograma negativos para dextrose-maltose, sacarose, galactose, lactose e rafinose.

Coloniae flavo-rubrae.

Mycelium reale absens.

Cellulae vegetativae multipliciter gemmantes, globosae, ovoideae vel protrahentes.

Asci praecessi vel non conjugatione heterogamica, globosi, 4-8 sporos habentes.

Ascosporae sub-globosae vel ellipsoideae, continuae, hyalinae.

Fig. 1 — *Byrra portio-vaginalis* Bat. Monnier & Silveira n. sp. Asco

Zymogramma et auxanogramma negativa ad dextrosim, maltosim, saccharosim, galactosim, lactosim atque räfinosim.

Byrrha portio-vaginalis Bat. Monnier & J. Silveira n. sp.

Sobre o meio de Lodder-agar, produzem-se:

Colónias circulares, de margens lobadas, plano-convexas, cremosas, amarelo-vermelhas, 1,5-2 cm de diâmetro aos 10-12 dias e à temperatura ambiente de 24-26°C, brilhantes, inodoras; reverso plano, liso, opaco, também amarelo-avermelhado.

Crescimento sobre extracto de malte: após 3 dias, ocorre produção de sedimento, a qual se torna abundante com o envelhecimento dos cultivos; células vegetativas globosas ou ovóides, de brotação simples e múltipla, 2-5 × 2-4 u.

Cultivo sobre batata-dextrose-agar, em estrias, sobre lâminas — Pseudo-micélio, micélio verdadeiro e clamidosporos ausentes. Blastóporos globosos e ovóides, abundantes, 3-6 × 3-4 u.

Crescimento sobre o meio de Sabouraud com acromicina — Formação sòmente de blastóporos.

Crescimento sobre o meio de Czapek-agar — Colónias amarelo-avermelhadas, brilhantes, de margens lisas; blastóporos globosos e ovóides, 3-5 × 3-4 u.

Crescimento sobre o meio de Hansen — Colónias amarelo-avermelhadas, brilhantes, de margens lisas e superfície levemente estriada; blastóporos globosos, de 1,5 u de diâmetro.

Crescimento sobre sangue-agar — Colónias circulares, de margens lisas; superfície ligeiramente irregular; umbilicadas; amarelo-pálidas, blastóporos ovóides, 0,8 × 0,6 u.

Crescimento sobre o meio de Fries-agar — Colónias circulares, bilhantes, avermelhadas; blastóporos globosos, 1,5 u de diâmetro.

Crescimento sobre agar-nutritivo — Colónias levemente irregulares, amarelo-avermelhadas, lisas, brilhantes; blastóporos ovóides, 0,7 × 0,4 u.

Crescimento sobre malte-agar — Colónias amarelo-avermelhadas, circulares, de área central encrespada e margens lisas; blastóporos globosos e ovóides, 3-4 × 3,5 u.

Crescimento sobre o meio de arroz-Tween-80-agar — Colónias amarelo-avermelhadas, circulares, brilhantes, de área central escurecida e margens lisas; blastóporos globosos, 0,4 u de diâmetro.

Crescimento sobre o meio de violeta-bile-agar — Colónias amarelo-avermelhadas, de margens multilobadas; centro umbilicado e de tonalidade azulada; blastóporos globosos.

Crescimento sobre o meio de Steep-corn-agar — Colónias amarelo-vermelhas, brilhantes, centro rugoso, margens lisas, elevadas, multilobadas; bastóporos globosos, 1-1,5 u de diâmetro.

Crescimento sobre extracto de malte adicionado de M_nSO_4 a 0,8 °/₀₀ — Abundantes blastóporos globosos e ovóides, de 4-6,3 × 3-4 u.

Crescimento sobre meio adicionado de fluoresceína e sulfato básico de quinina — Colónias nacaradas, aos 8 dias, com acção negativa dessas substâncias para o impedimento da formação de blastóporos, tanto à luz quanto sob escuridão.

Crescimento sobre o meio de Gorodkova e blocos de gesso — Aos 17 dias sòmente blastóporos alongados, produzindo-se ascos aos 40 dias. Ascos globosos, de membrana espessa, 4-7 u de diâmetro, 4-8 espo-

ros. Ascóporos subglobosos a elipsóides, contínuos, hialinos, 1-1,5 u de diâmetro.

Zimograma e auxanograma — Negativos para os seguintes açúcares: dextrose, maltose, sacarose, galactose, lactose e rafinose. Não assimila, igualmente: inulina, esculina, inositol, amidalina, dulcitol, sorbitol (d), manose (d) e trealose.

Outras características bioquímicas — Não assimila nitrato de potássio nem coagula o leite de *litmus*.

O pigmento amarelo-avermelhado das colônias é, aparentemente, de natureza não carotenóide, sendo insolúvel em água quente ou fria, álcool, clorofórmio, éter sulfúrico e bissulfureto de carbono.

Os blastóporos revelam a presença de quitina na membrana celular.

Inoculação experimental — Por via parenteral, em cobaios e ratos Winster, ao cabo de 60 dias, nenhuma anormalidade foi observada no estudo histopatológico dos seguintes órgãos: fígado, baço, rins e pulmões.

Sob escarificação de paredes vaginais foram inoculadas 4 cobaias impúberes (ainda não acasaladas), que apresentavam mucosas vaginais normais, conservando-se mais 2 cobaias-testemunha, que sofreram escarificação vaginal, porém não receberam inóculo. Após 60 dias os animais foram sacrificados, verificando-se hiperemia e descamação da mucosa vaginal para os que tinham sido inoculados e ausência de anormalidades nas testemunhas. Dos animais prèviamente inoculados foi também reisolado o *B. portio-vaginalis* n. sp., numa demonstração, assim, da associação desse microrganismo com a enfermidade vaginal que ora analisamos. Não lográmos, porém, resultados positivos, do ponto de vista histopatológico.

Mycelium reale non adest.

Coloniae orbiculatae, cum marginibus lobatis, plano-convexae, cremosae, flavo-rubrae, 1,5-2 cm diam., 10-12 diebus, temperatura autem circumfusa, 24°-26°, in medio Lodder-aggar producuntur.

In extracto-malte increscit, sedimentum post 3 dies producens, quod tempore abundat.

In Sabouraud cum acromicina blastosporae tantum formantur.

In Czapek-agar coloniae apparent flavo-rubrae, nitidae, cum marginibus levis; blastosporae autem globosae et ovoideae, 3-5 × 3-4 u.

In agar-nutritivo coloniae leviter irregulares, flavo-rubrae, leves, nitide videntur; blastosporae autem ovoideae, 0,7 × 0,4 u.

In medio Gorodkovae et in gypsi molibus, in 17 dies tantum blastosporae elongatae apparent.

Asci globosi, 4-7 u diam., 4-8 sporos habentes.

Ascosporae subglobosae vel ellipsoideae, continuae, hyalinae, 1-1,5 u diam.

ABSTRACT

The authors have studied a mycogynecopathy characterized by the white secretion and burning of the vagina. To a visual examination the inner collo and the vaginal walls of the patient showed hyperremy, with abundant white to yellowish secretion; besides this occurrence the inner drainage was found to be in bad condition.

As agent, the fungus *Byrrha portio-vaginalis* n. gen. n. sp. has been isolated.

This fungus belongs to the yellow-red pigmented / Sacharomycetaceae, destituted of mycelium, uncapable of fermentologic action and sugar assimilation, and producing asci and ascospores on Gorodkowa medium.

Under artificial inoculation by scratching of the vagina of guinea-pigs, not pubere, the experimental reproduction of interwoven mycogynecopathy confirmed, by retroculture, after 60 days, the presence of this same fungus previously inoculated. However, the hystopathological study has not revealed the action of this fungus as pathogen.

MYCOTIC CHOLECYSTITIS — Batista, A. C.; Oliveira, S. D. de and Silveira, G. L.

The incidence of the cholecystitis, involving distinct mechanism and different etiologic factors, frequently in simultaneous action, is of the utmost significance in Pernambuco, Brazil, and possibly important in other geographic areas as well.

In earlier work, (Com. cient. n.° 3 of the Institute of Mycology, University of Recife, 1957) the A.A. noticed the presence of the fungi *Candida* and *Torulopsis* in the *bile* of the carriers of cholecystitis, indicating the possible relations of these fungi, with the clinical and surgical picture of the cholecystopaties.

Such relations are now regarded as being true, justifying the pathogenicity of the *Candida* and *Torulopsis* as well as of other fungi, causing the chronical, acute and even the cholelithiasis.

We are defending also the concept of a mycotic infection of the gall--bladder or of the biliary tract as primary cause of cholecystitis, resulting of a combination of clinical observations, surgical support, and the use of the gall-bladder, on open sky, or by a duodenal catheterism, which we effected.

Although Mirmam (1933) and Weedon et al. (1937), (cited by Negroni, Dermotomycosis, 1942 and Mycopathologie VI, fasc. 4:331, 1949) have detected *Candida* in four human bile samples, and later Luchetti & Molfetta (Mycopathologia 11:164 1940) isolated from bile *Fusarium, Aspergilli, Botrytis,* and *Cladosporium,* the responsability of the fungi, in causing the cholecystitis, as evident in the recent monograph by Russel Twiss and Oppenheimer (Practical Management of Disorders of the Liver, Pancreas, and the Biliary Tract, 1955) has remained ignored until now. The identity of certain cholecystitis, regarding the clinical point of view with mycotic infections, has been comproved by us with artificial cultures of *Candida* and *Torulopsis* of the bile, with identical material found in the gall-bladder walls.

The pathogenigity of these fungi has been demonstrated for Winster rats. The problem of the cholecystitis is considered by us possibly as being completely correlated with the action of the fungus metabolism, because, experimentally, in vitro, from the synergic effects of the bile, previously tyndalisated, we obtained the artificial formation of pseudo-stones after 60 days. The concept regarding the mycotic infection has been reeinforced by the success which we reached by therapeutic treatment of cholecystitis already determinated to be of mycotic natures by the oral use of fungistatic substances, such as *Mycostatin, Pancicline* and *Cabimex.*

We have studied 121 patients, attacked by cholecystitis, of which only 98 supplied us material for research, studying a total of 151 samples of bile. Out of this total, 99 gave permission for the isolation and cultivation of the fungi, whereas the rest woul not give their permission, for technical reasons (difficulty to get the bile samples).

The efficient coefficient of 65.5 % of positivity can be taken as an expressive figure of the importance of the mycotic cholecystitis.

in the U. S. A.

ONICOPATIAS E *AUREOBASIDIUM PULLULANS* (de Bary) ARN. — Vieira, J. R.

A ocorrência das onicopatias, de âmbito geográfico ilimitado, é sempre um problema de interesse médico, do ponto de vista da etiopatogenia.

Desde 1910 Sabouraud chamou a atenção para a pesquisa de várias entidades fúngicas e a contribuição de numerosos investigadores, desde então, há confirmado que tais enfermidades podem ser motivadas por várias espécies de fungos.

No presente trabalho assinalamos novos achados de *Pullularia pullulans* (Bary) Berkh. ocasionando onicopatias, com hipercromia lateral e onicodinia. Tais achados ampliam o conhecimento da incidência desse fungo nas onicipatias fazendo-nos considerá-lo igualmente, como de acentuada importância, entre os demais factores etiológicos.

O estudo cultural desse microorganismo e suas caractersíticas micológicas são analisados também, neste estudo.

GINECOLOGIA

Registro Intelectual N.º 16.599

ANO XIV JANEIRO — FEVEREIRO DE 1959 N.º 1

ARTIGOS ORIGINAIS

VULVO -- VAGINITE MICÓTICA EM CRIANÇA

Relato de um caso

Jarbas Sizenando SILVEIRA *

O que nos leva a comunicar a presente observação é o fato da relativa ausência de publicações semelhantes, apesar de ser a vulvo-vaginite micótica em crianças, mais ou menos frequente.

Assim muitos autores encontraram organismos semelhantes às leveduras na vagina sob as mais variadas condições : Prurido vulvar associado com gravidez, diabetes, aftas vaginais, vaginite crônica, leucorreia e tambem assintomaticamente. Numerosos e diferentes organismos foram cultivados, mas **C. albicans** é mencionado mais frequentemente.

Doderlein (1) encontrou 36% de vaginas normais positivas para **C.albicans**. Plass e col. (2) encontraram 24% de positividade, das quais 17% o foram em mulheres grávidas normais.

Johnson e Maine (3) encontraram leveduras em 37% de 667 gestantes, em exames de rotina, numa clínica pré-natal. Estas foram identificadas como **C.albicans** em 42%; **C.stellatoidea** em 37%. Infecções por leveduras existiam associadas em 9.8 de 654 destas mulheres.

De 98 das pacientes que hospedaram apenas leveduras, 60 tinham sintomas de prurido e leucorreia. **C.albicans** foi encontrada em 52% daquelas que eram assintomaticas [Simons (4).]

Bittencourt e Câmara (5) em 224 mulheres obtiveram um resultado global de 65% de casos positivos, havendo maior porcentagem de **C.pseudotropicalis**.

Até a presente data não tivemos oportunidade de constatar «Muguet» provocado por outra levedura que não **C.albicans**, exceto em um caso de candidiase labial, observado no Instituto de Micologia da

* Médico-Assistente do Instituto de Micologia da Universidade do Recife. Chefe do Serviço de Micopatologia Ginecologica da Universiidade do Recife.

Universidade do Recife, cujo organismo produtor era **C. tropicalis** (Cast.) Berkhout var. lambica Diddens & Lodder, em uma criança do sexo feminino, de 9 anos.

OBSERVAÇÃO:

G. G. P., 6 meses, sexo feminino, residente em Recife, Pernambuco — Brasil.

Foi-nos trazida ao Laboratório de Micopatologia Ginecologica do Instituto de Micologia da Universidade do Recife, por sua genitora, informando-nos aquela que havia cerca de 7 dias, a criança apresentara a vulva avermelhada e recorberta por uma placa esbranquiçada.

Ao exame ginecologico constatamos tratar-se de uma criança com orgãos genitais bem constituidos, notando-se, ao entreabrir os grandes lábios vulvares, tôdo o vestibulo recoberto por uma massa branca, ressequida, de aspecto grumoso e perfeitamente delimitada, extendendo-se até os rebordos himeneais.

Foram de imediato efetuados exames a fresco com solução a 10% de hidróxido de potassio, em lâmina e laminula e observações ao microscopio, visualizando-se micélio fungico e blastopóros.

O esfregaço, corado pelo método de Grám, mostrou-nos além das estruturas típicas das preparações microbiológicas vulvo-vaginais, tais como Lactobacillus de Doderlein e células epiteliais, abundantes células sacharomicetiformes e hifas micelianas em franco desenvolvimento.

O material foi plantado em meio de Sabouraud-acromicina e meio de Sabouraud líquido, para posterior observação, desenvolvendo-se abundantemente ,em 48 horas, um cultivo típico de leveduras.

Após as técnicas de rotina para identificação da espécie, isolamos **C. albicans** (Robin) Berkhout.

Iniciamos o tratamento da doentinha, que constou preliminarmente da retirada de todo o material crostoso e aplicação de Gentersal (*) 48 hs. após, efetuamos novo exame na criança, verificando o desaparecimento do material crostoso, persistindo no entanto hiperemia da mucosa. Prosseguimos o tratamento com Gentersal.

15 dias após voltou ao nosso serviço sem apresentar sintomas clínicos, tendo então vulva de aspecto normal.

O plantio de contrôle resultou negativo para leveduras.

Esta paciente veiu a falecer em Julho do corrente ano, de gastro-enterite.

REFERÊNCIAS:

1 — DÖDERLEIN, A — Puerperalfieber — Leifzg — 1892.
2 — PLASS COL — Iowa State Med. J. (Marth) 1930 e Am. J. Obst. Gycol. 22 (1931) 320.
3 — JOHNSON, CG AND MAYNE R. — Am. Journal Obst. Gynecol. 55 (1948) 852.
4 — Simmons — Medical Mycology — Chapter 14 — Pag. 15 (Moniliasis)
5 — BITTENCOUT, J. E CÂMARA, A. — Micose vaginal — Separata de revista de Ginecologia e Obstetricia — Ano L — n.º 3 — vol. 93 — Março 1956.

(*) E' o Gentersal uma preparação dos Laboratórios Johnson & Johnson, contendo como ingredientes ativos, Violeta de Genciana e Cloreto de Alquidimetilbenzilamônio, em base cremosa. De fácil aplicação e isento das desvantagens da solução de Violeta de Genciana, comumente usada.

Revista de Agricultura, 2 (1): 25-35, 1959



ALGUNS FUNGOS DOS GÊNEROS ENGLERA E ENGLERULASTER

A. CHAVES BATISTA
G. E. P. PERES
(Publicação n. 148 do I. M. U. R.)

No estafante trabalho de revisão dos fungos Asterinaceae, verificamos que a posição dos gêneros *Englera* e *Englerulaster* tem sido flutuante, no campo da Sistemática, achando-se, tais gêneros, ùltimamente, confundidos com o gênero *Asterina* Lév. (A Dictionary of the Fungi, Ainsworth & Bisby, ed. 1954).

Depois de examinar alguns milhares de especimens de Asterinaceae, reconhecendo a validade das paráfises, como de importância para a diferenciação genérica, nesse grupo, o gênero *Asterina* Lév. destacou-se por suas características de micélio glabro, não setoso, com hifopódios laterais, tendo ascostromas aplanados, radiados, de dehiscência estelar, ascos aparafisados, 2 - tunicados, e ascosporos feodídimos.

Dêsse modo, *Englerulaster* e *Englera* são, de fato, diversos de *Asterina,* por seus ascostromas globosos ou sub-globosos, de dehiscência resultante da dissolução mucosa de sua parede superior.

Embora, inicialmente, os ascostromas, nesses dois gêneros, sejam orbiculares, aplanados e típicamente radiados, evolvem, logo mais, para a condição de globosos, e, à maturidade, a sua região apical entra em dissolução mucosa, sendo assim, perfeitamente autônomos.

Englerulaster v. Höhn. foi admitido entre os Microthyriaceae (Theissen, in Broteria, p. 78, 1914; Theiss. & Syd. in Ann. Myc. XV: 420, 1917; Syll. Fung. XXIV: 421, 1926; Clements & Shear, in The Genera of Fungi, 99, 1931).

Depois, (Syd. & Petrak, *in* Ann. Myc. XXIX: 245, 1931), estudando *E. atrides* Syd. estimaram o gênero *Englerulaster* como sinônimo de Asterina e êsse ponto de vista seria, muito mais tarde, em 1954, exposto por Ainsworth & Bisby, loc. cit. Contudo, Stevens, (*in* Stevens & Ryan, The Microthyriaceae, 1939), reconhecia *Englerulaster* como gênero válido, ao reestudar *E. atrides;* essa espécie, aliás, foi tomada por êle como

distinta, pròpriamente, de *Englerulaster,* pela ausência de paráfises, eleita, dessa fórma, como tipo de seu novo gênero *Englera.* Hansford (in Comm. Myc. Inst. Myc. Pap. n. 15: 189, 1946) independizou a família Asterinaceae de Microthyriaceae, afirmando, porém, a necessidade de uma completa revisão de tôdas as espécies, para a delimitação dos gêneros, entre os quais *Englerulaster* foi tratado como duvidoso e, consequentemente, também *Englera.*

No curso de nossos estudos sôbre *Asterinaceae,* reconhecemos que êsses gêneros distanciam-se de *Asterina.*

Acordamos, inteiramente, com o conceito de Stevens, anteriormente explanado e propomos, agora, a revalidação de *Englerulaster* e *Englera,* que devem ser mantidos na família dos Asterinaceae, cujo senso é ampliado pelo primeiro dos Autores deste trabalho, em outra Publicação.

ENGLERULASTER v. Höhn.
in Frag. Z. Myk. 10: 520. Litz. K.
Akad. Wiss. Wien 119: 454, 1910.
Tipo: *E. orbicularis* (B. & C.) v. Höhn.

Micélio superficial, não setoso, de hifas ramificadas irregularmente ou reticuladas, marron-negras, com hifopódios laterais.

Ascostromas superficiais, de início plano-orbiculares, depois convexos ou subglobosos, radiados, glabros, dehiscendo por dissolução mucosa da parede superior; parede basal inconspícua.

Ascos 8-esporos, parafisados.

Ascosporos 1-septados, marron-negros.

ENGLERULASTER BAILEY (B. & Br.) Theiss.
in Abh. K. K. Zool. Bot. Ges. 7: 21, 1914.
Broteria, XII: 80, 1914.
Sin: *Asterina bailey* B. & Br.
in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, V: 89, 1860.
Asterina nigrita Cke. *in* Herb.
Asterella Hakeae Mc Alp.
in Proc. Linn. Soc.: N. S. Wales, p. 37, 1897.

Plágulas epífilas, marron-negras, carbonáceas, circulares a sub-circulares, isoladas, de 1-2mms. de diam.

Micélio superficial, marron-negro não setoso, septado, telemórfico, hifopodiado, de ramificações alternas, em ângulos de 45.°, formando uma trama reticulada entre os ascostromas; hifas sub-constrictas, tendo células de 16-16,5 x 8-10 u.

Hifopódios laterais, 1-celulares, nodulares, escassos, de 7-8 x 5,5-7u. Fig. 1.

Haustórios — Não observados.

Ascostromas dispersos ou confluentes, a princípio orbiculares, planos, depois convexos a sub-globosos, 180-340 u diam. 90-110 u de alt. membranosos, de paredes radiadas, formadas por células retangulares, de 8-10 x 4-5 u; dehiscência inicialmente por um pseudo-ostíolo, seguindo-se a dissolução mucosa da parede superior; parede basal inconspícua.

Ascos cilindráceos a elipsoides, 2-tunicados, sésseis a curto pedicelados, 8-esporos, parafisados, 67,5-85 x 29-32 u.

Paráfises hialinas, filiformes, septadas, simples, 1,5-2,5u diam.

Ascosporos oblongos, marron-negros, 1-septados, cosntrictos, dísticos a conglobados, lisos, de 20-24 x 8-10u.

Sôbre folhas de *Hakea* sp. New South Wales, Mt. Victoria. — Leg. Dr. E. Pritzel, comm. P. Hennings, 4/1902. Ex Rehm Ascomyceten, n. 1497, no Herb. da Univ. de Padova, Itália.

ENGLERULASTER ORBICULARIS (B. & C.) v. Höhn.

in Frag. Z. Myk. 10: 520, Litz K. Akad. Wiss. Wien 119: 454, 1910.

Sin.: *Asterina orbicularis* B. & C.
in Grév. IV: 9, 1876.

Dimerosporium orbiculare Martin
in Jour. of Mycol. 1: 146, 1885.

Plágulas epífilas, marron-escuras, circulares a sub-circulares, carbonáceas, de 4 - 7 mms. de diam.

Micélio superficial, não setoso, de hifas septadas, marron-escuras, telemórficas, hifopodiadas, ramificadas oposta e alternadamente, com células de 13,5 - 19 x 4 - 5,5 u. Fig. 2.

Hifopódios laterais, 1-celulares, conoides, 1 - 2 lobados, alterna e unilateralmente dispostos, 10 - 13,5 x 7 - 8 u, originando haustórios epidermais, marron, sub-globosos, de 7,5 - 9 x 6,5 - 8 u, que penetram os estômatos da folha do hospedeiro. Fig. 3.

Ascostromas dispersos ou confluentes, orbiculares, depois sub-globosos, 157 - 200 u de diam., glabros, marron-negros, membranosos, de paredes sub-parenquimáticas, formadas por células retangulares e poligonais, radialmente dispostas, 10 - 13,5 x 8 - 10 u; dehiscência por dissolução mucosa da parede superior, que se apresenta marron-clara e à maneira de película. Fig. 4.

Ascos elipsoides a sub-globosos, 2-tunicados, sésseis, 8-esporos, 48 - 51 x 43 - 45 u, parafisados. Paráfises filiformes, simples, hialinas, 4 u de diam.

Ascosporos elipsoide-oblongos, marron-escuros, 1-septados, constrictos, conglobados, lisos, 32 - 37 x 13 - 16,5 u.

Sôbre folhas de *Ilex coriacea* — Florida, U. S. A. Leg. G. Martin, Jan. 1886. Espec. n. 3439, ex Rabenh. Wint. Fungi europaei, no Rijksherbarium, Leiden.

S/folhas de *Ilex opaca* — Florida. Dr. Geo Martin, 1885. Espec. n.º 1362, ex Ellis. North American Fungi, cedido pela Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Pa.

Idem, sôbre *Ilex opaca,* Ravenel Fasc. 2, 1853. Tipo, no Herb. da Acad. of Nat. Sciences, Philadelphia, Pa.

ENGLERA Stevens

Tipo: *E. atrides* (Syd.) Stev.
in The Microthyriaceae, Univ. Ill. Press, p. 45, 1939.

Micélio superficial, não setoso, irregularmente ramificado, marron-negro, com hifopódios laterais.

Ascostromas superficiais, a princípio plano-orbiculares, depois sub-globosos, radiados, glabros, de dehiscência por dissolução mucosa da parede superior; parede basal tênue ou inconspícua.

Ascos 8-esporos, aparafisados.

Ascosporos 1-septados, marron-negros.

ENGLERA ASPERULISPORA (Gaill.) Stev.

in The Microthyriaceae, Univ. Ill. Press. p. 45, 1939,

Sim: *Englerulaster asperulispora* (Gaill.) Theiss.
in Ann. Myc. X: 171, 1912.
Asterina asperulispora Gaill.
in Bull. Soc. Myc. France, p. 180, 1897.
Asterella opulenta P. Henn. Hedw. p. 83, 1904.
Asterina opulenta (P. Henn.) Sacc. Syll. Fung. XVII: 876.

Plágulas anfígenas, isoladas a confluentes, de 1,5 - 8 mms. de diam., negras.

Micélio marron-claro, superficial densa e irregularmente ramificado, tendo células de 5 - 16 x 3 - 5 u; setas ausentes.

Hifopódios numerosos, sésseis, globosos ou oblongos, 1-celulares, unilaterais, dispersos, de 8 - 10 x 6 - 8 u.

Ascostromas espalhados, marron-oliváceos, a princípio escutelares, radiados, depois globosos, membranosos, mucoso-dehiscentes, de 40 - 127 u de diam.; paredes de 8 - 12,5 u de diam., formadas por células sub-globosas, de 4 - 6 x 2,5 - 4 u e células dos bordos de 9 - 16,5 x 3 - 4 u. Fig. 5.

Micélio interno constituido por hifas sub-hialinas, de 2 - 3 u de diam. e originando-se da porção basal dos ascostromas; haustórios hialinos de consistência esponjosa, 9 - 11 x 5 - 8 u, sub-epidermais.

Ascos globosos, 2-tunicados, sésseis, 8-esporos, 70 - 80 u de diam., aparafisados.

Ascosporos elipsoide-oblongos, 1-septados, constrictos, intensamente espinosos, marron-negros, 42 - 45 x 20 - 24 u.

Sôbre folhas de *Ilex sp.* São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. Leg. Theissen. Tipo, ex P. A. Saccardo, no Herb. da Univ. de Pádua.

Idem, sôbre folhas de *Ilex sp.* Tubarão, Sta. Catarina, Brasil. E. Ule, Out. 1890. Espec. n. 4053, no Rijksherbarium de Leiden.

ENGLERA CREBERRIMA (Syd.) Bat. & Peres n. comb.

Sin.: *Asterinella creberrima* Syd.
in Ann. Mycol. XV: 247, 1917.
Asterinella reyesiana Rehm.
in Ann. Mycol. XVI: 247, 1918.

Colônias circulares, 5 - 8 mms. de diam. ou confluentes, tornando-se, assim, efusas.

Micélio superficial, marron, de hifas irregularmente ramificadas, em ângulos de 45 - 90.°, septadas, com células de 5 - 17 x 2 - 4 u; setas ausentes.

Hifopódios oblongos, unilaterais, dispersos, 1-celulares, de 6 - 8 x 5 - 6 u. Haustórios inobservados.

Ascostromas marron-oliváceos, a princípio escutelares, radiados, depois sub-globosos, 120 - 205 u, de diam. de dehiscência por dissolução mucosa; paredes de 27 - 32 u de diam., tendo células sub-globosas de 4 - 5 x 3 - 4u.

Ascos ovoide-elípticos, 2-tunicados, sésseis, 8-esporos, 32 - 38 x 30 - 35 u, aparafisados, Fig. 6.

Ascosporos elipsoide-oblongos, 1-septados, constrictos, espinosos, marron, 22 - 24 x 11 - 13,5 u.

Sôbre folhas de *Premna sp.* Los Banos, Laguna, Filipinas. C. F. Baker, Jan. 1914. Tipo, n. 512, ex Fungi Malayana, no Herb. da Univ. de Pádua.

O especimen n.° 2163, Rehm., Ascomycetes exsiccati, *Asterinella reyesiana* Rehm, também do mesmo Herb. da Univ. de Pádua, foi por nós analisado e está acorde com as características supra descritas.

Est *Englera* ascostromatibus subglobosis, dissolutione mucosa parietum et ascis aparaphysatis.

ABSTRACT

The genera *Englerulaster* v. Höhn. and *Englera* Stevens through the globose condition of its ascostromata and opening by a mucose dissolution of the superior wall of these fructifications are considered as distinct from *Asterina* Lév. an so revalidated in this paper.

Are treated also the species *Englerulaster bailey* (B. & Br.) Theiss. *E. orbicularis* (B. & C.) v. Hohn. *Englera asperulispora* (Gaill.) Stev. and *E. creberrima* (Syd.) Bat. & Peres n. comb. as a consequence of the study of type material.



Fig. 1

ENGLERULASTER BAILEY (B. & Br.) Theiss.

Micélio hifopodiado, sector do ascostroma, asco parafisado e ascosporo. (Orig.)



Fig. 2

ENGLERULASTER ORBICULARIS (B. & C.) v. Hohn.

Micélio hifopodiado, sector do ascostroma, asco e ascosporos. (Orig)

Paráfises não indicadas nesta ilustração.



Fig. 3

ENGLERULASTER ORBICULARIS (B. & C.) v. Hohn.

Hifopodios de penetração estomatal.



Fig. 4

ENGLERULASTER ORBICULARIS (B. & C.) v. Hohn
Cleistotécio, micélio, asco e ascosporo.

Paráfises não indicadas nesta ilustração.

Fig. 5

ENGLERA ASPERULISPORA (Gaill.) Stev.

a) esboço do ascostroma;
b) micélio hifopodiado;
c) ascostroma sob secção longitudinal;
d) asco e ascosporo. (Orig.)



Fig. 6

ENGLERA CREBERRIMA (Syd.) Bat. & Peres n. comb

a) esbôço de ascostroma;
b) micelio hifopodiado;
c) secção longitudinal de ascostroma;
d) asco e ascosporo.

Motor a Explosão: partes vitais, válvulas, características e funcionamento

CARLOS DE ARAÚJO TÔRRES
Eng. Agrônomo

MOTOR

DEFINIÇÃO: — É uma máquina pela qual uma forma de energia, especialmente o calor, é transformada em fôrça mecânica e aplicada em realizar um trabalho.

Combustíveis mais usados: — GASOLINA e DIESEL

Diferenciação básica entre os motores a Gasolina e a Óleo Diesel: Nos motores a gasolina, o combustível e o ar são misturados (no carburador) antes de penetrar nos cilindros, nos quais a mistura é comprimida moderadamente e inflamada por uma faisca elétrica.

Nos motores Diesel, o combustível é pulverizado sob grande pressão dentro dos cilindros, nos quais o ar foi prèviamente comprimido a tal ponto que a sua temperatura se elevou o bastante para vaporizar e inflamar.

Partes essenciais de um motor a gasolina:

a) partes estacionárias: cilindros, carter, cabeçote, etc.;
b) partes móveis: pistão, biela, eixos de manivelas, volante e válvulas e o mecanismo de acionamento (das válvulas);
c) sistemas de: combustível, ignição, refrigeração, lubrificação e regulação de velocidade.

Os motores, independente do número de cilindros, podem ser:
De 2 e 4 tempos, ou ciclo a 2 tempos e ciclo a 4 tempos.
Podem ser ainda, monocilindros e multicilindros.

UNIVERSIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE MICOLOGIA

PUBLICAÇÃO N.º 149

TORULOPSIS GLABRATA - Contribucion al conocimiento de su habitat

R. C. Artagaveytia - Allende
Jarbas Sizenando Silveira

4 JUN 1962
MM4

RECIFE — BRASIL

1962

UNIVERSIDADE DO RECIFE

I N S T I T U T O D E M I C O L O G I A

PROF.DR. JOÃO ALFREDO GONÇALVES DA COSTA LIMA
Reitor da Universidade

PROF.DR. NEWTON DA SILVA MAIA
Vice-Reitor da Universidade

DR. ELMANO AMORIM DE MORAES
Secret. Geral da Universidade

PROF.A. CHAVES BATISTA
Diretor-Pesq. do IMUR.

UNIVERSIDADE DO RECIFE

I N S T I T U T O   D E   M I C O L O G I A

Publicação nº 149

TORULOPSIS GLABRATA - Contribución al conocimiento de su habitat

R. C. Artagaveytia-Allende
Jarbas Sizenando Silveira

- 1 9 6 2 -

UNIVERSIDADE DO RECIFE

I N S T I T U T O D E M I C O L O G I A

Publicação nº 149

TORULOPSIS GLABRATA - Contribución al conocimiento de su habitat

R.C.Artagaveytia-Allende +
Jarbas Sizenando Silveira ++

En los últimos años, la presencia de Torulopsis glabrata como huesped del hombre

+ De la Faculdad de Humanidades y Ciencias de Montevideo, Uruguay colaborando en el Instituto de Micología como invitado especial del Magnífico Rector Prof.Dr. Joaquim Ignacio de Almeida Amazonas.
++ Médico Asistente del Instituto de Micología de la Universidad de Recife, Servicio de Micoginecopatología.

ha venido preocupando a los médicos clínicos. Hasta hace relativamente poco, solo se consideraba de importancia clínica el hallazgo de Candida albicans, reputada practicamente como exclusivo agente causal de los problemas en los cuales se encuentran involucrados hongos levaduriformes.

Más tarde fué adjudicado valor patológico a Candida tropicalis y posteriormente a Candida parapsilosis, en especial en enfermos toxicómanos afectados de cardiopatías.

Hace pocos años, empezaron a ponerse en evidencia los hallazgos de Torulopsis glabrata. Black & Fischer (1) aislaron al germen en un caso de bronconeumonia; otros autores efectuaron hallazgos semejantes en otros cuadros patológicos, y, en 1952, Lopez-Fernandez (2) publicó un extenso y muy bien documentado trabajo sobre el hallazgo de Torulopsis glabrata en el apendice de un niño y cuyo aspecto histopatológico semejaba una histoplasmosis.

En el año 1957, Chaves Batista, Oliveira y Silveira (3) efectuaron un estudio en materiales de bilis en personas con su arbol biliar afectado, encontrando que un 65% de los

exámenes fueron positivos para levaduras, especialmente de los géneros Candida & Torulopsis. Chaves Batista y colaboradores(4) encontraron en el arbol biliar una incidencia de Torulopsis glabrata igual al 1,7% de las levaduras aisladas.

El poder patógeno de Torulopsis glabrata ha sido estudiado por varios autores. Black y Fischer (1) inocularon ratas por via intraperitoneal con producción de nódulos intraperitoneales. Lodder y de Vries (5) y Lodder y de Minjer (6) inyectaron ratas, por via intracardíaca los autores citados en primer término, y por via intraperitoneal y subcutanea los segundos. Los resultados de ambos grupos de autores no fueron concordantes pues,en el primer caso,se pudo aislar el germen de las ratas muertas y, en cambio, en el segundo,no observaron lesiones histopatológicas. Lodder y de Minjer (6) concluyen que su cepa no es patógena.

Sin embargo, Lopez-Fernandez (2) prueba que de los animales inoculados experimentalmente, y que fueron conejos, cobayos, ratas y ratones, estos últimos son los más sensibles, dando un cuadro histopatológico completo. De acuerdo con las concluciones de

este autor,debemos adjudicar a Torulopsis glabrata, por lo menos, un poder patógeno para el ratón.

Confirmando esta opinión y en cuanto al humano se refiere,debemos citar que Chaves Batista, Oliveira y Silveira (7),quienes adjudican gran valor a la presencia de levaduras en materiales de vesicula biliar y justifican considerar a los gérmenes de los géneros Candida y Torulopsis como causantes de colecistitis crónicas y de ciertos tipos de litiasis biliar.

Dado el aumento de la frecuencia del aislamiento de hongos levaduriformes en pacientes sometidos a altas dosis de antibioticos,a los cuales se les adjudica la causal para el desarrollo de afecciones por levaduras,por un mecanismo todavía no aclarado completamente,creemos oportuno dar una reseña de casos patológicos o no,en los cuales hemos aislado Torulopsis glabrata.

En el plazo de un año,en el Instituto de Micologia,de la Universidade de Recife,se han aislado 16 cepas de Torulopsis glabrata, distribuidas de la siguiente manera:

a) 7 cepas en pacientes ginecológicos y de

material recogido de uretra e vagina. Todas estas enfermas, en las cuales se aisló Torulopsis glabrata como germen levaduriforme único, presentaban leucorrea asistomática. Solamente una de estas enfermas presentaba, associada a la levadura, tricomonas vaginales.

b) 1 cepa en un caso de colicistopatía (reflujo de bilis C).

c) 5 cepas de material de apéndice humano obtenido quirurgicamente (apendicitis crónicas).

d) 1 cepa aislada de orina de un paciente afectado de lupus eritematoso.

e) 2 cepas obtenidas de materias fecales. En uno de los casos no existía sintomatología definida y en el otro caso se trataba de un portador de apendicitis crónica, ptosis intestinal y enterocolitis. Además, este paciente hacia uso frecuente de antibioticos.

Los autores, al efectuar esta recopilación de casos, en los cuales han intervenido personalmente, solo desean contribuir al conocimiento de que Torulopsis glabrata es una especie de mayor difusión que lo que en

general se piensa,y que puede estar relacionada intimamente con cuadros patológicos en el hombre.

RESUMEN

Se resalta la posible importancia del hallazgo de Torulopsis glabrata en pacientes con cuadros patológicos diversos, como procesos vaginales, biliares, intestinales y otros.

SUMÁRIO

Neste trabalho,os A.A.,apreciando o assinalamento frequente de Torulopsis glabrata,nos últimos tempos, chamam a atenção para a importância dêsse fato,de vez que o fungo em tela vem sendo encontrado associadamente a processos vaginais, distúrbios intestinais e de apêndice cecal,além de outros casos de doença.

ABSTRACT

The A.A. are calling attention in this paper for the signification of the findings of Torulopsis glabrata on several human pathological process, biliar mycotic infections, intestinal troubles and others.

ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit rufen die Verfasser die Aufmerksamkeit suf die Funde von Terulopsis glabrata in mehreren menschlichen pathologischen Vorgaengen, mykotische Gallen Infektion, Darmbeschwerden und undere Krankheitsfaelle.

R E F E R Ê N C I A S

1) Black R.A. and Fischer C.V. - Cryptococcic bronchopneumonia - Am.Jour.Dis. Child., 54:81-88, 1937.

2) Lopez-Fernandez, J.R. - Acción patógena experimental de la levadura Torulopsis glabrata productora de lesiones histopatológicas semejantes a las de la histoplasmosis.An.Fac.Med. de Montevideo 37:470-843, 1952.

3) Chaves Batista A., Oliveira S. D. de & Silveira, G.L. - A incidência de fungos Candida e Torulopsis na bilis de portadores de colecistitis. Com.Cient. Inst. Micologia, Univ.Recife, nº 3, 1957.

4) Chaves Batista, A., Oliveira, S. D. de Silveira, G.L., Maia, H.da S. & Silveira, J.S. - Fungos das colecistites micóticas. Com. al 6º Congr. Inter. Med. Trop. e Palud., Lisboa, 1958.

5) Lodder, J. and De Vries, N.F. - Some notes on Torulopsis glabrata - Mycopathologia, 1:98-103, 1938.

6) Lodder, J. and De Minjer, A. - On biology of pathogenic Torulopsidoideae in Bio-

logy of Pathogenic Fungi edited by W. J. Nickerson, Waltham.Mass.Chronica Cc. 1947, pg. 7-19.

7) Chaves Batista A., Oliveira S.D. de e Silveira G.L. - Mycotic cholecystitis.Com. al 6º Congr.Intern.Med.Trop. e Palud., Lisboa, 1958.

IMUR, 14.5.1962

UNIVERSIDADE DO RECIFE

INSTITUTO DE MICOLOGIA

Publicação nº 150

OCORRÊNCIA DE *CANDIDA HUMICOLA* (DASZEWSKA) DIDDENS & LODDER EM URETRA DE GESTANTE

JARBAS SINZENANDO SILVEIRA

RECIFE — BRASIL
1963

UNIVERSIDADE DO RECIFE

I N S T I T U T O D E M I C O L O G I A

oOo

PROF.DR. JOÃO ALFREDO GONÇALVES DA COSTA LIMA
Reitor da Universidade

PROF.DR. NEWTON DA SILVA MAIA
Vice-Reitor da Universidade

DR. EDMIR REGIS DE CARVALHO
Secret.Geral da Universidade

PROF.A. CHAVES BATISTA
Diretor-Pesq. do IMUR

UNIVERSIDADE DO RECIFE

I N S T I T U T O D E M I C O L O G I A

Publicação nº 150

OCORRÊNCIA DE CANDIDA HUMICOLA (DASZEWSKA) DIDDENS & LODDER EM URETRA DE GESTANTE

Jarbas Sizenando Silveira



- 1 9 6 3 -

UNIVERSIDADE DO RECIFE

I N S T I T U T O D E M I C O L O G I A

Publicação nº 150

OCORRÊNCIA DE CANDIDA HUMICOLA (DASZEWSKA) DIDDENS & LODDER EM URETRA DE GESTANTE

Jarbas Sizenando Silveira +

O desenvolvimento do Serviço de Micopatologia Ginecológica, no Instituto de Micologia, da Universidade do Recife, sob os auspícios do Magnífico Reitor, Prof. Dr. JOAQUIM AMAZONAS, e do Prof. A. CHAVES BATISTA, Diretor do Instituto de Micologia, da Universidade do Recife, permite-nos relatar, como um dos frutos da pesquisa, continuada incessantemente, o assinalamento do primeiro caso de Candida humicola em uretra feminina.

+ Médico Assistente do Instituto de Micologia da Universidade do Recife. Chefe do Serviço de Micopatologia Ginecológica do mesmo Instituto (abril, 1958).

Dêste organismo, apenas 4 cêpas foram estudadas até hoje (Lodder & Van Rij (1)):

Uma é a cêpa original de Daszewska (Suiça), isolada de arbustos.

Uma 2ª cêpa foi descrita por Stautz (Alemanha), como Apiotrichum porosum e isolada de exsudatos de árvores.

A 3ª cêpa foi estudada por Langeron (Paris), e a 4ª por Heurici(U.S.A.), isolada de cogumelos.

A constatação desta espécie,pela primeira vez, em uretra feminina, abre novos horizontes ao estudo da flora micótica da mulher, mercê das idéias básicas até então existentes, da frequência de um número restrito de leveduras incidindo sôbre o aparelho genital feminino.

A enfêrma, E.F., 28 anos,branca, pernambucana, casada, residente em Recife,apresentou-se, ao nosso serviço, com queixas de fluxo vaginal, e grávida de 3 mêses.

Paciente de constituição física boa, não portadora de ginecopatias, secundigesta, no 3º mês.

Ao exame ginecotocológico,constatamos a presença de fluxo vaginal abundante, branco-amarelado, grumoso. Colo uterino banhado por fluxo branco-claro e sem lesões macroscópicas. Uretra levemente umedecida.

Efetuamos colheita de material de vagina, colo do útero e uretra, semeando em tubos de Sabouraud com Acromicina. O pH vaginal era de 4,5. Esfregaços vaginais corados pelo método de Gram mostraram-nos abundantes bacilos de Döderlein, alguns leucócitos, escassas células epiteliais e abundantes cocos gram-positivos (flora do tipo III - classificação de Man. of Heurlin). A pesquisa de tricomonas vaginalis, a fresco, foi positiva.

Três dias após a semeadura, observamos crescimento do material uretral, tanto à temperatura ambiente, quanto a 37º C. Foi efetuado, então, o plaqueamento, visando a obtenção de cultura pura.

Foram, em seguida, efetuadas semeaduras em tubos de Sabouraud com acromicina, Fig. 2, e meio de creme de arroz, Tween 80-Agar, êste último para observação de clamidosporos.

Após lograr-se cultivo puro, efetuamos as provas bioquímicas e culturais, para identificação da espécie, cujo quadro damos abaixo:

Fermentação:

Glicose (-) Pel. Prec. Maltose (-) Pel. Prec.
Galactose(-) Pel. Prec. Lactose (-) Pel. Prec.
Sacarose (-) Pel. Prec. Inulina (-) Pel. Prec.

Assimilação de açúcares:

Glicose (+) Maltose (+)

Galactose (+) Lactose (+)
Sacarose (+) Inulina (-)

Assimilação de Nitrato de Potássio = (-)Negativo.

Etanol como única fonte de carbono = Escasso crescimento

Crescimento em Leite de Litmus =Coagulação completa. Anel amarelo, largo na parte superior do tubo e película.

Cultura em lâmina (Batata-dextrose-agar) =Blastosporos cilíndricos ou globosos, curtos e curvados, pseudomicélio abundantemente desenvolvido e ramificado. Micélio escasso (tipo Blastodendrium), Fig. 1.

Plantio em extrato de malte =Precipitado floculento. Película fina, baça e ligeiramente encrespada.

Mensuração = 7.6-9.5 (3.1-6.3) u.

Cultivo sôbre Malte-agar = Após 6 dias de crescimento, observamos colônia composta, cerebriforme no centro, lamelar-arborescente na parte mediana, brilhante, de bordos auriculados, medindo 10 x 6 mm. Reverso creme, liso.

Creme de arroz - Tween 80-agar = Blastosporos globosos e cilíndricos, isolados ou em cadeias, alguns curvos.

Espécie: C.HUMICOLA (Daszewska) Diddens & Lodder.

Em recente trabalho publicado (2), R. C.Artagaveytia-Allende & R.P. Coelho fazem, com inúmeras razões, cair em sinonímia C. curvata (Diddens & Lodder) Lodder & van Rij, com C. humicola (Daszewska) Diddens & Lodder.



Fig. 1
CANDIDA HUMICOLA (Daszewska) Diddens & Lodder
Cultura em batata-dextrose-agar. Observam-se blastosporos ovóides ou globosos, isolados ou em cadeias, alguns curvos.

Fig. 2
CANDIDA HUMICOLA. - Desenvolvimento em tubo de Sab. com acromicina.

ABSTRACT

The Author relates the occurrence of C.humicola (Daszewska) Diddens & Lodder, in urethral discharge. This is the first case of C. humicola in the human kind and can open new ways in the study of the woman's micotic flora.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser berichtet ueber das vorkommen von C.humicola(Daszewska) Diddens & Lodder im Urin. Dies ist der erste Fall von C. humicola im menschlichen Wesen und kann neue Wege oeffnen fur das Studium der mikotischen Flora, der Frauen.

REFERÊNCIAS

1 - Lodder & Van Rij - The Yeasts.
2 - R.C.Artagaveytia-Allende & R.Pessoa Coelho. Estudo de Candida humicola (Daszewska) Diddens & Lodder y el reconocimiento de C.curvata (Diddens & Lodder) Lodder & Van Rij como su sinonimo. Publ. 149, IMUR, 1958.

LG/
IMUR, 4.9.1963

INSTITUTO DE MICOLOGIA — UNIVERSIDADE DO RECIFE

PUBLICAÇÃO N.º 151

TWO NEW MYXOMYCETES FROM BRAZIL

MARIE L. FARR

GEORGE W. MARTIN

1958

13 APR 1959

TWO NEW MYXOMYCETES FROM BRAZIL

MARIE L. FARR (1)
GEORGE W. MARTIN (2)

This report is a result of a collaboration by correspondence between the two authors. The new species were independently studied by each author, and the descriptions and discussions in this paper represent their combined efforts. The introductory section, Latin diagnoses, and illustrations are the responsibility of the senior author.

Introductory remarks

A number of «new species» of Myxomycetes has been based on descriptions of fructifications that were obviously variants or abberations of previously described species. Slime molds are extremely sensitive to changes in their environment, and adverse conditions or parasitism by filamentous molds frequently result in incomplete maturation of the fruiting bodies or an alteration of such taxonomically diagnostic features as capillitial and spore markings. Genetic phenomena, such as hybridization, undoubtedly are an additional cause of atypical fructifications, although this remains to be proved.

Recently, however, two rather large fructifications — one an *Arcyria* and one a *Stemonitis* — were collected in nature, and from their generally robust and uniform character, the absence of parasitic molds, and the lack of such features as «giant» or malformed spores (which

(1) Mycologist, Instituto de Micologĭa, Universidade do Recife, Pernambuco — Brasil.

(2) Professor Emeritus, Department of Botany, State University of Iowa, U. S. A.

usually indicate abnormal development), it is obvious that these specimens were not victims of unfavorable environmental conditions; furthermore, their morphologic features are sufficiently distinct within their respective genera to distinguish them from all other known species. It therefore seems justifiable to describe these collections as new species.

Arcyria corymbosa sp. nov.

Plasmodium ignotum. Sporangia sub-cylindrica, stipitata, formant plures fasciculos, obscuro-rosea vel cinnabarina clara, 3-4 mm alta, 0,3-05 mm diam.; stipite fusco-atro, longitudinaliter plicato, plures stipites coaliti; calyculus levis, nitidus; tubuli capillittii 2-7 μ diam. irregulariter crenulati vel sinuosi, levis cum papillis solitariis vel aggregatis; sporae (8) 9-10 (11) μ diam., globosae vel subglobosae, subtillim verruculoso-reticulatae.

Plasmodium unknown. Sporangia stalked, subcylindrical, tapering slightly to the apex, dull rose or light cinnamon-brown, united in clusters of 2-20 by the individual, but fused, stalks, total height 3-4 mm, 0,3-0,5 mm diam.; hypothallus continuous, broadly expanded, membranous, hyaline, shining; stalk c. half the total height, dark reddish-brown, slender, longitudinally plicate, frequently surrounded with a membranous sheath extending from the hypothallus, merging into the shallow, membranous, iridescent cup above, filled throughout with round to oval cells which are pale brown under transmitted light; capillitium firmly attached to base of calyculus, forming a dense, elastic net, very pale reddish-brown under transmitted light, of irregular tubes nearly even to strongly crenulate in outline, marked with scattered single or loosely grouped, blunt papillae and cogs, and occasional obscure spirals, otherwise smooth, 2-7 μ diam., with free ends short and acute insid the cup, rounded or irregular above; spores ferrugineous in mass, pale reddish-yellow under trans-

Fig. 1 — *Arcyria corymbosa* Farr & Martin sp. nov.

A — habit, x 24
B — Portion of capillitium, x 1100
C — spores, x 1100

Magnifications given are those of drawings *before* photographic reduction by 1/2,2

mitted light, (8) 9-10 (11) μ diam., subglobose or globose, faintly but distinctly warted-reticulate, with scattered or loosely grouped more prominent warts in addition.

TYPE: Brazil, Pernambuco, Jardim Zoo-Botanico, Dois Irmãos, near Recife; on bark of decaying log, *Farr 1766*, 27 May, 1958. In herb. Instituto de Micologia, Universidade do Recife, Brazil; State University of Iowa, Iowa City, Iowa, U. S. A.

This species belongs in affinity to that group of arcyria's that are characterized by a close capillitium attached to the cup, though the spores resemble those of *A. ferruginea* Saut. The habit is that of the clustered phase of *A. cinerea* (Bull.) Pers., formerly known as *A. digitata*. From this form the present species differs not only in its color, but, more significantly, in its substantially larger spores and in its characteristic, almost smooth, capillitium, which is unlike that of any recognized species.

Stemonitis brasiliensis Farr & Martin sp. nov.

Plasmodium ignotum. Sporangia dense gregaria, stipitata, cylindrica, nigro-brunnea, 2-3 mm alta, circa 0,3 mm diam.; stipite 1/3 ad 1/2 altitudinis totae, nigro, gracili; columella expansionibus membranaceis ad apicem, sporangii apicem attingentis; maculae reticuli superficialis capillitii 45-115 μ, cum pluribus apicibus liberis brevibus; sporae globosae, brunneo-atrae, dense et uniformiter echinulatae, (10) 11-11,5 (12) μ diam.

Plasmodium unknown. Sporangia densely gregarious but not clustered, arissing from a silvery or reddish-brown, inconspicuous hypothallus, stalked, cylindrical, 2-3 mm tall, c. 0,3 mm diam., blackish-brown; stalk 1/3 to 1/2 the total height, black, slender, expanding basally and merging into the hypothallus, tapering upward and continued within the sporangium as a columella; columella reaching the apex, sometimes with membranous expansions at the tip, and giving rise along its entire length to branches which anas-



Fig. 2 — *Stemonitis brasiliensis* Farr & Martin sp. nov.

A — habit, x 20

B — portion of capillitium and columella with spores, x 1100

Magnifications given are those of drawings *before* photopraphic reduction by 1/2,4

tomose to form an open, large-meshed capillitial network; surface net with many short, mostly spine-like free ends and meshes 45-115 μ diam.; spores blackish in mass, by transmitted light dark with a paler area, globose, uniformly and densely echinulate, (10) 11-11,5 (12) μ diam.

TYPE: Brazil, Pernambuco; Instituto de Micologia garden, Recife; on bark of living «Croton» (*Polyscias gneifoyllii* Bailey) hedge in the shade, *Farr 1834*, 25 June, 1958. In herb. Instituto de Micologia, Universidade do Recife, Brazil; State University of Iowa, Iowa City, Iowa, U. S. A.

Because of the definitely well-developed surface net, this is a *Stemonitis* — not a *Comatricha* — despite the free ends in the capillitium. In its color and external appearance it strongly suggests *S. nigrescens* Rex, which, however, has a fine-meshed net and smaller spores with warts forming a reticulate pattern. The only other known species of *Stemonitis* with a comparable, large-meshed capillitium is *S. webberi* Rex; this species, however, is much larger, of an entirely different aspect, and has smaller, smoother spores.

Acknowledgments

The authors are indebted to Dr. A. Chaves Batista for making possible this publication, and to Dr. Fernando Leal for correcting the Latin diagnoses.

CENTRO GRÁFICO DE FAMALICÃO
DE JOSÉ CASIMIRO DA SILVA
Av. Barão de Trovisqueira, 425/433
VILA NOVA DE FAMALICÃO — 1958

Reprinted from **BROTÉRIA**
Série de Ciências Naturais
Volume XXVII (LIV) Número 4
LISBOA ═══ 1958

Comp. e Imp.: CENTRO GRAFICO
Vila Nova de Famalicão — 1958

of Chaves Batista

INSTITUTO DE MICOLOGIA — UNIVERSIDADE DO RECIFE

PUBLICAÇÃO N.º 152

ALGUNS FUNGOS *MYRIANGIALES* E SEUS ASSOCIADOS

A. CHAVES BATISTA

M. L. NASCIMENTO

1958

13 APR 1960

ALGUNS FUNGOS *MYRIANGIALES* E SEUS ASSOCIADOS

A. CHAVES BATISTA
M. L. NASCIMENTO

Neste trabalho os A. A. estudam alguns fungos Myriangiaceae cuja posição taxonómica tem sido objecto de discussão. Graças à colaboração de diferentes entidades de pesquisas, como o Museu Nacional de Praga, Checoslováquia, Academia de Ciências Naturais de Filadélfia, U. S. A., Colecção Nacional de Fungos, U. S. A., foi-lhes possível examinar valiosos espécimens de fungos dessa família e confirmar-lhes as diagnoses, considerando por outro lado como espécies autónomas, às formas imperfeitas que eventualmente ocorrem associadas a esses Ascomycetes, como *Acrodesmis cestri* Syd. e *Articulariella quercina* (Peck.) von Höhnel. *Allosoma quercifoliae* nobis, é descrito como nova espécie bem como é proposto o novo género *Myriangiomyces* Bat., baseado em *M. quercifoliae* nobis.

Allosoma cestri Syd.
in Ann. Mycol. XXIV: 353, 1926.

Ascostromas hipófilos, desenvolvidos junto a esclerócios de *Acrodesmis cestri*, Fig. 1 — *a*, *b* e Fig. 3 — *b*, subglobosos, atenuados na base, tornando-se assim subestiptados, 70-225 μ de diâm., 115-130 μ de altura; porção estéril basal, parenquimática, tendo células subglobosas ou poligonais; parede superior composta por células irregulares, de 5-10 μ de diâ-

Fig. 1 — *a)* **Allosoma cestri** Syd. ; *b)* **Acrodesmis cestri** Syd.



Fig. 2 — **Allosoma cestri** Syd.

a) Micélio ; *b)* Asco ; *c)* Ascosporo (orig.)



Fig. 3 — **Allosoma cestri** Syd.

a) Secção longitudinal do ascostroma; *b)* Secção esclerocial de *Acrodesmis cestri* Syd.

metro, gelatinizando-se e desintegrando-se fàcilmente, à maturidade. Fig. 3 — *a*.

Micélio peliculoso, pletenquimático, superficial, marron-claro, de hifas irregularmente ramificadas, septadas, constrictas, tendo células de 5-25 × 4-6 μ. Fig. 2 — *a*.

Ascos subglobosos ou ovóides, 2 — tunicados, estiptados ou sésseis, 3-8 — esporos, 40-55 × 32-45 μ, aparafisados. Fig. 2 — *b*.

Ascosporos conglobados, oblongo-elipsóides, 1 — septados, constrictos, 25-34 × 12-15 μ, lisos, marron, raramente contínuos. Fig. 2 — *c*.

Sobre folhas de *Cestrum macrophyllum* Vent. San Pedro, Grécia, Costa Rica, associado também a *Asterina coriacella* Speg. H. Sydow, 10-1-925.

Ident. por A. Chaves Batista & M. L. Farr, 4-8-958. Espec. n.° 677, *ex* Sydow, Fungi exotici exsiccati, no Herb. Mus. Nat. Praga.

Acrodesmis cestri Syd.
in Ann. Mycol. XXIV: 424, 1926.

Micélio hipófilo, sem constituir máculas, superficial, densamente reticulado, sem hifopódios ou setas, tendo hifas irregularmente ramificadas e anastomosadas, Fig. 4 — *a*, marron, septadas, constrictas, e células de 7-50 × 5-7,5 μ. Corpos esclerociais de forma irregular ou subglobosos, Fig. 4 — *b*, marron-negros, 45-70 μ de diâmetro, e 20-40 μ de altura, formados por células subglobosas ou cilíndricas, 2-6 de diâmetro. Originam esses esclerócios um ou vários conidióforos, Fig. 4 — *c*, marron-negros, erectos, simples ou de ramificações apicais, septados, 200-800 μ de altura, 10-13 μ de diâmetro, e 7-10 μ de diâmetro apical; Ápice em fascículo de ramos, semelhante a *Penicillium*, destacando-se então ramos primários, de 12-25 μ de extensão, ramos secundários de 20 μ longos, e terciários, até 40 μ de extensão, estes de coloração esmaecida.

Conídios acrógenos, isolados, presos ao conidióforo por diminuta papila marron, isolados ou 2-3, no ápice de cada



Fig. 4 — **Acrodesmis** Syd.

a) Micélio; *b)* Esclerócio; *c)* Conidióforo; *d)* Conídios (orig.)

ramo, contínuos, subhialinos a oliváceos, oblongo-elipsóides ou fusóides, 6-18 × 3-5 μ. Fig. 4 — *d*.

Sobre folhas de *Cestrum macrophyllum* Vent. associado a *Allosoma cestri* Syd. e *Asterina coriacella* Speg. San Pedro--Grécia, Costa Rica, H. Sydow, 10-1-925.

Ident. por A. Chaves Batista & M. L. Farr, 4-8-958. Espec. n.° 677, *ex* Sydow, Fungi exotici exsiccati, no Herb. Mus. Nat. Praga.

Allosoma quercifoliae Bat. & Nasc. n. sp.

Micélio superficial, hipófilo, peliculoso, Fig. 5 — *a*, sub--hialino e oliváceo, de hifas sub-rectilíneas, densa e irregularmente ramificadas, septadas, constrictas, tendo células de 5,5-8,5 × 2-2,5 μ; hifopódios e setas ausentes.

Estromas superficiais ou atenuadamente estipitados, Fig. 5 — *b*, ástomos, globoso-aplanados, membranosos ou carnoso-gelatinosos, dispersos ou confluentes, marron-negros, 225-311 μ de diâmetro, 44-50 μ de altura; parede superior, 11-12 μ, áspera, formada por células irregulares, marron, 3,5-5,5 × 2,5-4,5 μ, tornando-se mucosa; parede basal, ténue, formada por células poligonais e arredondadas, sub-hialinas a marron-claras de 3,5-4,5 × 2,5-3,5 μ. Lóculos periteciais imersos, igualmente distribuídos num só plano, clavados ou elipsóides, 27-37 × 11-15 μ, monoascos. Fig. 5 — *c*.

Ascos clavados ou elipsóides, 2 — tunicados, 8 — esporos, sésseis ou curtamente estipitados, aparafisados, 24,5-36,5 × × 9,5-14,5 μ. Fig. 5 — *d*.

Ascosporos cilindro-clavados, 1 — septados, levemente constrictos, de células desiguais, polísticos, oliváceos, de 8,5-12,5 × 3-4,5 μ.

Sobre *Quercus laurifolia*, associado a *Ainsworthia xanthoxylii* Bat. & Costa, Green Gove Springs, Florida, Dr. Geo Martin, 1885. Tipo, 1359 sob a etiqueta de *Asterina erysiphoides* E. & M. no Herb. da Acad. of. Nat. Sci. Philadelphia Pa. U. S. A.

Idem, s/folhas de *Ilex glabra*. Newfield, N. J. June, 1882,



Fig. 5 — **Allosoma quercifoliae** Bat. & Nasc. n. sp.

a) Micélio superficial; *b)* Secção longitudinal do estroma; *c)* Vista aumentada de uma porção do estroma; *d)* Ascos e ascosporos.

n.º 1357, sob *Asterina ilicis*, Ellis, no Herb. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Pa. U. S. A.

Idem, s/folhas de *Andromeda ferruginea* Green Gove Springs, Florida, Dr. Geo Martin, Março, 1884, n.º 1361, sob *Asterina lepidigena* E. & M., no Herb. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Pa. U. S. A.

Mycelium hypophyllum, superficiale, pelliculosum, subhyalinum vel olivaceum, ex hyphis sub rectis, densis, irregulariter, ramosis, septatis, constrictis, ex cellulis 5,5-8,5 × 2-2,5 μ, haud hyphopodiatis, non setosis, compositum.

Stromata superficialia vel attenuata, stipitata, astoma, globoso-applanata, membranacea vel carnoso-gelatinosa, sparsa vel confluentia, atrobrunnea, 255-311 μ diam., 44-50 μ alt.; paries superior, 11-12 μ cr., rugosus, ex cellulis irregularibus, basalis, tenuis, ex cellulis polygonalibus et globosis, subhyalinis vel brunnescentibus 3,5-4,5 × 2,5-3,5 μ, efformatus.

Loculi ascigeri immersi, ellipsoidei vel clavati, 27-34 × 11-15 μ.

Asci clavati vel ellipsoidei, 2 — tunicati, 8 — spori, sessiles vel curtostipitati, 24,5-37 × 9,5-14,5 μ, aparaphysati.

Ascosporae cylindro-clavatae, 1 — septatae, constrictae, cellulis inaequalibus, olivaceae, 8,5-12,5 × 3-4,5 μ, socii Ainsworthiae xanthoxylii *Bat. & Costa. Green Cove Springs, Fla. Dr. Geo Martin, 1885. Typus, 1359, sub* Asterina erysiphoides *E. & M., in Herb. Acad. of Nat. Sci. Philadelphia, Pa. U. S. A.*

Ascomycetella quercina Peck.
in Bull. Torrey Club, p. 50, 1881.
Sin.: *Cookella quercina* (Peck) Peck.
in Syll. Fung. Vol. 8: 846, 1889.

Micélio livre ausente.

Estromas peritecígeros superficiais, hipófilos, hialinos, membrano-carnosos, de 380-550 × 270-450 μ suborbiculares, 88-110 μ de altura, irregulares, isolados ou confluentes; paredes estromáticas de 7,5-36,5 μ de altura, formadas por células subglobosas de 3,5-6 × 1,5-4,5 μ. Fig. 6.



Fig. 6 — **Ascomycetella quercina** Peck.

Secção longitudinal do estroma ascígero, asco e ascosporos (orig.)

Lóculos periteciais, monoascógenos, subglobosos, numerosos, desigualmente distribuídos, 35-40 × 35-36,5 μ.

Hipostroma haustorial hialino, sub-epidérmico, de 19-27 × × 22-33 μ, irregular, formado por células cilindráceas ou sub-globosas de 3,5-10 × 2-3,5 μ, ramificando-se escassamente em hifas hialinas, septadas, contendo células de 4,5-9 × 1,5-3,5 μ, e distribuídas de modo inter e intracelular, até atingir o mesófilo.

Arcos sub-globosos, 2 — tunicados, sésseis, aparafisados, 8 esporos de 30,5-39,5 × 30,5-37 μ.

Ascosporos cilindráceos, muriformes, hialinos a princípio, depois marron, 3 septos transversais e 1-2 longitudinais, constrictos, conglobados de 20-24,5 × 11-12 μ.

Sobre folhas de *Quercus tinctoria* Bartram. Cobden, Illinois, U. S. A. Leg. F. S. Earle, 20-10-1883. Espec. n.° 3040, ex Rabenhorst-Winter, Fungi europaei em The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, U. S. A.

Articularia quercina (Peck) von Höhnel.
in Frag. Zur Mykologie, F. v. Höhnel.
n.os 164-288: 135, 1909.

Colónias hipófilas, brancas, flocosas, isoladas ou confluentes, solitárias, Fig. 7, ou em associação com estromas de *Ascomycetella quercina* Peck, 0,3-0,5 mm de diâmetro.

Sinêmios cespitosos, efusos, hialinos, eretos ou decumbentes, de 220-330 μ de altura, formados por células hialinas, clavadas, de 11-15 × 3-5,5 μ, densamente unidas, em feixes de 12-16 × 18-30 μ, sustentando cada célula um grupo de 8 conídios.

Haustórios hialinos, enovelados, sub-epidérmicos, de 18,5-27 × 30-35 μ, irregulares, tendo células cilindráceo-irregulares, de 2,5-6,5 × 1,5-3 μ; dos haustórios continuam ramificações de hifas hialinas, septadas, contendo células de 4-8,5 × 2-3,5 μ, as quais se distribuem de modo inter e intracelular, alcançando o mesófilo.

Conídios fusóide-clavados, paralelos, hialinos, contínuos,



Fig. 7 — **Articularia quercina** (Peck) v. Höhnel

a) Sinêmio; *b)* Glomérulo conidial; *c)* Secção tranversal de glomérulo conidial; *d)* Conídios isolados (orig.)

de epispório distinto, em número de 8, compactamente unidos num corpo elipsóide de 13,5-18 × 9,5-12 μ; isoladamente, os conídios têm de 11-17 × 2,5-3 μ.

Sobre folhas de *Quercus tinctoria* Bartr. Cobden, Illinois, Leg. F. S. Earle, 20-10-1883, ex Rabenhorst-Winter, Fungi europaei, n.° 3040, cedido pela The Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

Observações: — Este fungo fôra descrito, por Peck, como representativo do estádio conidial de *Ascomycetella quercina* Peck; (Bull. Torrey Club, 8:49-51, 1881); v. Höhnel, admitindo o mesmo conceito de Peck, criou para esse fungo, contudo, o género *Articularia,* nominando-o como *A. quercina.*

Arnaud, G. (Les Asterinées. Ann. Sci. Nat. X, 7:643-722, 1925) reconheceu *Articularia* e *Articulariella* v. Höhn., como fungos autónomos, sem relações filogenéticas com alguma forma ascógena.

Charles, V. K. (Mycologia, 27:74-82, 1935), estudando *A. quercina* var. *minor* Charles sobre *Hicoria illinoensis,* admitiu o tratamento independente desse fungo, de vez que inexistem provas de suas relações genéticas com *Ascomycetella.*

Aceitamos, de nossa parte, o ponto de vista de Arnaud e de Charles, e assim consideramos *A. quercina* (Peck) v. Höhn., distinto de *Ascomycetella,* pois o encontramos também não associado a essas formas ascógenas.

Dictyonella erysiphoides (Rehm) v. Höhn.
in Frag. Myk. n.° 242, p. 95, 1909.
Sin.: *Cookella erysiphoides* Rehm. Hedwigia, 169, 1901.

Colónias hipófilas, semi-circulares a irregulares, 15-22 mm., marron-negras.

Subículo superficial, de micélio septado, ramificado, formado por hifas levemente onduladas, marron, desprovido de telemorfismo e hifopódios, não setoso, tendo células de 5-18 × 2,5-3,5 μ.



Fig. 8 — **Dictyonella erysiphoides** (Rehm) v. Höhnel

a) Ascoma sob secção longitudinal; *b)* Asco e ascosporo; *c)* Conidióforo e conídios
(orig.)

Conidióforos de *Acrotheca,* simples ou ramificados, erectos, oliváceos a marron-claros, septados, 78,5-115 × 2,5-5 μ.

Conídios acrógenos, marron-claros, cilindráceos, contínuos, 5-6 × 2-3 μ.

Ascomas superficiais, marron-negros, hemisféricos ou sub-globosos, carnosos, moles, 60-160 μ de diâmetro, 50-140 μ de altura.

Excípula parenquimática, marron.

Contexto prosenquimático, translúcido, destacando-se células irregulares, de 3,5-4,5 × 2-4 μ.

Hipotécio compondo um pé central, epidermal, marron, 29,5-56 μ de altura, 49-68 μ de diâmetro, formado por células irregulares de 6-12 × 5-10 μ.

Micélio interno de hifas septadas, ramificadas, marron, tendo células de 5-12 × 2,5-3,5 μ.

Ascos 2 tunicados, elipsóides, obovóides a sub-globosos, 8 esporos, sésseis, aparafisados, 30-51,5 × 22-32 μ.

Ascosporos oliváceos a marron-claros, elipsóides, levemente constrictos, 3 septos transversais, 1 septo longitudinal, pólos rotundos, 17-22 × 7-11 μ. Fig. 8.

Sobre folhas de *Coccoloba uvifera* (L) Jacq., associado a *Lembosia coccolobae,* Earle, Guanajibo, Puerto Rico. F. L. Stevens, 19-6-915. Espec. n.° 14106, Instituto de Micologia, Univ. do Recife, e em The National Fungus Collections, U. S. A.,

Obs.: — O fungo em tela é um dos mais interessantes que temos estudado entre os Myriangiales, alcançando alta significação, por haver sido assinalado, agora, em consonância com a redescrição de v. Höhnel (loc. cit.). Confirma-se assim, a validade dessa espécie.

Myriangiomyces n. gen. Bat.

Tipo: **M. Quercifoliae** Bat. & Nasc. n. sp.

Micélio superficial, ténue, hialino, sem setas ou hifopódios.

Ascostromas superficiais, sub-globosos, ástomos, mem-

brano-gelatinosos; contexto plectenquimático homogéneo, marron-claro, inteiramente fértil.

Ascos em diferentes planos, numerosos, octosporos, aparafisados.

Ascosporos muriformes, hialinos.

Typus: M. Quercifoliae *Bat. & Nasc. n. sp.*

Mycelium superficiale, tenue, hyalinum, non setosum, haud hyphopodiatum.

Ascostromata superficialia, subglobosa, astoma, mollia, membrano-gelatinosa; contextu plectenchymatico, totaliter fertili.

Asci irregulariter dispositi, numerosi, 8-sporos habentes, aparaphysati.

Ascosporae muriformes, hyalinae.

Obs.: — Distingue-se de **Ascomycetella** Peck porque **Ascomycetella** possue esporos corados.

Myriangiomyces quercifoliae Bat. & Nasc. n. sp.

Micélio superficial, hialino, septado, não constricto, de ramificações irregulares, escasso, apresentando hifas de 1,5-2 μ de diâmetro.

Ascostromas superficiais, sub-globosos, marron, de 99-126,5 μ de diâmetro, membrano-gelatinosos, moles, isolados, raros confluentes, ástomos; paredes de 8,5-12 μ de espessura, ásperas, formadas por células poligonais de 3,5-5,5$\times$3-5 μ. Lojas ascígeras numerosas, sub-globosas, irregularmente distribuídas, de 35-39$\times$27-37 μ, monascos; contexto plectenquimático, marron-claro, homogéneo, todo fértil. Fig. 9.

Ascos ovóides a sub-globosos, 2-tunicados, sésseis, aparafisados, 8 esporos, 29-36$\times$26-35 μ.

Ascosporos cilindráceo-ovóides, hialinos, 4-6 septos transversais e 1 septo longitudinal, levemente constrictos, polísticos, 19-21$\times$8-9 μ.



Fig. 9 — **Myriangiomyces quercifoliae** Bat. & Nasc.

Secção longitudinal do ascostroma, asco e ascosporo

S/folhas de *Quercus virentis* — Dairen-Georgia, Florida. H. W. Ravenel, n.º 326. Tipo, no Herb. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, U. S. A., sob o nome de *Saccardia quercina* Cke.

Mycelium superficiale, hyalinum, septatum, non constrictum, cum ramificationibus irregularibus, praeparcum, hyphas 1,5-2 μ diam., manifestans.

Ascostromata superficialia, subglobosa, brunnea, 99-126,5 μ diam., membrano-gelatinosa, tenera, singularia, confluentia, astoma; parietes 8,5-12 μ crassitudinis, asperi, ex cellulis polygonalibus 3,5-5,5 × 3-5 μ, efformati. Tabernulae ascigerae numerosae, subglobosae, irregulariter dispertitae, 35-39 × 27-37 μ, monascae; contextu plectenchymatico, brunneo-claro, homogeneo, totaliter fertili gaudet.

Asci ovoidei vel sub-globosi, 2 — tunicati, sessiles, aparaphysati, 8 — sporos continentes, 29-36 × 26-35 μ.

Ascosporae cylindraceo-ovoideae, hyalinae, cum 4-6 septis transversalibus atque uno longitudinali, leviter constrictae, polystichae, 19-21 × 8-9 μ.

In foliis Quercus virentis -- *Dairen-Georgiae, Floridae — H. W. Ravenel, n.º 326. Tipus in Herb. Acad. Nat. Sci., Philadelphiae, U. S. A., sub* Saccardiae quercinae *Cke. nomine.*

ABSTRACT

Several species of ancient Myriangiaceae are revised in this paper being confirmed their original diagnosis; the illustrations that follows each description document our points of view.

Also are proposed a new species *Allosoma quercifoliae* nobis, on *Quercus laurifolia*, and a new genus — *Myriangiomyces* Bat. with *M. quercifoliae* nobis as type, on *Quercus virentis*. This new genus is quite similar to *Ascomycetella* Peck but possess hyaline ascospores.

Separata da Revista **BROTÉRIA**
Série de Ciências Naturais
Volume XXVII (LIV) Número 4
LISBOA ═══ 1958

Comp. e Imp.: CENTRO GRAFICO
Vila Nova de Famalicão — 1958

1959

INSTITUTO DE MICOLOGIA — UNIVERSIDADE DO RECIFE

PUBLICAÇÃO N.º 153

NOVAS E ANTIGAS ESPÉCIES DE FUNGOS *MORENOELLA* Speg.

A. CHAVES BATISTA

E

H. DA SILVA MAIA

1959

28 MAR 1961

NOVAS E ANTIGAS ESPÉCIES DE FUNGOS
MORENOELLA Speg.

A. CHAVES BATISTA

E

H. DA SILVA MAIA

O género *Morenoella* Speg. cuja validade reconhecemos por sua perfeita diferenciação de *Lembosia* Lév., em virtude de suas frutificações apresentarem ascos aparafisados, tem sido objecto de nossos estudos nos trabalhos de revisão da família *Asterinaceae,* que estamos efectuando.

Agora, porém, limitamo-nos à descrição de algumas novas espécies desse género: *M. killianii,* nobis, sobre *Bredmeyera, M. pentacmeae,* nobis, sobre *Pentacme contorta* e *M. vitalii,* nobis, sobre *Ocotea sp.* São igualmente, redescritos e ilustrados: *M. portoricensis* Speg e *M. whetzelii* Toro.

Morenoella killianii Batista & Maia, n. sp.

(Em homenagem ao micólogo francês Prof. Charles Killian, falecido no Recife em 26.1.1957).

Plágulas epífilas, circulares, isoladas ou confluentes, de cor marron-violácea, 10-15 mm de diam. Micélio superficial marron-claro, não setoso, rectilíneo, hifopodiado, telemórfico, ramificado em ângulos de 45°, alterna e unilateralmente, tendo células de 13,5-27 × 2,5-3 μ. Hifopódios laterais, unicelulares, esparsos, nodulares a capitados, mais escuros do que o micélio, com 5,5-8 × 3-7 μ (Fig. 1 — *a*). Micélio interno hialino, septado, ramificado, produzindo haustórios de forma clavada, Fig. 3, no mesófilo, com 2,5-3,5 μ larg. Ascostromas lineares ou na forma das letras V, T ou Y (Fig. 2), marron-negros, superficiais, 460-1135 × 97-120 μ e 20-27,5 μ alt.; parede superior negra, 8-10 μ de espessura, compacta; parede

inferior indistinta. Dehiscência em fenda longitudinal com 6 5-9,5 μ larg.; bordos franjados, radiantes, com células de 3,5-5 μ larg. Ascos elipsóides a sub-clavados, 2-tunicados, 8 esporos, sésseis, 24-30 × 10-13,5 μ, aparafisados. Ascosporos marron-claros, sub-cilindráceos ou oblongos, 1-septados, pouco constrictos, polísticos, 9,5-10 × 5,5-7 μ (Fig. 1 — *b*).



Fig. 1 — **Morenoella killianii** Batista & Maia n. sp.

a) Micélio hifopodiado;

b) Asco e ascosporo. Orig.

Sobre folhas de *Bredmeyera* sp. associado a *Peltasterella ocoteae* Bat. & Maia – Caruaru. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 1.2.957. Tipo 6027, Instituto de Micologia, Universidade do Recife.

Plagulae epiphyllae, rotundatae, brunneo-violaceae, 10-15 mm diam., simplices vel confluentes. Mycelium superficiale, brunnescens, non setosum, hyphopodiatum, ex hyphis rectilineis, alternatim et unilateraliter ramosis (45°), septatis,



Fig 2 — **Morenoella killianii** Batista & Maia n. sp.

a) Ascostromas lineares;

b) Ascostromas em Y.



Fig. 3 — **Morenoella killianii** Batista & Maia n. sp.

Ascostroma sob corte longitudinal

ex cellulis 13,5-27 × 2,5-3 μ, compositum. Hyphopodia lateralia, unicellularia, sparsa, nodulata vel capitata, brunnea, 5,5-8 × × 3-7 μ. Mycelium internum, septatum, ramosum, cum haustoriis usque ad mesophyllum, clavatis, 2,5-3,5 μ diam. Ascostromata linearia vel tanquam V, T, Y, atro-brunnea, superficialia, 460-1135 × 97-120 μ et 20-27,5 μ alt. compacta, stellatim, dehiscentia, cum marginibus fimbriatis, radiatis, ex cellulis 3,5-5 μ diam.; paries superior 8-10 μ cr; paries basalis indistinctus. Asci ellipsoidei vel subclavati, 2-tunicati, sessiles, 8 spori, 24-30 × 10-13,5 μ apar aphysati. Ascosporae cylindraceae vel oblongae, 1-septatae, parum constrictae, brunnescentes, conglobatae, 9,5-10 × 5,5-7 μ. — In foliis Bredmeyerae *sp. socius* Peltasterellae ocoteae *nobis. Caruarú. Leg. Dr. Epaminondas de Barros Correia, 1.2 957. Typus 6027, Instituto de Micologia, Universidade do Recife, Prov. Pernambuco, Brasil, Amer. Austr.*

Morenoella pentacmeae Batista & Maia n. sp.

Plágulas hipófilas, marron-negras carbonáceas, sub-circulares de 4-5 mm de diam. quando isoladas, mas também efusas.

Micélio marron-negro, septado, escassamente hifopodiado, telemórfico, ramificado oposta, alterna e unilateralmente, em ângulos de 45°, com células de 19-40 × 5-10 μ larg.; hifopódios com ápice clavado, 1-5 lobados mais claros do que as demais células, de 13,5-16 — 8-11 μ larg. (Fig. 4 — *a*).

Haustórios inobservados.

Ascostromas isolados (Fig. 5), ou confluentes, marron escuros, carbonáceos, elipsóides ou lineares, 485-607 × 242-485 μ larg.; dehiscência em rima longitudinal, irregular; parede superior formada por células rectangulares, radialmente dispostas, 5-10 × 3-5 μ; bordos fimbriados, de hifas não hifopodiadas, tendo células de 13,5-35 × 3-5 μ larg.; parede basal inconspícua.

Ascos evanescentes à maturidade. Paráfises ausentes.

Ascosporos oblongos marron-escuros, 1-septados, constrictos, levemente espinescentes ou lisos, 32-40 × 16-19 μ. (Fig. 4 — *b*).



Fig. 4 — **Morenoella pentacmeae** Batista & Maia n. sp.

a) Micélio hifopodiado, tendo hifas de célula apical lobada;

b) Ascosporos.

Sobre folhas de *Pentacme contorta*, parasitado por *Dimerium oblongum* Syd. Prov. Bataan, Luzon, Balanga, Filipinas. Leg. M. S. Clemens, V-1923. Tipo, n.° 1419, F. Petrak, Mycotheca Generalis.

Plagulae hypophyllae, atro-brunneae, carbonaceae, simplices, 4-5 mm diam. vel effusae.

Mycelium atro-brunneum ex hyphis septatis, opposite, alternatim vel unilateraliter ramosum ex cellulis 19-40 × 5-10 μ apices hypharum clavati 1-5 lobati, brunnescentes, 13,5-16 × × 8-11 μ. Haustoria non visa.

Fig. 5 — **Morenoella pentacmeae** Batista & Maia n. sp.

Ascostromas

Ascostromata atro-brunnea, carbonacea, ellipsoidea vel linearia, 485-607 × 242-485 μ, isolata vel non, cum rima longitudinali vel irregulari; paries superior ex cellulis rectangularibus radialiter dispositis, 5-10 × 3-5 μ; margines fimbriatae ex hyphis non hyphopodiatis, ex cellulis 13,5-35 × 3-5 μ; paries basalis inconspicuus. Asci evanescentes. Paraphyses nullae. Ascosporae oblongae, atro-brunneae, 1-septatae, constrictae. leves vel spinescentes, 32-40 × 16-19 μ.

In foliis Pentacmei contortae, *socius* Dimerii oblongi *Syd. Bataan, Luzon, Balanga, Philipp. Leg. M. S. Clemens, V-1923. Typus, n.° 1419, F. Petrak Mycotheca Generalis, in Magyar Nemzetii Muzeum.*

Morenoella portoricensis Speg.

in Bol. Acad. Nac. Cien. Cordoba, 26: 343, 1922.
Mycologia, XVI: 193, 1924.
N. Y. Acad. Sci. VIII: 24, 1926.

Colônias epífilas, efusas, marron-negras.

Micélio superficial, septado, marron-claro, sem setas; hifas ramificadas de modo oposto, formando ângulos de 45° a 90°, e, constituídas por células de 12-19,5 × 3,5-5 μ.

Hifopódios conóides, direitos ou recurvados, marron-claros, contínuos, 11-13,5 × 5-7 μ (Fig. 6 — *b*).

Ascostromas superficiais, marron-negros, lineares 250--800 × 144-200 μ, ástomos, abrindo-se à maturidade em fenda longitudinal de 5-41,5 μ de diam.; parede superior formada por células indistintas; bordos franjados, tendo células de 7-12 × 2,5-5 μ, parede basal tênue, subhialina (Fig. 6 — *a*).

Ascos ovóide-subglobosos, 2-tunicados, sésseis, aparafisados, 24,5-32 × 19,5-22 μ.

Ascosporos oblongos, 1-septados, levemente constrictos, marron, 19,5-22 × 6-8,5 μ (Fig. 6 — *c*).

Associado a picnídios escutelares, radiados, imaturos.

Sobre *Ocotea leucoxylon* (Sw) Mez.

Yanco, Finca Maria, H. H. Whetzel, F. D. Kern, R. A. Tor , 18-6-924 — Porto Rico, Espec. n.° 2508, no Herb. de The Pennsylvania State College.

Obs.: — Os ascos e os ascosporos apresentam-se de maiores proporções, nesse espécimen.

Morenoella vitalii Batista & Maia n. sp.

Plágulas hipófilas, marron-negras, efusas. *Micélio* de hifas marron, sub-rectilíneas ou sinuosas, septadas, com células de 11-17 × 2-3 μ, telemórficas, crucialmente ramificadas, compondo frouxo retículo. *Hifopódios* laterais, alternos ou unilaterais, cilindráceos ou lageniformes, unicelulares 6,5-10,5 × × 2-3,5 μ. *Ascostromas* dispersos, elípticos, 225-370 × 60-125 μ



Fig. 6 — **Morenoella portoricensis** Speg.

a) Secção longitudinal de ascostroma;

b) Micélio hifopodiado;

c) Asco e ascosporos. Orig.

de fenda longitudinal, 18,5-36,5 μ de diam., marron-negros e bordos franjados; parede superior carbonácea, constituída por células poliédricas, 3-7,5 × 2-4,5 μ, radialmente dispostas; parede basal indistinta. *Ascos* numeroros, subglobosos ou ovóides, 4-8-esporos, sésseis, 13,5-17,5 × 7,5-12,5 μ, aparafisados. *Ascosporos* paralelos ou conglobados, cilindráceos ou oblongos, 1-septados, constrictos, de células desiguais, marron, de epispório liso, 7-12 × 3,5-4,5 μ (Fig. 7).

Sobre folhas vivas de *Ocotea* sp. associado a *Peltasterella ocoteae*, nobis. Dois Irmãos, Recife, 1.11.55. Leg. Osvaldo S ARES DA SILVA. Tipo 5016, Instituto de Micologia, Universidade do Recife.

O epíteto específico é dado em homenagem ao micólogo Dr. A. FERNANDES VITAL.

Sobre *Ocotea* sp. têm sido assinalados *M. portoricensis* Speg. e *Morenoella phillipsii* Doidge, que diferem de nossa espécie pelo tamanho bem maior dos ascos e ascosporos.

Plagulae hypophyllae, atro-brunneae, effusae. Mycelium ex hyphis brunneis, subrectis vel sinuosis, septatis, ex cellulis 11-17 × 2-3 μ, crucialiter ramosis, laxe reticulatis compositum. Hyphopodia lateralia, alternata vel unilateralia, cylindracea vel lageniformia, unicellularia, 6,5-10,5 × 2-3,5 μ. Ascostromata sparsa vel dense dispersa, elliptica, 225-370 × 60-125 μ, longitudinaliter dehiscentia cum rima 18,5-36,5 μ diam., atro-brunnea et marginibus fimbriatis; paries superior carbonaceus, ex cellulis longitudinaliter dispositis, polyedricis, 3-7,5 × × 2-4,5 μ; paries basalis non visus. Asci numerosi, subglobosi vel ovoidei, 4-8-spori, sessiles, 13,5-17,5 × 7,5-12,5 μ, aparaphysati. Sporae parallelae vel conglobatae, cylindraceae vel oblongae, 1-septatae, constrictae, cellulae inaequalibus, brunneae, 7-12 × 3,5-4,5 μ. In foliis vivis Ocotea *sp. socius* Peltasterellae ocoteae *nobis. Dois Irmãos, Recife. Leg. Osvaldo Soares da Silva, 1.11.55. Typus 5016, Instituto de Micologia, Universidade do Recife, Prov. Pernambuco, Brasil, Amer. Austr. — In honorem mycologi Dr. A. Fernandes Vital. — Affinis* M. portoricensis *Speg. et* M. phillipsii *Doidge, sed ab eis ascis et sporis distinctus.*



Fig. 7 — **Morenoella vitalii** Batista & Maia n. sp.

a) Ascos e ascosporos;

b) Ascostroma longitudinalmente fendilhado;

c) Micélio e hifopódios. Orig.

Morenoella whetzelii Toro
in Mycologia, XVII: 134, 1925.

Colônias epífilas, superficiais, ovóides, de 4-5 mm isoladas.

Micélio livre marron, superficial, septado, sem setas, hifopodiado, de hifas rectilíneas, formadas por células de



Fig. 8 — **Morenoella whetzelii** Toro

a) Micélio hifopodiado;

b) Asco e ascosporos. Orig.

18-27 × 4,5-6 μ, não constrictos; ramificações opostas, raramente unilaterais, em ângulos de 45°, raramente de 90°.

Hifopódios unicelulares, multilobados, alternos ou unilaterais, de 8,5-15 × 11-13,5 μ (Fig. 8 — *a*).

Ascostromas lineares, marron-negros, membranosos, abrindo em fenda longitudinal (Fig. 9), isolados ou confluentes de 150-35 × 88-140 μ, bordos direitos, continuando com o micélio; parede superior sub-parenquimática, de células rectangulares, radialmente dispostas, 5,5-11 × 2,5-5,5 μ.

Ascos clavados, 2-tunicados, sésseis, aparafisados, 8-esporos, 34,5-49 × 28-34 μ (Fig. 8 — *b*).

Ascosporos, hialinos a princípio, depois marrons, oblongos, 1-septados, constrictos, conglobados, de epispório espinescente de 21-24 × 7-10 μ.



Fig 9 — **Morenoella whetzelii** Toro

Sobre folhas de *Securidaca volubilis* L. Guaynabo, Porto Rico. H. Whetzel, F. D. Kern & R. A. Toro, Tipo, 2483, Explorations of Porto Rico, no Herb. de The Pennsylv. Sta. Univ.

ABSTRACT

The genus *Morenoella* Speg. is accepted by the A.A. as good in relation to *Lembosia* Lév. since their asci are not paraphysate. The following new species are described:

M. killianii, nobis, on *Bredmeyera*, *M. pentacmeae*, nobis, on *Penctame contorta* and *M. vitalii*, nobis, on *Ocotea sp.* Also are redescribed *M. portoricensis* Speg and *M. whetzelii* Toro.

Separata da Revista **BROTÉRIA**
Série de Ciências Naturais
Volume XXVIII (LV) Número 1
LISBOA 1959

Comp. e Imp.: CENTRO GRAFICO
Vila Nova de Famalicão — 1959

1959

INSTITUTO DE MICOLOGIA — UNIVERSIDADE DO RECIFE

PUBLICAÇÃO N.º 154

REVISÃO ANALÍTICA DE UM GRUPO DE FUNGOS IMPERFEITOS

A. CHAVES BATISTA

E

E. A. F. DA MATTA

1959

/5

REVISÃO ANALÍTICA DE UM GRUPO DE FUNGOS IMPERFEITOS

A. CHAVES BATISTA

E

E. A. F. DA MATTA

O presente trabalho condensa os resultados da revisão de especímens de fungos da mais variada procedência cuja identificação frequentemente não correspondeu às determinações que originalmente haviam sido feitas.

Nele incluímos também a descrição de novas espécies de *Acarella, Sirodomus* e *Triposporium.*

Acarella pernambucensis Bat. n. sp.

Micélio livre ausente.

Picnostromas epifilos, superficiais, isolados, marron-claros, escutelar-orbiculares, 100-156 μ de diâmetro, 35-50 μ alt., membranosos, glabros; parede superior radiada irregularmente, formada por hifas septadas de 1-2 μ de diâmetro (Fig. 1 — *a*); ostíolo central ou irregular, 8-13,5 μ de diam.; bordos peliculosos; himênio basal, sobre tênue parede hialina.

Picnidióforos longos, hialinos, septados, constrictos, 22-46 × 1-1,5 μ tendo células de 2,5-4 μ de extensão (Fig. 1 — *b*).

Picnidiosporos hialinos, cilindráceos ou bacilares, contínuos, 4-6,5 × 0,5-2 μ de iserção lateral, nos conidióforos (Fig. 1 — *c*).

Sobre folhas de hospedeiro não identificado, em associação com *Meliola caxangaensis* Bat. Caxangá — Recife — Regina M. Rocha Batista, 20/6/958. Tipo, 14285, Instituto de Micologia — Univ. do Recife.

Mycelio libero nullo.

Pycnostromata epiphylla, superficialia, brunnescentia, scutato-orbiculata, 100-156 μ diam., 35-50 μ alt. membranosa, glabrata; paries superior irregulariter radiatus, ex hyphis septatis, 1-2 μ cr.; ostiolo rotundo vel irregulari, 8-13,5 μ diam.; marginibus integris; paries basalis tenuis, cum hymenio infero.

Fig. 1 — **Acarella Pernambucensis** Bat. n. sp.

a) Sector do picnostroma;
b) Picnidióforo;
c) Picnidiosporos.

Pycnidiophoris filiformibus, septatis, constrictis, hyalinis, 22-46 × 1-1,5 μ, ex cellulis 2,5-4 μ longis.

Pycnidiosporae cylindricae vel bacillariae, continuae, hyalinae, in conidiophoris lateraliter insertae, 4-6,5 × 0,5-2 μ.

In foliis plantae ignotae. Caxangá — Recife — Regina M. Rocha Batista, Typus, 14285, Instituto de Micologia, Univ. do Recife, socii Meliola caxangaensis *Bat. n. sp.*

Actinonema rosae (Lib) Fries
in S. V. Sc. p. 424.
Syll. Fung. III: 408, 1884.
Sin.: *Asteroma rosae* Lib.
in Ann. Soc. Linn. 1826.
Asteroma radiosum Fr. Ell. II: 151.

Colônias marron-negras a violáceas, epífilas, circulares de 3-12 mm de diâmetro.

Acérvulos marron-claros, sub-cuticulares, isolados ou confluentes, epífilos, 93,5-231 μ de diam., 34-56 μ de altura; parede basal sub-parenquimática, 7-12 μ de altura, formada por células sub-globosas de 6-10 × 5-7,5 μ.



Fig. 2 — **Actinonema rosae** (Lib.) Fries
Acérvulo.

Micélio epidermal.

Conídios cilindráceos, encurvados, ou fusóides, hialinos, 1-septados, constrictos, 12-7 × 5-6 μ, sésseis (Fig. 2).

Sobre folhas de *Rosa sp.* Mill Creek, Washington. G. L. Zundel, 10-7-920. Esp. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, U. S. A.

Ceratophoma rostrata (Fuck.) v. Hohnel
in Hedwigia, 59: 277, 1917.

Micélio imerso, sub-hialino, formado por hifas, septadas, constrictas, tendo células cilindráceas, de 65-11 × 3-5,5 μ.

Picnídios imersos, globosos, longo-rostrados, isolados, marron-negros membranosos, 193-220 μ de diam.; paredes sub-parenquimáticas, 13-22 μ de espessura, constituída por células poligonais, de 5,5-11 × 4,5-9 μ (Fig. 3).

Picnidióforos hialinos, contínuos, cilindráceos, de 6,5-7 × × 1,5-2 μ.

Picnidiosporos ovóides, hialinos, contínuos, acrógenos, 3-5,5 × 1-2 μ.

Sobre caule de *Iva xanthifolia* — Denver — Color.

Prof. E. Bethel, Set. 1896. Espec. n.° 3543, sob *Asteroma javaecolum* E. & E. no Rijksherbarium, de Leiden. (Ex Ellis & Everhart, North American Fungi).



Fig. 3 — **Ceratophoma rostrata** (Fuck) v. Hohnel
Picnídio e picnidiosporos.

Helminthosporium atro-olivaceum Cooke & Hark. *in* Syll. Fung. 4; 409, 1824.

Micélio marron-claro, septado, ramificado alternadamente em ângulos de 45°, hifas flexuosas, tendo células de 21-29 × × 3-4 μ, sem setas ou hifopódios.

Conidióforos rectilíneos, marron-escuros, septados, não ramificados, de ápice descorado, 91-108 × 2,5-4 μ.

Conídios clavados, marron, 4-5 septados lisos, geralmente apicais, agrupados, 20-27 × 7,5-11 μ (Fig. 4).

Sobre *Microthyrium culmigenum* em colmo de *Calamogrostis lanceolata* — Brandenburg — Spec. leg. por H. Sydow, em 12/8/918 e det. por A. Chaves Baptista & H. Maia, 3-7-958, pertencente ao Mus. Bot. da Univ. de Zurich.

Fig. 4 — **Helminthosporum atro-olivaceum** Cooke & Hark.

Hendersonia circinans Sacc.
in Syll. Fung. III: 431, 1884.

Micélio superficial ausente.

Micélio intramatrical distribuído intercelularmente, oliváceo a marron-escuro, septado, tendo hifas de 2,5 μ de diam.

Fig. 5 — **Hendersonia circinans** Sacc.
Picnídio e picnidiosporos. Orig.

Picnídios isolados, imerso-irrumpentes, globosos a sub-globosos, carbonáceos, de superfície rugosa, ástomos, 148-216 μ

de diam., marron-negros; paredes de 19-27 μ de diam., formadas por células poligonais ou sub-rectangulares, 4-5 × 2,5-4 μ (Fig. 5).

Conidióforos hialinos, cilindráceos, curtos, simples, sustentando um único esporo, 3-5 μ de diam.

Picnidiósporos oblongo-ovóides, marron-claros a violáceos, a princípio contínuos, depois 3-septados, às vezes ligeiramente recurvados, com pólos arredondados; célula do polo de inserção no conidióforo menos colorida, 27-32,5 × 11-13,5 μ.

Sobre caule de *Arundinaria* Louisiana Herbarium of Geo Martin, n.º 1019, classificado como *Micropeltis erumpens* B. & C. no Herb. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, U. S. A.

Det. A. Chaves Batista e E. A. F. da Matta, 17-8-958.

Leptostroma musicolum Fl. Tassi
in Syll. Fung. 18: 428, 1906.

Micélio interno oliváceo a marron-claro, escasso, septado, constricto de células de 2,5-3 μ de diam.



Fig. 6 — **Leptostroma musicolum** Fl. Tassi
Picnostroma.

Picnostromas sub-epidérmicos, lentiformes ou hemisféricos, agregados ou isolados, 247,5-330 μ de diam., 68,5-73,5 μ de altura, ástomos, depois dehiscentes por fenda longitudinal,

marron-negros, glabros, membranosos; paredes sub-parenquimáticas, 9,5-19-5 μ de espessura na região basal, tornando-se muito ténue na região superior, onde medem 3,5 μ de espessura; células parietais poligonais ou irregulares de 3,5-6,5 × × 2-4,5 μ (Fig. 6).

Picnidióforos hialinos, lageniformes, direitos ou encurvados, contínuos ou 1-septados, simples, revestindo toda a parede basal, 8,5-12 × 1,2-1,6 μ.

Picnidiosporos hialinos, ovóides, contínuos, gutulados, numerosos, acrógenos, solitários, 2-3 × 1-1,5 μ.

Sobre folhas de *Pyrus communis* Espec. n.° 354, ex Herb. Hasskarl sob *Asteroma geographica* Fries e n.° 495, ex Desmazieres, também sob *Asteroma geographica* Fries, no Rijksherbarium, de Leiden.

Macrophoma cylindrospora Berl & Vogl. var. *Arbuti* Grove.

in British Stem and leaf fung. — Grove: 123, 1935.

Micélio intramatrical, de hifas marron, septadas, constrictas, e células de 10-30 × 5-12 μ, de distribuição intra e



Fig. 7 — **Macrophoma cylindrophora** Berl. & Vogl. var. *arbuti* Grove.
Picnídio e picnidiosporos. Orig.

intercelular, penetrando no mesófilo e alcançando a epiderme inferior.

Picnídios anfígenos, imerso-irrumpentes, gregários, sub-globosos, glabros, marron-negros, de 95-350 μ de diam., coriáceo-carbonáceos, ostiolados; paredes sub-parenquimáticas, de 11-40,5 μ de espessura, formadas por células poligonais e arredondadas,, de 4,5-12 × 2,5-9 μ (Fig. 7).

Picnidióforos hialinos, 1-septados, simples, acrógenos, 7,5-12 × 2,5-4 μ.

Picnidiosporos hialinos, cilindráceos, rectos ou levemente encurvados, contínuos, lisos, de ápice obtuso ou ligeiramente acuminados, 16-21,5 × 2,5-3,5 μ.

Sobre folhas de *Cerasus carolinianus* — Aiken, Carolina do Sul. H. W. Ravenel, Dez. 1880. Espec. n.° 2197, ex de Thumen, Mycotheca Universalis, sob *Asteroma cerasi* Cooke, no Rijksherbarium, de Leiden.

Metadiplodia acerina (Lév.) Zambetakis
in Bul. Trim. Soc. Mycol. France, LXX, fasc. 3: 281, 1954.
Sin.: *Diplodia opuntiae* Sacc.
in Syll. Fung. III: 344, 884.

Picnídios imerso-irrumpentes, grupados ou separados, sub-globosos, de ostíolo central, papilado de 10-12 μ de diam., marron-negros, carbonáceos de 145-275 μ de altura, 165-265 μ de diam., glabros; paredes rugosas, de 22-30 μ de diam. (Fig. 8), formadas por 2-5 camadas de células poligonais, 5,5-14 × 4,5-12 μ; na região basal alongam-se numa pseudo coluna, 24,5-40 μ de diam. e 50-85,5 μ de extensão a qual penetra a epiderme e termina em conexão com hifas do micélio interno, marron, septadas, ramificadas, com células de 13-30 × 3,5-6,5 μ, constrictas, de distribuição intercelular; himênio basal produzindo picnidióforos cilindráceos, contínuos, hialinos, 5-10 × × 1-2 μ.

Picnidiosporos elipsoides ou oblongos, a princípio contínuos, hialinos, depois marron e 1-septados, constrictos, 17,5-22 × 9-12 μ.

Sobre cladódios de *Opuntia vulgaris* Delaware, Junho 1885. Espec. da Acad. Nat. Sci. Fhiladelphia, ex Herb. Albert Commons.



Fig. 8 — **Metadiplodia acerina** (Sacc.) Zambetakis



Fig. 9 — **Microdiplodia microspora** (Ott.) Alesch.

Microdiplodia microspora (Ott.) Allesch.

in Bull. Trim. Soc. Mycol. France, LXX, fasc. 3: 248, 1954.

Micélio sub-hialino, septado, constricto, de células de 4,5-16,5 × 2,5-3,5 μ, desenvolvendo-se intra e intercelularmente.

Picnídios marron-claros, globosos depressos, glabros, imerso-irrumpentes, de 79-80 μ de altura; 83-200 μ de diam.; ostíolo central, circular, de 4,5-12 μ de diam., membranosos, gregários, de paredes sub-parenquimáticas, formadas por células poligonais distintas, de 3,5-10 × 2-6,5 μ (Fig. 9).

Picnidióforos ausentes.

Picnidiosporos elipsóides, oliváceos a marron-claros, 1-septados, levemente constrictos, de 7,5-12 × 3,5-5 μ.

Sobre frutos de *Colutea arborescens* — Garoune — Leg. Nerac, 1878. Espec n.º 137, ex C. Roumeguère Fungi Selecti/ Galliaei Exsiccati, sob *Asteroma delicatulum*, no Rijksherbarium de Leiden.

Phoma galactis Cooke

in British Stem-and Leaf-Fungi: 84, 1935.

Máculas epífilas, semi-circulares ou irregulares, marron-negras, isoladas ou confluentes, tornando-se efusas, de 5-9 mm. de diam.

Micélio intramatrical, hialino, septado, constricto, intra e intercelular, de células 5,5-12 × 5-6,5 μ.

Picnídios gregários, sub-globosos, marron-negros, brilhantes, imerso-irrumpentes, de 70-80 μ de diam., ostiolados, membranosos; paredes sub-parenquimáticas, de 12-14,5 μ de espessura, formadas por células poligonais, marron, de 3,5-5,5 × 3-5 μ (Fig. 10).

Picnidióforos ausentes.

Picnidiosporos hialinos, fusóides, direitos ou levemente encurvados, contínuos, de polos obtusos, numerosos, presos directamente em toda parede picnidial, 7-12 × 1,5-3 μ, não gutulados.

Sobre folhas de *Tussilago farfara* — Oberammergau, Leg. Allescher, Agosto, 1891. Espec. n.º 178, ex Allescher & Schnabl,



Fig. 10 — **Phoma galactis** Cooke

Picnídio e picnidiosporo.

Orig.

Fungi Bavarici, sob *Asteroma impressum* Fuckel, no Rijksherbarium, de Leiden.

Pseudofumago citri Br. & Farn.

in Syll. Fung., XXII, 1379, 1913.

Micélio epífilo, raramente hipófilo, superficial, efuso, marron-negro, crustáceo-membranoso, constituído por hifas alongadas, rectas, contendo células cilíndricas sub-globosas, de 6-8 μ de diam., catenuladas, marron-negras; hifopódios e setas ausentes. Conídios formados lateralmente sobre as hifas do micélio, a princípio simples, assemelhando-se a hifopódios, unicelulares, depois múltiplos, polimorfos, sésseis ou

curto pedunculados, compondo aglomerados de 4-10 células, sub-globosos, oliváceos ou fuligíneos, um tanto espinosos, 12-16 × 8-13 μ para cada elemento celular. O pedúnculo ou conidióforo varia de 0-35 × 0-9 μ, sendo também fuligíneo (Fig. 11).

Stwitzerland, leg. G. Winter, October, 1878. Ex Joannes Kunze, Zurich — Fungi Selecti Exsiccati, depositado em The New York Botanical Garden.

Igualmente o assinalamos sobre outro especímen de *Cornus sanguineus* colectado em Leipzig por Auerswald, o qual



Fig. 11 — **Pseudofomago citri** Br. & Farn.

Micélio e aglomerados espinosos de conídios.

Orig.

tem a seguinte etiqueta «Rabenhorst, Fungi europaei 835, *Capnodium citri* Awd. Mspt.» e nos foi cedido por gentileza do Prof. R. Ciferri, Universidade de Pavia, Itália.

Obs.: O gênero *Pseudofumago* Briosi & Farneti foi considerado por Saccardo (loc. cit.) como «omnino obscuro». Contudo, consideramos a espécie em foco como perfeitamente caracterizada e assim reconhecível e aceitável.

Septoria crepidis Vestergr.

in British Stem-and Leaf. Fungi W. B. Grove, Is 1935: 379.

Colônias marron-negras, de área central esclarecida, anfígenas, isoladas ou confluentes, circulares, 1,5-7 mm de diam.

Micélio imerso, hialino e sub-hialino, apresentando células de 10-22 × 3,5-6 μ.

Picnídios geralmente epífilos, imersos, depois irrupentes, globosos a sub-globosos, membranosos, dispersos, marron-claros, 77-138 μ de diam.; ostíolo central, circular, 17-30 μ de



Fig. 12 — **Septoria crepidis** Vestergr.

Picnídio

diam.; paredes sub-parenquimáticas, 9,5-19,5 μ de diam., formadas por células poligonais, de 3,5-8,5 × 2,5-6 μ (Fig. 12).

Picnidióforos hialinos, ovóides a cilindráceos, 4,5-6,5 × × 1,5-2 μ.

Picnidiosporos hialinos, filiformes, 1-3 septados, não constrictos, 11-38 × 1-1,5 μ; ápice agudo em ambos os polos, direitos ou recurvados.

Sobre folhas de *Arisarum vulgare*. Leg. Dr. Marcucci, 1886. Espec. de Rijksherbarium de Leiden, sob a etiqueta de *Asteroma arisari* Rabenh.

Sirodomus campanulae Bat. & Nasc. n. sp.

Colônias maculícolas, marron, hipófilas, circulares, isoladas ou confluentes, 3-11 mm de diam.

Micélio imerso, sub-hialino, de ramificações irregulares, tendo células de 12-22 × 3-5 μ e distribuição intercelular.

Picnostromas sub-cuticulares a epidérmicos, marron-claros, carnosos, sub-globosos, isolados ou confluentes, ástomos, 99-275 μ de diam., 88-160 μ de altura; paredes sub-parenquimáticas de 12-27 μ de espessura, formadas por várias camadas de células irregulares, de 6-10 × 6-7,5 μ (Fig. 13).

Fig. 13 — **Sirodomus campanulae** Bat. & Nasc. n. sp.
Picnostroma sob secção longitudinal.

Picnidióforos hialinos, simples, 3-septados, 19-22 × 1-3 μ revestindo toda a cavidade picnostromática.

Picnidiosporos cilindráceos, oblongos, contínuos, catenulados, hialinos, 4,5-9 × 0,5-2 μ.

Sobre folhas de *Campanula trachelii* L. Suíça. Tipo, Espec. n.° 1097, ex de Thumen, Mycotheca Universalis, no Rijksherbarium de Leiden, sob *Asteroma campanulae* De C. in Mem.

Coloniae maculicolae, hypophyllae, brunneae, rotundatae, 3-11 mm diam., vel confluentes.

Mycelium intramatricale, ex hyphis subhyalinis, irregulariter ramosis, intercellularibus atque ex cellulis 12-22 × 3-5 μ compositum.

Pycnostromata subcuticularia vel epidermalia, simplicia vel confluentia, sub-globosa, 99-275 μ diam., 80-160 μ alt., brunnescentia, carnosa; cum parietibus subparenchymaticis, pluristratosis, ex cellulis irregularibus, 6-10 × 6-7,5 μ efformatis.

Pycnidiophori simplices, hyalini, 3-septati, 19-22 × 1-3 μ.

Pycniàiosporae cylindraceae vel oblongae, continuae, catenulatae, hyalinae, 4,5-9 × 0,5-2 μ.

In foliis Campanulae trachelii. *Helvetiae. Typus, n.º 1097, ex Thumen, Mycotheca Universalis, in Rijksherbarium, Leiden, sub* Asteroma campanulae *De C.*

Triposporium copaiferum Bat. & Farr, n. sp.

Colônias hipófilas, superficiais, sub-hialinas, tornando-se depois marron-claras, espalhadas.

Micélio imerso e superficial, sub-hialino a marron-claro, de hifas irregularmente ramificadas, septadas, não constrictas, apresentando células de 28-56 × 8-11 μ, sem setas ou hifopódios (Fig. 14 — *a*).

Conidióforos formados sobre as hifas do micélio, às vezes como uma hifa simples, levantada, ou, então, laterais, erectos, contínuos ou septados, direitos ou recurvados, levemente dilatados na região basal, 22-90 × 8 × 12 μ (Fig. 14 — *b*).

Conídios sub-hialinos, acrógenos, estauriformes, dotados de 3 braços e uma célula-pé; braços contínuos ou 1-septados, de ápice rotundo ou obtusos, 50-100 × 28-56 μ; célula-pé de 20-30 μ de extensão (Fig. 14 — *c*).

Sobre folhas de *Copaifera baumianae* Harms; rio Kuisi, Zambeze — África Austro-Ocidental. Leg. H. Baum. Tipo, n.º 964, ex Baume Kriptog. exsic. no Herb. Criptog. Inst. Bot. Univ. Carolina, Praha, sob a etiqueta de *Dimerosporium erysiphinum*. Está associado a *Parodiopsis perae* Arn., *Phyllosticta sp.* e *Rhinotrichum sp.*



Fig. 14 — **Triposporium copaiferum** Bat. & Farr, n. sp.
a) Micélio ;
b) Conidióforos;
c) Conídios.

Coloniae hypophillae, superficiales, subhialinae, dein brunnescentes, sparsae.

Mycelium immersum, superficiale, subhialinum vel brunnescens, ex hyphis irregulariter ramosis, septatis, non constrictis, cum cellulis 28-56 × 8-11 μ, sine setis vel hyphopodiis.

Conidiophori super hyphas mycelii effformati, aliquando tanquam simplex hypha erecta aliter laterales, erecti, continui vel septati, recti vel recurvati, leviter dilatati in regione basali, 22-90 × 8 × 12 μ.

Conidiae subhialinae, acrogenae, stauriformes, habens 3 brachia et cellulam-pedem unam; brachia continua vel 1-septata, apicaliter rotunda vel obtusa, 50-100 × 28-56 μ. Cellula-pede 20-30 μ extensionis.

In foliis Copaiferae baumianae, *Harms.; flumine Kuisi, Zambeze — Africa Austro-Occidentali. Leg. H. Baum. Typus, n.° 964, ex Baume Kryptog. exsic. in Herb. Cryptog. Inst. Bot. Univ. Carolina, Prahae, sub inscriptione* Dimerosporii erysiphini. *Societatem iniens cum* Parodiopsi perae *Arn.*, Phyllosticta sp. *et* Rhinotricho sp.

Tubercularia coryli Paol

in Syll. Fung. 10:703, 1892

Micélio livre ausente.

Esporodóquios sub-globosos, hialinos, glabros, superficiais, isolados, raramente confluentes, 700-900 μ de diam., 490-750 μ de altura; membrano-carnosos, formados por um pseudo estroma central de 380-550 μ de diam., 220-300 μ de altura, tendo células poligonais e arredondadas de 3,5-11 × × 3,5-6,5 μ, hialinas ou levemente coradas de marron-vermelho, paralelamente dispostas; na região central do esporodóquio; este estroma continua em um pé ou estipe de 192,5-200 μ de diam., de idêntica natureza estromática, o qual penetra o hospedeiro, numa profundidade de 137,5-150 μ, ramificando-se abundantemente na porção basal, com hifas hialinas, septadas, contendo células de 8,5-11 × 2-4,5 μ (Fig. 15).

Conidióforos partindo do estroma central, dispostos paralelamente, filiformes, acropleurógenos, hialinos, simples, ascen-



Fig. 15 — **Tubercularia coryli** Paol.

Esporodóquio, conidióforos e conídios.

dentes, indistintamente septados, numerosos de 160-220 μ de altura e 1-2,5 μ de diam.

Conídios hialinos, cilindráceos ou alantóides, contínuos, numerosos, não gutulados, envoltos numa ténue bainha mucosa; 3,5-5,5 × 2-3 μ.

Sobre folhas de *Smilax* sp. Wihmington, Delaware, 21-12-1891. Espec. 1899, ex Herb. Albert Commons, na Acad. Nat. Sci. Philadelphia, U. S. A., etiquetado como *Microthyrium Smilacis*.

ABSTRACT

This paper deals whit the revision of several exsiccates of fungi which identification has been changed now as a consequence of ancient misinterpretation.

Otherwise it contains also the descrition of the following new species: *Acarella pernambucensis* Bat. on *Meliola caxangaensis* Bat., *Sirodomus campanulae* Bat. & Nasc. n. sp. on *Campanula trachelii* ond *Triposporium copa ferum* Bat & Farr on *Copaifera baumianae*.

Separata da Revista **BROTÉRIA**
Série de Ciências Naturais
Volume XXVIII (LV) Números 2-3
LISBOA 1959

Comp. e Imp.: CENTRO GRAFICO
Vila Nova de Famalicão — 1959

ASCOMYCETES DIVERSOS

A. CHAVES BATISTA

E

GENEROSA E. P. PERES

Distintos Ascomycetes são reunidos no presente trabalho. A maior parte das espécies ora em foco tem sido estudada sobre exsicatas que traziam identificações discrepantes com a natureza dos espécimes fúngicos que efectivamente suportam.

Uma única nova espécie é descrita: *Balladynella pini*, nobis, sobre *Pinus rigida*.

Os demais fungos estudados são os seguintes: *Didymosphaeria galiorum* Fuck. sobre *Salix caprea*, *D. microstictica* (Leighton) Winter, *Massariella palmarum* Maffei, sobre *Corypha elata*, *Mycosphaerella heveae* Petch, sobre *Laserpitium latifolium*, *M. minor* (Karst.) Johanson, sobre *Plantago maior*, *M. punctiformis* (Pers.) Munk., sobre *Castanea* sp., *Ophiobolus cirsi* (Karst.) Sacc., sobre hospedeiro ignoto, *Plectosphaera clara-bonae* (Speg.) Theiss., sobre *Eucaliptus tereticornis*, *Pseudomeliola rolliniae* Rehm, sobre *Astertinella puiggari* (Speg.) Theiss. var. *minor* Bat. & Peres e *Saccardomyces perpusillus* (Speg.) Petrak, sobre *Asterina* e *Asterostomella*.

Balladynella pini Bat. & Peres n. sp.

Colônias anfígenas, marron-negras, isoladas ou confluentes, circulares, 0,5-3 mm de diâmetro.

Micélio superficial, marron, não setoso, sem hifopódios, telemórfico, de ramificações irregulares em ângulos de 45-90°; hifas septadas, constrictas, tendo células de 7-15 × 2,5-5 μ.



Figs 1-5 — **Megaselia (A.) spinata** (Wood), ♂. 1, Insertion pattern of frontal bristles; PR, praeocellar; ML, mediolateral; AL, anterolateral; A, antial; SA, upper supra-antennal. 2, Hypopygium, distorted and twisted by exsiccation; C, extruded copulatory organs. 3, Ventral hairs, basal half of hind femur. 4, Posterodorsal cilia of hind tibia. 5, Wing; dotted lines indicate missing part of apex.

Peritécios superficiais, marron-negros, subglobosos, dispersos ou agrupados, membranosos, 82,5-125 μ de diâmetro; paredes subparenquimáticas formadas por duas camadas de células poligonais de 9,5-28 × 9,5-24,5 μ; ostíolo central, circular, 6,5-15 μ de diâmetro (Fig. 1).



Fig. 1 — **Balladynella pini** Bat. & Peres n. sp.
a) Peritécio sobre micélio superficial;
b) Asco e ascósporos.

Ascos cilindráceos ou elipsoides, 2-tunicados, 8-esporos, sésseis, aparafisados, 31,5-44 × 14,5-23 μ.

Ascosporos elipsoide-oblongos, 1-septados, constrictos, marron, levemente espinescentes, 16-19,5 × 7-9,5 μ.

Sobre folhas de *Pinus rigida.* Newfield, New Jersey, Ellis, 1879. Tipo, n.º 789, sob a etiqueta de *Asterina pinastri* Ell. & Sacc. n. sp., no Herb. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, U. S. A.

Coloniae amphigenae, atro-brunneae, singulares vel confluentes, orbiculatae, 0,5-3 mm diam.

Mycelium superficiale, brunneum, haud setosum, sine hyphopodio, telemorphicum, irregulariter ramosum, in angulis 45-90°, hyphas habens septatas, constrictas, ex cellulis 7-15 × 2,5-5 μ efformatas.

Perithecia superficialia, atro-brunnea, subglobosa, dispersa vel glomerata, membranosa, 82,5-125 μ diam.; cum parietibus

subparenchymaticis ex duobus cellulorum poligonalium stragulis 9,5-28 × 9,5-24,5 μ efformatis; ostiolum autem centrale, rotundum, 6,5-15 μ diam.

Asci cylindracei vel ellipsoidei, 2-tunicati, 8-sporos comprehendentes, sessiles, aparaphysati, 31,5-44 × 14,5-23 μ.

Ascosporae ellipsoideo-oblongae, 1-septatae, constrictae, brunneae, leniter spinosae, 16-19,5 × 7-9,5 μ.

In foliis Pini rigidae, *Newfield, New Jersy, Ellis, 1879. Typus n.° 789, sub* Asterinae pinastris *Ell. & Sacc. n. sp. inscriptione, in Herb. Acad. Nat Scientiarum, Philadelphiae, U. S. A.*

Didymosphaeria galiorum Fuck.
in Syll. Fung. 1: 711, 1882.

Micélio livre ausente.

Peritécios epífilos, imersos, marron-negros, membranosos, globosos a subglobosos, isolados, 65-105 μ de diâmetro; ostíolo definido sòmente à maturidade; paredes subparenquimáticas, 12-29,5 μ de espessura, formadas por células irregulares, de 5-10 × 4,5-7,5 μ (Fig. 2).

Ascos elipsoides ou cilindráceos, curto-pedicelados, 2-tunicados, 8-esporos, monósticos a disticos 40,5-51,5 × 8,5 12 μ.; paráfises hialinas, septadas, simples, 1,5-3 μ de diâmetro.

Ascosporos ovoide-oblongos, 1-septados, marron-claros, ligeiramente constrictos, 12-15 × 5-7 μ.

Sobre folhas de *Salix capraea* — Baviera.

De Thümen, 1874. Esp. n.° 193, sob *Asteroma capraeae*, Desm. no Rijksherbarium, de Leiden.

Massariella palmarum Maffei.
in Atti, Ist. Bot. Univ. Pavia, ser. II, vol. XII: 5, 1915.

Máculas marron-negras, efusas.

Pseudotécios dispersos ou gregários, globoso-deprimidos, de base aplanada, marron, submembranosos, de 270-432 μ de diâmetro e 81-103 μ de altura, com papila massarioide, reco-



Fig. 2 — Didymosphaeria galiorum Fuck.
Peritécio imerso, asco parafisado e ascósporos

Fig. 3 — Massariela palmarum Maffei.
Secção longitudinal do pseudotecio. Asco parafisado e ascósporo envolto em substância gelatinosa.

bertos pelo periderma do hospedeiro; perídio de 16-40,5 μ de diâmetro (Fig. 3).

Micélio interno hialino, intercelular.

Ascos cilindráceos a sub-elípticos, 2-tunicados, paralelos, 8-esporos de 46-80 × 13-20 μ.

Paráfises filiformes, hialinas, densas, 1,5-2 μ de diâmetro.

Ascósporos elipsoides, marron, crestados, 1-septados, constrictos, monósticos a subdísticos, 13-18 × 6-8 μ, célula apical maior do que a célula basal, envoltos persistentemente por substância gelatinosa.

Sobre pecíolos de *Corypha elata* — Monte Maquiling — Los Banos, Laguna. Filipinas. C. F. Baker, Jan. 1913. Espec. n.° 53, ex Fungi Malayana, sob *Microthyrium elatum* n. sp., no Herb. da Univ. de Pádua — Itália.

Det. A. Chaves Batista & G. E. P. Peres, 11-18-58.

Mycosphaerella heveae Petch.

in Syll. Fung. XXIV: 863, 1928.

Phytopathologie des Pays Chauds, vol. II: 1334, 1953.

Máculas foliares, anfígenas, negras, semicirculares ou irregulares, isoladas ou confluentes de 1,5-4 mm de diâmetro; micélio livre ausente.

Micélio interno marron-claro, septado de hifas torulosas, acentuadamente constrictas, tendo células de 12-22 × 3,5-6,5 μ e distribuído intra e intercelularmente; atravessa o mesófilo, alcançando a epiderme da face oposta.

Pseudotécios imersos, sub-epidermais, depois subproeminentes, glabros, subglobosos, marron-negros de 55-70 μ de diâmetro, membranosos, densamente gregários, ostiolados, de paredes subparenquimáticas, 9,5-14,5 μ de espessura, formadas por células poligonais e arredondadas, de 4,5-12 × 2-9 μ; ostíolo central de 3-4 μ de diâmetro (Fig. 4).

Ascos elipsoides ou clavados, 2-tunicados, sésseis, aparafisados, 8-esporos, de 30-35 × 8-10 μ.

Ascósporos subfusoides, hialinos, 1-septados, levemente constrictos, polos rotundos, polísticos, 9-10 × 2,5-3-5 μ.

Sobre folhas de *Laserpitium latifolium* L. Thuringia, J. Kunze, 1879. Espec. n.os 239 e 284, ex J. Kunze, Fungi selecti exsiccati, sob a etiqueta de *Stigmatea jenensis* e *Calloria jenensis*, no Herb. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, U. S. A.

Fig. 4 — Mycosphaerella heveae Petch.
Peritécios e asco. orig.

Mycosphaerella minor (Karst.) Johanson.
Sphaerella minor Karst.
in Syll. Fungorum I. 519: 1882.
v. *Arx.*
Beiträge zur Kenntnis der Gattung Mycosphaerella p. 69, F. Berger, Buch. und Verlag Horn, Niederosterreich, 1949.

Colónias anfígenas, marron-claras, isoladas, circulares, 3-7 mm de diâmetro.

Micélio interno oliváceo, septado, contendo células de 17-39 × 7-11 μ, distribuído de modo inter e intracelular, atingindo por fim o mesófilo.

Pseudotécios imerso-irrumpentes, sub-epidermais, marron-negros, subglobosos, isolados e gregários, membranosos, 59-89 μ de diâmetro, papilados; parede pseudo-parenquimá-

tica, 9,5-12 μ de diâmetro, formada por células irregulares, marron-negras, 5-10 × 2,5-6 μ (Fig. 5).

Ascos clavados, 2-tunicados, 8-esporos, sésseis, aparafisados de 14,5-29,5 × 10-14 μ.

Ascósporos cilindráceos, 1-septados, levemente constrictos, hialinos, polísticos, 8-12 × 2,5-5 μ.

Sobre folhas de *Plantago major*. Leg. G. A. Rex, no Herb. de The Acad. Nat. Sci. Philadelphia, sob a etiqueta de *Asterina plantaginis* Ellis.



Fig. 5 — Mycosphaerella minor (Karst) Johanson

Didymosphaeria microstictica (Leighton) Winter.
in Hedw. p. 25, 1886.
Syll. Fung. IX: 738, 1891.

Micélio hipófilo, imerso, abundante, marron-claro, formado por hifas septadas, constrictas, tendo células de 12-22 × × 5-7 μ; hifopódios e setas ausentes.

Peritécios imersos, globosos, papilados, membranosos, isolados, glabros, marron-negros, 132-185 μ de diâmetro; paredes subparenquimáticas, constituídas por células irregulares, de 10-19,5 × 9,5-15 μ (Fig. 6).

Ascos cilindráceos, 2-tunicados, 8-esporos, sésseis, 50--88 × 7-12 μ.

Paráfises hialinas, direitas ou encurvadas, septadas, simples.

Ascósporos elipsoide-oblongos, 1-septados, levemente constrictos, marron, monósticos, 12-15 × 5-7 μ.

Sobre folhas de *Pyrus mali* L. Baviera.

De THÜMEN, 1875. Espec. n.° 897, sob *Asteroma mali* Desm. no Rijksherbarium, de Leiden.



Fig. 6 — **Didymosphaeria microstictica** (Leighton) Winter. Peritécio imerso, asco parafisado e ascósporos.

Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Munk.
in Munk, Danish Pyrenomycetes: 325, 1957.

Pseudotécios imerso-irrumpentes, hipófilos, glabros, marron-negros, glabros, subglobosos de 80-100 μ de diâmetro, gregários, pseudo-ostiolados, membranosos, de paredes subparenquimáticas, 12-19,5 μ, de diâmetro, formadas por células poligonais distintas, de 2-8 × 1,5-5,5 μ (Fig. 7).

Ascos cilindráceos, 2-tunicados, sésseis, aparafisados, 8-esporos, 30,5-35 × 4,5-6 μ.

Ascósporos hialinos, elípticos ou clavados, monósticos a dísticos, 1-septados, não constrictos 6,5-8 × 2-3 μ.

Sobre folhas de *Castanea* sp., associado a *Rostrocoronophora castaneae* Bat. & Nasc. n. sp. Espec. n.° 744, ex DESMAZIERES, no Rijksherbarium de Leiden, sob o nome de *Asteroma castaneae* Nob.



Fig. 7 — Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Munk.



Fig. 8 — Ophiobolus cirsii (Karst.) Sacc.
a) Peritécio irrumpente;
b) Ascósporos.

Ophiobolus cirsii (Karst) Sacc.
Sin. *Rhaphidospora cirsii* Karst.
in Symb. Myc. Fenn. VI: 35.

Micélio intramatrical, de hifas hialinas a sub-hialinas, remotamente septadas, 1,5-3 μ de diâmetro.

Pseudotécios dispersos ou gregários, globoso-conoides, de base aplanada, irrumpentes através da cutícula, marron-negros, 200-400 μ de diâmetro; papila conoide; subparenquimáticos, membranosos, de paredes pluriestratificadas, formadas por células poligonais de 7-13,5 × 6-8 μ (Fig. 8).

Ascos abundantes, sub-elípticos, clavados ou cilindráceos, pedicelados, 2-tunicados, 8-esporos de 97-205 × 11-14 μ (Fig. 9).

Fig. 9 — Ophiobolus cirsii (Karst) Sacc.
Ascos e paráfises.

Parafises hialinas, numerosas, filiformes, ramificadas, septadas, 1-3 μ de diâmetro.

Ascósporos cilindráceo-filiformes, multiseptados, com um nódulo mediano, entrelaçados, hialinos ou amarelados, 108-190 × 3-4 μ.

Sobre caule de hospedeiro indet. Espec. do Herb. da Univ. de Pádua, Itália, sob o nome de *Microthyrium fuscellum*.

Plectosphaera clarae-bonae (Speg.) Theiss.

Consultar: A. Munk, *in* Danish Pyrenomycetes, Dansk Botanisk Arkiv, Bind 17, nr. 1: 170, 1957.

Micélio superficial ausente.

Micélio endógeno hialino, de hifas septadas, ramificadas, tendo células de 13,5-40,5 × 13 μ.



Fig. 10 — **Plectosphaera clarae-bonae** (Speg.) Theiss. Ascostroma, asco parafisado e ascósporo.

Ascostromas epífilos, porém imersos, espalhados, subglobosos, papilados, 230-300 μ de diâmetro; perídio de 10-30 μ de diâmetro, marron-negro, formado por três camadas de células poligonais, alongadas, de 8-15 × 3-5 μ, firmemente implantado no mesófilo; papila proeminente, com ostíolo de 50-60 μ de diâmetro (Fig. 10).

Ascos irregularmente cilindráceos, de base atenuada, 1-tunicados, sésseis, 8-esporos de 82,5-100 × 4,5-8 μ.

Paráfises deliquescentes.

Ascósporos, elipsoides, contínuos, hialinos, monósticos, às vezes assimétricos, lisos, 11,5-15,5 × 3-5 μ.

Sobre folhas de *Eucalyptus tereticornis* — South Queensland, Austrália. Leg. Rev. B. Schortechini, L. L. B., F. L. S., 1883.

Obs.: Este especímen do Herb. da Univ. de Pádua, Itália, achava-se identificado sob o nome de *Micropeltis applanata* Mont.

Pseudomeliola rolliniae Rehm.
in Hedwigia, XL: 150, 1901.

Micélio escasso, de hifas ramificadas, septadas, marron, 4-6 μ de diâmetro.

Peritécios gregários, sobre máculas epífilas *de Asterinella* e *Meliola,* globosos, marron-oliváceos a negros, glabros, de



Fig. 11 — Pseudomeliola rolliniae Rehm.
Peritécio, asco parafisado e ascósporo

ostíolo inconspícuo, parenquimáticos, de 95-145 μ de diâmetro; células parietais poligonais, de 4-8 × 3-7 μ (Fig. 11).

Ascos subclavados, sésseis ou pedicelados, octosporos, abundantes, 2-tunicados, de 18-30 × 4-8 μ.

Paráfises abundantes, hialinas, septadas, filiformes, ramificadas 1-2 μ de diâmetro.

Ascósporos linear-fusoides, sub-agudos, encurvados, hialinos, paralelos, 16,5-21,5 × 1-2,5 μ.

Sobre *Asterinella puiggari* (Speg.) Theiss. var. *minor* Bat. & Peres n. var. e *Meliola sp.* sobre folhas de *Myrtaceae,* São Leopoldo, Brasil. Theissen. Espec. do Herb. do Mus. Bot. da Univ. de Pádua. Identificado por A. Chaves Batista & G. E. P. Peres, 27/6/58.

Saccardomyces perpusillus (Speg.) Petrak.
in Ann. Mycol. XXXII: 324, 1934.
Bol. Acad. Nac. Cien. Cordoba XI: 491, 1889.

Micélio livre de 2,5-3 μ de diam., sub-hialino ou marron-pálido, englobando as hifas do hospedeiro.

Peritécios superficiais, pequeninos, sub-ovoides ou globosos, oliváceos, membranosos, delicados, difluentes na região apical, de 54-80 × 48-68 μ.

Ascos clavados a sub-elipsoides, 8-esporos, 16-20 × 7-8 μ.

Paráfises filiformes, ramificadas, de 1,5 μ de diâmetro, hialinas.

Ascósporos hialinos, acicular-filiformes ou falcoides, contínuos, 13,5-16 × 2,5-3 μ.

Hiperparasita de *Asterina acalyphae* e *Asterostomella acalyphae* Syd, sobre folhas de *Acalypha macrostegia* var. *hirsutissima* Costa Rica, Grécia, H. Sydow, 19/1/925. Espec. n.° 676, ex Sydow, Fungi exotici exsiccati, no Rijksherbarium de Leiden.

ABSTRACT

The results of the taxonomic revision on several exssiccates of fungi are presented in this paper.

A new species — *Balladynella pini* Bat. & Peres, on *Pinus rigida,* is equally described.

PYRENOMYCETIDAE REVISTOS EM PERNAMBUCO (1)

A. Chaves Batista, M. L. Farr e J. A. Lima

Um grupo de fungos Pirenomicetos, de ocorrência infrequente e assinalado sôbre antigas exsicatas, é agora focalizado como consequência de seu estudo em Pernambuco.

As espécies que logramos analisar, com o concurso da histologia, são as seguintes: *Dimerosporiopsis engleriana* P. Henn. sôbre *Erica obliqua, Phaeosphaerella theae* Petch sôbre *Acer campestre, Physalospora pandani Ell.* & Ev. sôbre *Sutherlandia frutescens.*

São, também, propostos e descritos os seguintes gêneros e espécies novas: *Parodiodia,* na família Parodiopsidaceae, com espécie tipo *P. amelanchiera* sôbre *Amelanchier alnifolia, Protostegiomyces asterinarum* como hiperparasita de *Parasterina colliculosa* (Speg.) Theiss. sôbre *Eugenia* sp., *Protoventuria bormülleri* sôbre hospedeiro desconhecido e *Rostrocoronophora castaneae*, sôbre *Castanea* sp. (2).

---

(1) *Institute de Micologia - Universidade do Recife* - Publicação n. 156.

(2) O. A. A. agradecem o preparo das ilustrações que lhes fez M. L. Nascimento.

DIMEROSPORIOPSIS ENGLERIANA P. Henn., Hedwigia, XL: 173, 1901; Bothalia, IV, part. 1: 206, 1941.

Sin.: *Dimerosporium Englerianum* P. Henn., Pilz Ostafr. p. 31, 1931.

Outros sinônimos: em Bothalia, loc. cit.

Micélio expandido no córtex do hospedeiro, á maneira de

coxins estromáticos, intramatricais, irregulares quanto á forma e estrutura, destacando-se, porém, células marron, poligonais, 6,5-13 x 5,5-9,5 μ. Dêsses coxins levantam-se numerosos tufos de hifas marron, tortuosas, septadas, tendo células de 13-33 x 5,5-8 μ, frequentemente entrelaçadas, de 120-250 μ de altura; algumas dessas hifas produzem conídio feofragmo, acrógeno. Peritécios numerosos, apoiados sôbre os tufos de hifas aéreas, glabros, coriáceos, globosos a sub-globosos, 210-350 μ de diam., 180-300 μ de altura, pseudo-ostiolado, marron-negros, entrando em colapso á



Fig. 1.
DIMEROSPORIOPSIS ENGLERIANA Syd.
a) coxin estromático; b) tufos de hifas aéreas; c) hifa aérea e conídio; d) peritécio; e) asco parafisado. Orig.

maturidade; paredes de 39-66,5 μ de diam., sub-parenquimáticas, verrugosas, formadas por células poligonais de 8-16,5 x 5,5-13 μ (Fig. 1). Ascos cilindráceo-clavados, 2-tunicados, 8-esporos, parafisados, 75-80,5 x 11-15 μ. Paráfises simples, hialinas, septadas, filiformes, 1-2 μ de diam. Ascosporos clavado-elipsóides, oliváceos a marron-claros, 1-septados, de 15-19,5 x 6-7 μ.

Sôbre *Erica obliqua* - Ronde River, Africa Austral, Abril, 1897. Espec. do Herb. de The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, U.S.A.

PARODIODIA Bat. n. gen.

Micélio superficial, velutino, corado, com estomopódios e conidióforos. Micélio interno inter e intracelular. Peritécios sôbre o micélio externo, globosos, glabros, marron-negros, pseudo-ostiolados. Ascos 2-tunicados, 8-esporos. Paráfises presentes. Ascosporos feodídimos.

Mycelium superficiale, velutinum, coloratum, cum stomopodiis et conidiophoris. Mycelium internum inter et intracellulare. Perithecia sita in mycelio externo, globosa, glabrata, atro-brunnea, pseudo-ostiolata. Asci 8-sporei, 2-tunicati. Paraphyses praesentes. Ascosporae phaeodidymae.

Typus: *P. amelanchiera* Bat., Farr & J. A. Lima n. sp.



Fig. 2.
PARODIODIA AMELANCHIERA Bat. & Nasc. n. sp.
a) secção longitudinal do peritécio; b) asco parafisado e ascosporos.

PARODIODIA AMELANCHIERA Bat., Farr & J. A. Lima n. sp.

Colônias marron-negras, densas, efusas, epífilas, recobrindo todo o limbo foliar. Micélio marron-negro, superficial, de pigmento pouco difusível, septado, de células cilindráceas ou irregulares, 9-12,5 x 3,5-5 µ, densamente ramificado. Conidióforos ascendentes, simples, septados, 66-75 x 6-7,5 µ, sustentando conídios acrógenos, ovoides ou fusoides, contínuos, marron-claros, de 17-26,5 x 6-8,5 µ. Estomopódios 1-celulares, marron, raros, dispersos, de 10-16 x 9,5-10 µ. Micélio interno, sub-hialino, distribuindo-se de modo intra e intercelularmente, com células de

4-10 x 2,5-3 μ, até o mesófilo. Peritécios marron-negros, superficiais, globosos, levemente deprimidos, 225 μ de diam., densamente gregários, pseudo-ostiolados, coriáceos; paredes sub-parenquimáticas, de 22-45 μ de espessura, formadas por células poligonais de 6,5-11 x 4,5-8 μ (Fig. 2). Ascos cilindráceo-elipsoides, curtamente pedicelados, 2-tunicados, 8-esporos, 60-62x9-10 μ. Paráfises hialinas, septadas, ramificadas, 1-1,5 μ de diam. Ascosporos oblongos, 1-septados, de células desiguais, constrictos, dísticos, oliváceos a marron de 11-13,5 x 4,5-5 μ.

Sôbre *Amelanchier alnifolia* - Sierra Nevada Mts. California. Leg. Prof. HARKNESS. Tipo, n. 982, ex GEORGE MARTIN, no. Herb. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, sob a etiqueta de *Dimerosporium collinsii*.

Fig. 3.
PHAEOSPHAERELLA THEAE Petch.
Peritécio, asco e ascosporos. Orig.

Phaeosphaerella theae Petch., Syll. Fung., XXIV: 926, 1928; Phytopathologie des Pays Chauds, II: 1355, 1953.

Máculas anfígenas, semi-circulares, mais visíveis na face epífila, isoladas ou confluentes, de 1-2 mm de diam. Micélio interno marron, septado, de hifas torulosas, acentuadamente constrictas, tendo células de 11-25 x 5-12 μ, distribuido de modo intra e intercelular. Peritécios imersos, globosos ou ovoides, epífilos, marron-negros, glabros, subglobosos, uniloculares, de 100-129 μ de altura, 95-110 μ de diam., isolados ou confluentes, pseudo-

ostiolados, membrano-carnosos; paredes de 16-25 μ de espessura, formadas por células poligonais de 6,5-16,5 x 5,5-12 μ (Fig. 3). Ascos cilindro-clavados, 2-tunicados, sub-sésseis, aparafisados, 8 esporos, 36-50 x 8,5-12 μ. Ascosporos cilindráceo-fusoides, olivá-ceos a marron-claros, 1-septados, de células desiguais, levemente constrictos, dísticos ou monósticos de 9-14 x 3-5 μ.

Sôbre folhas de *Acer campestre*. Espec. n. 743, sem outras indicações; classificado como *Asteroma aceris* Rob, no Rijksher-barium, de Leiden.

Physalospora pandani Ell. & Ev., Syll. Fung., IX: 597, 1891.

Peritécios imerso-irrompentes, epífilos, globosos, de ostíolo papilado, saliente, isolados ou gregários, 240-287 μ de altura, 247-264 μ de diam. na base e 92-137,5 μ no ápice, marron, membrano-



Fig. 4.
PHYSALOSPORA PANDANI Ell. & Ev.
Peritécio, asco parafisado e ascoporos. Orig.

sos, de paredes sub-parenquimáticas, 19,5-82 μ de espessura, formadas por várias camadas de células poligonais, hialinas, de 4,5-8 x 2-4 μ; ostíolo central de 15-17 μ de diam. (Fig. 4). Ascos cilindráceo-clavados, 2-tunicados, sub-sésseis, parafisados, 8-esporos, 60-100 x 14,5-20 μ. Paráfises filiformes, evanescentes. Asco-

sporos hialinos, contínuos, elipsoides, de epispório distinto, monóticos ou dísticos, 13-5-18 x 7-8,5 μ.

Sôbre folhas de *Sutherlandia frutescens* R. Br. Monte Boschberg, Somerset-East. Leg. Mac Owan. Espec. n. 3344, ex Rabenhorst-Winter, Fungi europaei, no Herb. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, sob a etiqueta de *Stigmataea sutherlandiae* Kalchbr.

PROTOSTEGIOMYCES ASTERINARUM Bat. & Farr. n. sp.

Micélio efuso, espalhado irregularmente, subhialino ou marron pálido, indistintamente septado, septos distantes, não hifopodiado, não setoso, 2-4 μ diam.; ramificações usualmente opostas ou sub opostas (Fig. 5). Picnídios marron-claros, membranosos,



Fig. 5.
PROTOSTEGIOMYCES ASTERINARUM Bat. & Farr
a) Picnídio sôbre micélio de *Parasterina*; b) Micélio e primórdio de asco stroma de *Parasterina*; c) Picnidiosporos.

irregularmente globosos, subglobosos, ou ovoides, 37-70 μ diam.; às vezes disciformes; paredes delicadas, cedo evanescentes, consistindo de células quadradas ou poligonais, 4-6 μ diam., radialmente dispostas, plectenquimáticas. Conidióphoros hyalinos, filamentosos, intumescidos na região basal; 7-13 μ compr. 2 μ diam. basal e 1 μ diam. apical. Pycnidiosporos acrógenos, hyalinos, falcoides, não septados, gutulados, 10-18 x 1 μ.

Sôbre o micélio e no interior dos ascostromas de *Parasterina colliculosa* (Speg.) Theiss., sôbre folhas de *Eugenia* sp. - Rep. Dominicana, R. Ciferri, Maio 1955. Tipo, n. 169322, sob *Asterina colliculosa* Speg. no Herb. Mus. Nat. Praga.

Mycelium effusum, sub-hyalinum vel brunnescens, indistincte septatum, opposite vel subopposite ramosum, 2-4 μ diam., non setosum, haud hyphopodiatum. Pycnidia brunnescentia, membranosa, globosa, subglobosa vel ovoidea, dein disciformia, 37-70 μ diam., cum parietibus ex cellulis 4-6 μ diam., radialiter dispositis, plectenchymaticis, efformatis. Conidiophori filamentosi, 7-13 μ long., 2 μ in basali diam. et 1 μ cr. in apicali diam., hyalini. Pycnidiosporae acrogenae, falcoideae, continuae, hyalinae, 10-18 x 1-1,5 μ.

In foliis *Eugeniae* sp., in ascostromatis *Parasterinae colliculosae* (Speg.) Theiss Rep. Domin. R. Ciferri, V, 1929. Typus, n. 169322, sub *Asterina colliculosa* Speg., in Herb. Mus. Nat. Pragae.

Obs.: Esta espécie tem picnídios, conidióforos e picnidiosporos menores do que *P. lembosiae* Bat. & Vital (Ann. Soc. Biol. Pern. XIII, 2: 95, 1955).

PROTOVENTURIA BORNMUELLERI Bat. & J. A. Lima n. sp.
(Em honra a J. Bornmüller)

Colônias hipófilas, superficiais, negras, semi-circulares ou irregulares, isoladas ou confluentes de 1-5 mms de diam. Micélio superficial, marron, sem setas, sem hifopódios, de hifas sinuosas, telemórficas, radiantes, irregularmente ramificadas, septadas, não constrictas, tendo células de 10-17 x 2-4 μ. Peritécios marron-negros, superficiais, subglobosos, geralmente deprimidos, 150-200 μ de diam., setosos, pseudo-ostiolados, isolados ou confluentes, membranoso-carbonáceos, de paredes sub-parenquimáticas, formadas por células poligonais de 5,5-11 x 4,5-10 μ; setas periteciais numerosas, 10 a 20, marron-negras, continuas, simples, de ápice acuminado, 66-90 x 6-7 μ (Fig. 6). Ascos cilindráceos, 2-tunicados, numerosos, curtamente pedicelados, de 50-60 x x 8-9,5 μ. Paráfises filiformes, septadas, ramificadas, hialinas, 1,5-2 μ de diam. Ascosporos hialinos a princípio, depois oliváceos a marron, 1-septados, levemente constrictos, de células desiguais, dísticos, cilindráceo-oblongos, 10-12 x 4-4,5 μ.

Sôbre folhas de hospedeiro irreconhecível. J. Bornmüller, 1-IV-1900. Madeira, Poizo. Tipo, n° 25, no Herb. da Acad. Nat. Sci. Philadelphia, sob a etiqueta de *Dimerosporium tacsinii* P. Magn.

Coloniae hypophyllae, superficiales, atrae, semicirculares vel irregulares, simplices vel confluentes, 1-5 mm diam. Mycelium superficiale, brunneum ex hyphis sinuosis, radiantibus, irregulariter ramosis, septatis, non constrictis et ex cellulis 10-17 x 2-4 μ, non setosis, haud

hyphopodiatis, compositum. Perithecia atro-brunnea, superficialia, subglobosa vel globoso-depressa, 150-200 μ diam., pseudo-ostiolata, subparenchymatica, cum parietibus ex cellulis polygonalibus, 5,5-11 x 4,5-10 μ, efformatis. Setae peritheciales numerosae, 10-20, atro-brunneae, continuae, simplices, apicaliter acuminatae, 66-90 x 6-7 μ. Asci cylindracei, 2-tunicati, breviter-stipitati, 50-60 x 6-7 μ. Paraphyses filiformes, septatae, ramosae, hyalinae, 1,5-2 μ cr. Ascosporae cylindraceo-oblongae, 1-septatae, ex cellulis inaequalibus constitutae, compressae, primo hyalinae dein brunneae, 10-12 x 4-4,5 μ.

In foliis plantae non ident. J. Bornmüller, 1-IV-1900. Madeira, Poizo. Typus, 25, in Herb. Acad. at. Sci. Philadelphiae, sub *Dimerosporio tacsinii* P. Magn.



Fig. 6.
PROTOVENTURIA BORNMUELLERI Bat. & J. A. Lima n. sp.
Peritécio setoso, asco parafisado e ascosporos.

ROSTROCORONOPHORA CASTANEAE Bat. & J. A. Lima n. sp. - Munk, Danish Pyrenomycetes: 292, 1957.

Micélio livre ausente. - Peritécios hipófilos, dispersos, isolados ou aagregados, marron-negros, glabros, imerso-irrumpentes, de base globosa, 190-220 μ de diam., membranosos; rostro longo, emergente, de 350-460 x 27,5-33 μ, erecto ou recurvado, terminando por um ápice hialino, lisígeno, não perifisado, com ostíolo pertuso; paredes sub-parenquimáticas, formadas por células poligonais, de 5,5-19 x 3,5-12 μ, na região basal; no rostro, as células parietais apresentam-se retangulares, paralelamente

dispostas, de 5,5-7 x 2-3,5 μ (Fig. 7). Ascos evanescentes á maturidade, 8-esporos, elipsoides, aparafisados, 1-tunicados, sésseis ou curto-estipitados, 25 x 6 μ. Ascosporos 1-septados, hialinos, fusoides, 4-gutulados, polísticos, de polos acuminados de 12,5-15,5 x 1,5-2 μ. Sôbre folhas de *Castanea* sp., associado a *Mycosphaerella punctiformis* (Pers.) Munk Tipo. Espec. nº 744, ex Desmazières, no Rijksherbarium de Leiden, sob *Asteroma castaneae* nob.

Mycelium liberum non est. Perithecia hypophylla, dispersa, singularia vel gregaria, atro-brunnea, glabra, immerso-irrumpentia, basaliter



Fig. 7.

ROSTROCORONOPHORA CASTANEAE Bat. & J.A. Lima n. sp.
Peritécio, asco e ascosporos.

globosa, 190-220 μ diam., membranosa, cum rostro longo, emergenti, 350-460 x 27,5-33 μ, erecto vel incurvato et cum apice hyalino, lisigeno, non paraphysato, atque ostiolo pertuso; parietes subparenchimatici. ex cellulis polygonalibus, 5,5-19 x 3,5-12 μ in regione basali, efformati; in rostro cellulae parietum rectangulares apparent, cum intervallis paribus inter se, 5,5-7 x 2-3,5 μ. Asci ad maturitatem evanescentes, octosporei, ellipsoidei, aparaphysati, 1-tunicati, sessiles vel brevi-stipitati, 25 x 6 μ. Ascosporae 1-septatae, hyalinae, fusoideae, 4-gutulatae, polystichae, ad polos acuminatae, 12,5-15,5 x 1,5-2 μ.

In foliis *Castaneae* sp., cum *Mycosphaerella punctiforme* (Pers.) Munk. Typus. Spec. n. 744, ex Desmazières, in Rijksherbarium, Leiden, sub *Asteroma castaneae* nob.

SUMMARY

The following new generas and new species are described in this paper: *Parodiodia* (fam. Parodiopsidaceae) with *P. amelanchiera* as type, on *Amelanchier alnifolia; Protostegiomyces asterinarum* as hyperparasite of *Parasterina colliculosa* (Speg.) Theiss. on *Eugenia* sp.; *Protoventuria bornmuelleri* on unknown host and *Rostrocoronophora castaneae* on *Castanea* sp.

Also are studied: *Dimerosporiopsis engleriana* P. Henn. on *Erica obliqua, Phaeosphaerella theae* Petch on *Acer campestre* and *Physalospora pandani* Ell. & Ev. on *Sutherlandia frutescens.*

BATISTA, A. C.

Revista de agricultura

157 With the Comp!

ÓRGÃO OFICIAL DO
DIRETÓRIO ACADÊMICO DA
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA

1959

ANO II — Nº 1

RECIFE — PERNAMBUCO

1 - JUL. 1959

REVISÃO DE ALGUNS PIRENOMICETOS ALIENÍGENAS

A. CHAVES BATISTA *

E. A. F. DA MATA **

(Publicação n. 157 do I. M. U. R.)

Resume esta publicação alguns Pirenomicetos cujas características analisamos sôbre antigas exsicatas de herbário.

Apiospora montagnei Sacc. é estudado sôbre *Arundinaria macrosperma; Herpotrichia mucilaginosa* Starb. & Grev. é assinalado sôbre *Juniperus virginiana, Leptosphaeria* cfr. *Coniothyrium* Fuck. é identificado sôbre *Lunaria rediviva, Leptosphaeria euphorbiae* Niessl. é examinado sôbre Juncaceae, *Niesslia aemula* Syd. var. *minor* Matta n. var. é descrito sôbre *Alchemilla,* e *Venturia ditricha* (Fr.) Karsten é diagnosticado sôbre *Betula alba.*

* Diretor do Instituto de Micologia da Universidade do Recife e Catedrático de Fitopatologia da Escola Superior de Agricultura da Universidade Rural de Pernambuco.

** Do Instituto Biológico da Bahia, em estágio no Instituto de Micologia, da Universidade do Recife.

APIOSPORA MONTAGNEI Sacc.

in Syll. Fung. 1: 539,1882

v. Arx: Berichte der Schweizerischen Bot. Gesellschaft, Band 62: 340 — 344, 1952.

Micélio livre ausente.

Estromas peritecígeros, imerso-irrumpentes, dotideoides, lineares, carnosos, negros, isolados ou confluentes, opacos de 2,5 - 3,5 mms. de extensão e 0,1 - 0,3 mms. de largura, dispostos paralelamente; superfície levemente rugosa, 198 - 210 u de altura; paredes estromáticas abrindo-se em fenda longitudinal, de 38 - 68,5 u de espessura, formadas por células poligonais e arredondadas, de 4,5 - 10 x 2,5 - 8 u; na região basal o estroma prolonga-se em hifas hialinas, septadas, contendo células de 3,5 - 8 x 3 - 5,5 u, distribuidas de modo intracelular, Fig. 1 - a.

Lóculos periteciais imersos, igualmente distribuidos, sub-globosos a piriformes, 115 - 140 x 150 - 200 u, ostiolados; himênio basal. Ostíolo central com abundantes perífises, 15 - 20 u de diam.

Ascos cilindro-clavados, 8 esporos,1-tunicados, sésseis, parafisados de 58 - 61 x 13 - 14,5 u, paráfises hialinas, septadas, simples ou ramificadas, 1,5 - 2,5 u de diam. Fig. 1 - b.

Ascosporos cilindráceo-clavados; curvos, hialinos, gutulados, 1-septados, não constrictos, dísticos de 14 - 20 x 5,5 - 6,5 u.

Sôbre *Arundinaria macrosperma* Michx. Jackson, Miss. 4.12.914. Espec. n. 4901, ex Fungi Columbiani, E. Bartholomew, no Herb. de Pennsylvania State Univ.

HERPOTRICHIA MUCILAGINOSA Starb et Grev.

in Syll. Fung. IX: 858

Subículo superficial, denso, marron, de espessura bastante variável.

Micélio interno inter e intracelular, marron-escuro, septado, 2 - 3 u diam.

Pseudotécios superficiais, assentes sôbre o subículo, isolados, algumas vezes agrupados, globosos a sub-globosos, de base aplanada, ástomos, membranosos, marron-escuros, 148-205 u diam.; perídio espesso de 8-32,5 u de diam., Fig. 2 - a, b.

Ascos cilindráceos, numerosos, curto pedicelados, 2-tunicados, 8-esporos, 40 - 100 x 16 - 19u, Fig. 2 - C.

Paráfises hialinas, septadas, filiformes, 1,5 - 2u.

Ascosporos elipsoide-fusoides a sub-cilindráceos, dísticos a polísticos, de polos redondos, hialinos, 1-septados, lisos; epispório delgado, um pouco mucoso, 25 - 35 x 4 - 10 u. Fig. 2 - d.

Sôbre fôlhas de *Juniperus virginiana.* Newfield, N. Jersey, Junho, 1883. Espec. n. 1191, ex Ellis, sob *Microthyrium juniperi* no Herb. da Acad. Nat. Sci., Philadelphia, USA.



Fig. 1

APIOSPORA MONTAGNEI Sacc.

a) Peritécios estromáticos;
b) Ascos parafisados e ascosporos. (Orig.)



Fig. 2

HERPOTRICHIA MUCILAGINOSA Starb. & Grev.

a) Secção longitudinal do pseudotecio;
b) Pseudotecio sob perfil.
c) Ascos parafisados;
d) Ascosporos. (Orig.)



Fig. 3

LEPTOSPHAERIA cfr. *CONIOTHYRIUM* Fuckel.
Peritecio, asco parafisado e ascosporos. (Orig.)



Fig. 4

LEPTOSPHAERIA EUPHORBIAE Niessl.
Peritécio, asco parafisado e ascosporos.
(Orig.)



Fig. 5

NIESSLIA AEMULA Syd. var. *MINOR* Matta n. var.

a) Peritecio setoso;
b) secção longitudinal do peritecio;
c) asco parafisado;
d) ascosporos.



Fig. 6

VENTURIA DITRICHA (Fr.) *KARSTEN*

Pseudotecio setoso. asco e ascosporos (Orig.)

The Chaetothyriales

Institute of Mycology – University of Recife.
Publication Nr. 158

By

A. Chaves Batista & R. Ciferri

Filed in Herbarium as Sydowia, Be
Chaetothyriales. BATISTA, A. C. & C

1962
VERLAG VON FERDINAND BERGER, HORN, N.-Ö., AUSTRIA

Beihefte

zur

Sydowia

Annales Mycologici, Ser. II.

Herausgegeben

von

F. Petrak (Wien)

III. Beiheft

A. Chaves Batista & R. Ciferri
The Chaetothyriales

Issued March, 10, 1962

1962

VERLAG VON FERDINAND BERGER, HORN, N.-Ö., AUSTRIA

ANO LIII ★ MARÇO DE 1959 ★ VOL. 104 N.º 3

● DIRETOR
JORGE DE REZENDE

● SECRETÁRIOS DE REDAÇÃO
ROGERIO ROCCO
JEAN CLAUDE NAHOUM
PAULO BELFORT DE AGUIAR

● CONSELHO DE REDAÇÃO
F. VICTOR RODRIGUES
J. ADEODATO FILHO
MARTINIANO FERNANDES
E. MARTINS PASSOS
J. C. GOMES DA SILVEIRA

● REDATOR-GERENTE:
BRENO GOMES DE MATTOS

● REDATORES

Alicio Peltier de Queiroz — Álvaro Guimarães Filho — Amador Corrêa Campos — Antônio de Sá Leitão — Carmem Escobar Pires — Cláudio Goulart de Andrade — Clóvis Corrêa da Costa — Clóvis Salgado — Domingos Delascio — Francisco Cerruti — Geraldo V. de Azevedo — Guilherme Serrano — J. Onofre de Araújo — Jorge Sant'Ana — José Medina — Lucas Machado — Martim Gomes — Monteiro de Moraes — Murillo Queiroz de Barros — N. de Moraes Barros — Octavio de Souza — Orlando Bordallo — Otto Cirne — Paulo Barata Ribeiro — Paulo Crespo Ribeiro — Paulo de Escragnolle Taunay — Pedro Paulo Corrêa — Selva Júnior — Sylvio Oliveira de Barros — V. A. Faleiros de Almeida — Victor do Amaral Filho — W. de Souza Rudge — Washington Maltez.

REVISTA DE GINECOLOGIA E D'OBSTETRÍCIA

A mais antiga publicação especializada da América Latina

● REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Rua do Lavradio, 134 — Tel. 22-8066
RIO DE JANEIRO — BRASIL

ASSINATURA ANUAL:

BRASIL:	(porte simples)	Cr$	500,00
	Registrado	Cr$	600,00
NÚMERO AVULSO		Cr$	50,00
EXTERIOR		US$	12,00

A Revista não tem cobrador. O pagamento deverá ser feito por cheque ou vale postal. Os assinantes residentes no Distrito Federal poderão também efetuar o pagamento na redação.

TABELA DE PREÇOS DOS ANÚNCIOS

Página inteira	Cr$ 5.000,00
Meia página	Cr$ 3.000,00
Encartes	Cr$ 4.000,00

ANÚNCIOS NA CAPA — A COMBINAR

LUTEO-OVARINA

EXTRATO TOTAL DE OVÁRIOS E CORPOS AMARELO

INSUFICIÊNCIA OVARIANA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA PUBERDAI

E NA MENOPAUSA, NATURAL OU CIRÚRGICA.

DRÁGEAS GÔTAS AMPOLAS

LABORATÓRIO CLÍNICO LAB. CLÍNICO SILVA ARAUJO S.A. RIO SILVA ARAUJO S

REDOXON "Roche"

Vitamina C

Indispensável ao funcionamento normal do conjunto das células do organismo humano

AGORA TAMBÉM SÔB A FORMA DE

Comprimidos efervescentes de 1 g !

solúveis na água em menos de um minuto, fornecendo uma bebida de sabor agradável, destituída de inconvenientes digestivos

em tubo de 10 comprimidos

PRODUTOS ROCHE

Químicos e Farmacêuticos S. A.

Rua Morais e Silva, 30 — RIO

104 (3)

LA TÉCNICA DEL ENRIQUECIMIENTO EN EL ESTUDIO DEL AISLAMIENTO DE LEVADURAS

Dr. R. C. Artagaveytia-Allende (*)
Dr. Jarbas Sizenando Silveira (**)

En los casos en que solamente se trata de efectuar un diagnóstico de afección producido por levaduras o que cuya presencia tenga valor en un determinado cuadro patológico se procede, en las técnicas de rutina, además de la siembra de rigor, al examen directo del material en fresco entre lámina y laminilla o a su coloración por distintos métodos como el Gram, May Grunwald-Giemsa, o bien por el azul de Amann ú otros. Debemos por estas técnicas observar elementos redondos u ovales con brotaciones simple o multiples. Tambien es posible la observación de micélio o pseudomicelio.

En todos estos casos es de gran importancia la observación de los elementos levaduriformes. En general se trata de materiales en los cuales en un gran porcentaje se encuentran levaduras sin que el portador acuse aparentemente el menor cuadro clínico. Se trata de portadores hypotheticamente sanos.

Estudios de diversos autores establecen que el porcentaje de portadores de levaduras en la boca, intestino y otras cavidades es muy alto.

Lo anterior indica que sembrando esos materiales se obtendrá un número elevado de cultivos positivos. Sin embargo es casi imposible en estos casos observar un elemento levaduriforme en un examen directo. En cambio en los cuadros patológicos, las levaduras, al romperse el equilibrio biológico que establece una relación de números entre los gérmenes huespedes, aquellas aumentan en cantidad y son observables a veces en gran número en cada campo microscópico. Por lo

(*) R.C. Artagaveytia-Allende: Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad del Uruguay, atuando como pesquisador del Instituto de Micologia de la Universidad de Recife, como invitado especial del Magnifico Reitor Prof. Joaquim Ignácio de Almeida Amazonas.

(**) Jarbas Sizenando Silveira: Médico Asistente del Instituto de Micologia de la Universidad de Recife. Jefe del Servicio de Micopatologia ginecológica.

tanto debe considerarse la observación de levaduras al examen directo como presuntivo de proceso patológico.

Lo expuesto corresponde a las observaciones de presuntos cuadros patológicos, pero cuando se trata de estudiar al habitat de las levaduras, el problema cambia fundamentalmente.

Dada la pequeña cantidad de levaduras que pueden contener los materiales estudiados en estos casos hace practicamente imposible las observaciones con resultados positivos en examen directo. Además es frecuente encontrar plantíos de estos materiales con resultados negativos para levaduras.

Con la finalidad de facilitar el desarrollo de ellas, impedido o enmascarado por el de otros gérmenes se emplean todavía los antiguos medios de Sabouraud glucosado al 4% con pH 5.5 o el medio de Raulin, líquido rico en sales y con pH 5.0 o 5.5. En la actualidad Wickerham (1) ha estructurado técnicas basadas en la biología de los gérmenes a eliminar y ademas del pH bajo emplea en medios líquidos la agitación para inhibir el desarrollo de hongos filamentosos como también la semianaerobiosis provocada por capa de vaselina líquida. Tambien desde hace pocos años ha tomado incremento la adicción de antibioticos a los medios comunes de rutina como en el caso de la acromicina u otros antibioticos. Ultimamente Nickerson (2) estudiando la biología de las levaduras constató que en menor o mayor grado presentan la facultad de reducir los sulfitos dando lugar a la aparición de colonias de color mas o menos obscuro, circunstancia que empleandola en técnicas de aislamiento, permite encontrarlas entre las de los gérmenes contaminantes. Este autor en su trabajo estudió, en diversos medios conteniendo sulfitos, ampliamente, el tema. Actualmente medios semejantes adicionados de antibioticos existen en el comercio con el fin específico de identificar cepas de levaduras entre otras de otros gérmenes.

Artagaveytia-Allende y Garcia-Zorrón (3) emplean como medio de rutina el Agar Sulfito, de Difco, pero con pH 6.0 con resultados satisfactorios.

Pero, a pesar del empleo de medios selectivos siempre existe la posibilidad de que siendo extremamente pequeño el número de levaduras arrastadas por el asa de platina, en especial en casos en que el material es escaso o existe imposibilidad de efectuar amplia colecta, obtengamos resultados negativos porque los pocos elementos recogidos con el material por diversas causas no desarrollan (pH, asociaciones fungicas e bacterianas, etc.).

La observación de varios casos nos llevó a pensar en una colecta mayor del material a estudiar pero la imposibilidad

de ello nos obligó a poner en practica una técnica que se basa en pasar un hisopo de algodon esterilizado por el organo afectado (hemos efectuado por ahora la observación en organos genitales femenino) el cual atritamos inmediatamente por la superfície de tubos de Agar Sabouraud glucosado adicionados de acromicina; como esta operación puede no dejar las levaduras sóbre la superfície del medio, colocamos a continuación el hisopo en caldo Sabouraud. A los cuatro dias efectuamos un transplante de este medio líquido a un medio sólido. Creemos que por mínima que sea la cantidad de levaduras arrastradas por el hisopo, en su inmersión en el medio líquido encuentran oportunidad para desarrollar.

En el cuadro anexo aparecen 100 materiales de vagina que fueron sembrados directamente en el momento de ser recogidos en medio de rutina y después transplantados del medio de enriquecimiento segun la técnica descripta en lineas anteriores. Al mismo tiempo a cada material se le efectuó un examen directo.

En 100 materiales de vagina obtuvimos los seguientes resultados en lo referente a levaduras.

Examen Directo	Cultivo Directo	Enriquecimiento	Resultados %	
a) —	—		18	18%
b) —	—		6	6%
c) —	—	+	6	6%
d) —	—	+	14	14%
e) —	—	—	56	56%
			100	100%

Discusión: De acuerdo con las técnicas corrientes de sembrar el material recogido directamente en tubos de medio sólido habríamos tenido solamente en las 100 muestras, positivos 24 materiales, comprendiendo a) y b); en cambio por el método del enriquecimiento obtenemos más 20 positivos (c) y (d) que hubiesen escapado a nuestro control y sido considerados entonces como negativos. El procedimiento de enriquecimiento eleva el porcentage de positivos de 24% a 44%.

La apreciable elevacion del porcentage de positivos obtenidos, da valor práctico a la técnica de enriquecimiento, pues en estudios de frecuencia y habitat de las levaduras, amplia considerablemente el campo de acción de las levaduras.

LISTA DE CONTROL DEL MATERIAL

NUMERO DEL MATERIAL	EXAMEN DIRECTO	CULTIVO DIRECTO	ENRIQUECIMIENTO	NUMERO DEL MATERIAL	EXAMEN DIRECTO	CULTIVO DIRECTO	ENRIQUECIMIENTO
944	(-)	-	+	1054	(-)	-	-
966	(-)	-		1056	(-)	-	+
968	(-)	-	-	1057	(-)	-	+
965	(-)	-	-	1057-A	(-)	-	+
969	(-)	-	+	1058	(-)	-	-
970	(-)	-	-	1059	(-)	-	-
971	(-)	-	-	1063	(-)	-	-
972	(-)	-	-	1069	(-)	-	-
985	(-)	+		1070	(+)	-	+
995	(-)	+		1072	(-)	-	+
996	(-)	+		1075	(-)	-	+
997	(-)	+		1092	(-)	+	
1012	(-)	-	-	1104	(-)	-	-
1013	(-)	-	-	1110	(-)	-	-
1014	(-)	-	-	1111	(-)	-	-
1015	(+)	+		1112	(-)	-	-
1016	(-)	+		1114	(+)	+	
1021	(-)	-	-	1115	(-)	+	
1022	(-)	-	-	1118	(+)	+	
1028	(-)	-	-	1121	(-)	+	
1031	(-)	+		1122	(-)	-	-
1036	(-)	+		1123	(-)	+	
1038	(-)	-	-	1125	(-)	-	-
1040	(-)	-	-	1128	(-)	-	-
1046	(-)	-	-	1131	(+)	-	+
1047	(+)	+		1132	(-)	-	+
1048	(-)	+		1142	(-)	+	
1053	(-)	-	-	1143	(-)	-	-

1146	(+)	-	(+)	1282	(-)	+	
1148	(-)	-	-	1284	(+)	-	+
1149	(-)	-	-	1289	(-)	-	-
1150	(-)	-	-	1288	(-)	-	-
1151	(-)	-	-	1299	-	-	-
1156	(-)	-	-	1358	-	-	-
1157	(-)	-	-				
1159	(-)	-	-				
1172	(-)	-	-				
1173	(-)	-	-				
1178	(-)	-	-				
1194	(-)	-	-				
1195	(-)	-	-				
1200	(-)	-	-				
1201	(-)	+					
1202	(-)	+					
1203	(-)	-	-				
1204	(-)	-	-				
1205	(-)	-	-				
1206	(-)	-	-				
1211	(-)	-	+				
1213	(-)	-	-				
1215	(-)	-	-				
1216	(-)	-	-				
1228	(-)	-	+				
1041	(+)	+					
1239	(+)	-	+				
1240	(-)	-	-				
1247	(-)	-	-				
1250	(-)	-	+				
1254	(-)	-	-				
1255	(+)	+					
1257	(-)	-	+				
1258	(-)	-	-				
1259	(-)	+					
1263	(-)	-	+				
1270	(-)	+					
1271	(+)	-	+				

Resumo

La tecnica del enriquecimiento en el estudio des aislamiento de levaduras

Los autores proponem una nueva técnica de enriquecimiento para aislamiento de levaduras, en la cual utilizan un hisopo de algodón esterilizado que es posteriormente inmerso en caldo Sabouraud, después de atritarlo por los organos afectados.

Presentan ellos su experiencia en 100 casos, recomendando la nueva técnica de enriquecimiento como de valor práctico.

Resumo

A técnica do enriquecimento no estudo do isolamento das leveduras

Os autores propõem uma nova técnica de enriquecimento para isolamento de leveduras, utilizando um hissopo de algodão esterilizado, o qual é posteriormente imerso em caldo Sabouraud, após atritagem pelo, ou pelos órgãos afetados.

Apresentam sua experiência em 100 casos, recomendando a nova técnica de enriquecimento como de valor prático.

Résumé

La technique de l'enrichissement dans l'étude de l'isolement des levures.

Les A.A. proposent une nouvelle technique d'enrichissement pour l'isolement des levures, faisant usage d'un hyssope de coton stérilisé, lequel est ensuite introduit dans un bouillon de Sabouraud, et préalablement mis en contact avec les organes affectés.

Ils présentent leur casuístique de 100 cas, et préconisent la nouvelle technique à cause de sa valeur pratique.

Summary

The enrichment technic in the study of yeast separation.

The AA. refer to a new technique of enrichment for the isolation of yeasts, using a cotton hyssop, that, after attrition by the various infected or infested organs is immersed in Sabouraud broth.

They present his experience with one hundred (100) cases and recommend this new technique as one of the most valuable practical efforts for the survey of yeast fungi, in the human vagina.

Referências

1) Wickerham, L. — Taxonomy of yeasts — U.S. Depart. of Agric. Tech. Bull. n.º 1029, May 1951.

2) Nickerson-Reduction of inorganic substances by yeasts Extracellular reduction of sufite by species of Candida. J. Inf. Dis., 1953, 93: 43-56.

3) R.C. Artagavevtia-Allende & N. Garcia Zorrón — Importancia del hallazgo de levaduras en material humanos. Sobretiro de Ciencia (Mex.) 1958, (7-9): 140-3.

Dr. Jarbas Sizenando Silveira

Instituto de Micologia — Universidade do Recife

Recife — Pernambuco — Brasil.

Colpomicina

NAS CERVICITES E VULVOVAGINITES



por fungos, tricomonas e bactérias

PURISSIMUS

S/A INSTITUTOS TERAPEUTICOS REUNIDOS "LABOFARMA"

PRODUTOS "PURISSIMUS"

Rua Glicerio, 497 - São Paulo

FUNGOS FILAMENTOSOS ASSINALADOS NA BILE HUMANA*)

A. CHAVES BATISTA
GERALDO L. SILVEIRA
J. AMÉRICO DE LIMA
S. DIOSCÓDIO DE OLIVEIRA

Sôbre amostras de bile humana, obtidas por cateterismo, de pacientes enfermos da árvore biliar conseguimos o isolamento de fungos filamentosos, em cultivo puro, mediante a transferência de gotícula de bile, com alça de platina, para placas contendo Sabouraud-acromicina.

Nêste trabalho indicamos êsse fungos assinalados, até hoje, no I.M.U.R. e redescrevemos *H. niveolanosum :*

Hyalopus serrae (Maffei) Simões Barbosa.

Hyalopus acremonium (Fres.) Simões Barbosa

Hyalopus keratoplasticum (Morikova) Simões Barbosa.

Hyalopus onychophilus (Vuill.) Asch.

Hyalopus nyveolanosum (Benedek) Simões Barbosa.

Aureobasidium pullulans (De Bary) Arn.

A incidência de *H. niveolanosum* amplia o número de espécies de *Hyalopus* por nós encontradas sôbre bile.

As características do cultivo dêsse fungo são as seguintes :

Sôbre Czapek-agar, aos 2 dias e à temperatura ambiente, desenvolvem-se colônias brancas, planas, cotonosas, circulares, de 3-3,5 cm de diâmetro (Fig. 1.ª).

Micélio hialino, ramificado, frouxo, com hifas septadas, de 2-3 μ de diâmetro.

Conidióforos direitos, hialinos, septados ou não, 0-66 x 2-3 μ, apresentando cabeças globosas (Fig. 2) hialinas, 11-16,5 μ; conídios elípticos, contínuos, lisos, hialinos, 5-7 x 2-3,5 μ (Fig. 3).

Aos 6 dias, à mesma temperatura, ainda sôbre Czapek-agar, mantém-se o mesmo aspecto, diferindo apenas o diâmetro das colônias que passa a 7,5 cm.

Aos 15 dias, as colônias atingem 9 cm de diâmetro, guardando, porém, as demais características; são inodoras, com exsudato hialino.

Reverso liso, plano, de côr creme.

A 38ºC, mostram-se granulosas, convexas, circulares, com zonas úmidas, creme, e micélio aéreo escasso; têm crescimento lento alcançando apenas 3 cm, aos 15 dias.

Sôbre Sabouraud-dextrose-agar, à temperatura ambiente, já aos 2 dias, as colônias são cotonosas, brancas, com tonalidade violácea ao centro (Fig. 1 b).

Aos 6 dias, tornam-se violáceas em quase tôda a sua extensão, com exsudato hialino presente, e inodoras.

Reverso liso, violáceo, de bordos esclarecidos; medem 7,5 cm de diâmetro.

*) Instituto de Micologia — Universidade do Recife — Publicação n.º 160.



Fig. 1 — HYALOPUS NIVEOLANOSUM (Benedek) Simões Barbosa.
a = Colônia em Czapek-agar, aos 4 dias.
b = Colônia em Sabour-agar, aos 4 dias.

Fig. 2 — HYALOPUS NIVEOLANOSUM (Benedek) Simões Barbosa — (Cultura sôbre lâmina).



Fig. 3 — HYALOPUS NIVEOLANOSUM (Benedek) Simões Barbosa — Conidióforos e conídios.

Aos 15 dias, à temperatura ambiente, são circulares, planas, de 9 cm de diâmetro, cotonosas, violáceas ao centro, de bordos brancos inodoras; exsudato hialino abundante.

pâncias em relação aos cultivos sôbre Czapek-agar.

Os conídios são elípticos, hialinos, 1-septados ou não, encontrados na extremidade dos conidióforos, em ca-

Fig. 4 — HYALOPUS NIVEOLANOSUM (Benedek) Simões Barbosa.

Reverso liso, róseo, de bordos creme (1,5 cm) zonado.

A 38.º C, são convexas, cotonosas, brancas, de crescimento reduzido, chegando apenas a 2 cm, aos 15 dias.

Reverso creme, liso.

Microscòpicamente não há discrebeças que, fàcilmente, se desorganizam; medem 5-7 x 2,5-3,5; geralmente, essas cabeças são globosas, 8-19 μ de diâmetro, hialinas e compostas de 3-5 conídios.

Conidióforos direitos, simples, geralmente curtos, hialinos, septados ou não, 0-75 x 3-4,5 μ (Figs. 4 e 5).



Fig. 5 — HYALOPUS NIVEOLANOSUM (Benedek) Simões Barbosa.

Micélio hialino, frouxo, muito ramificado, septado, apresentando-se às vêzes gatulado, com hifas de 2,5-5 μ de diâmetro.

Clamidosporos terminais ou intercalares, globosos ou sub-globosos, 5,5-8 μ de diâmetro, hialinos.

ABSTRACT

The A. A. report their findings on filamentous fungi isolated from human bile and give the cultural characteristics of *Hyalopus niveolanosum* (Benedek) Simões Barbosa obtained from a bile sample.